





PER AMPLIORA AD ALTIORA

Oliver Wendell Holmes.



4. X. 6.



Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
Open Knowledge Commons and Harvard Medical School

<http://www.archive.org/details/auctariumadalber00hall>

AVCTARIVM
AD
ALBERTI HALLERI
ELEMENTA
PHYSIOLOGIAE
CORPORIS HVMANI

EXCERPTVM
EX NOVA EDITIONE
ET ADAPTATVM VETERI

FASCICVLVS PRIMVS.
FIBRA. VASA. CIRCVITVS SANGVINIS. COR.

LIPSIAE ET FRANCOFVRTI,
MDCCCLXXX.



LECTORI BENEVOLO.

S. D. P.

EDITOR.

Quum nouam editionem elementorum physiologiae corporis humani Hallerianae, quae ita est inscripta:

ALBERTI HALLERI

DE

PARTIVM

CORPORIS HUMANI

PRAECIPVARVM

FABRICA ET FUNCTIONIBVS

OPVS QVINQVAGINTA ANNORVM.

BERNAE, c l o l o c c L X X V I I .

IV

cum priore Halleriana compararemus, eamque nouam editionem fedecim voluminibus, vt dicitur, in forma octaua absolui perspiceremus, augmentum huius nouae editionis, idque ipsum non paruum, potius cerni in additis rebus nouiter detectis seu omisissis, mendis emendatis, nec non in dubiis vel reuocatis, vel nouiter motis, item in rebus aliis atque aliis in locis veteris editionis sparsis, in vnum nouae coactis locum, inque rebus aptiori loco collocatis, quam in rerum propositarum ordine mutato, quem secutus est HALLERVS in prima editione, intelleximus. Quod quidem ex fine praefationis Hallerianae nouae editioni praemissae luculenter patet: *Ordinem seruauimus eundem et libros perinde triginta, sed multa contraxi, alia aptiori loco disposui, vere utilis nihil omisi.*

Quae cum ita sint, haec additamenta in vsum et commodum emporum veteris editionis ex noua excerpta atque collecta hic deprehenduntur, eaque ipsa veteri editioni, quantum fieri potuit, ratione typorum stanneorum, chartae, formae cet. ita similia effecta, vt, hoc auctario adiuncto, nullum, quoad contenta, inter veterem et nouam editionem intercederet discrimen. Vt autem spatio, volumini et pecuniae parceretur, et tamen id, quod non diu ante promissum est, praestaretur, has adhibuimus cautiones.

Ac primum quidem, quod ad praefationes *) nonnullis nouae editionis tomis praemissas spectat, eas pene verbotenus describendas censuimus, neque quicquam deleuimus praeter id, quod de tempore, quo secundus et tertius tomus prodierint, et quo reliquae partes essent proditurae, Auctor monuerat. Etenim cum in his ipsis praefationibus partim aliquis velut recens supplementorum, partim vberior quorundam assertorum illustratio contineatur, non posse non eas cuiusdam utilitatis esse arbitrati sumus.

Colligentur postea omnino omnia ea additamenta nouae editionis, quae nouitatem rerum prae se ferunt et siue emendationi, siue illustrationi veteris seruiunt, ita in octo fasciculos, ut singuli fasciculi initium dirigat finis vniuscuiusque tomi primae editionis in forma quarta. Quapropter, ut quilibet fasciculus cuique tomo veteris editionis commoditatis causa posset iungi, paginarum numerus singuli fasciculi sine erat finiendus. Fasciculi autem quarti diuisio in primam et secundam partem pendet a fine octauo voluminis, quod hactenus ultimo loco de noua hac editione anno huius seculi septuagesimo et octauo prodiit. Simulac vero reliqua volumina apparuerint, rursus incipiemus ita, ut singulo tomo veteris editionis respondeat singulus huius auctarii fasci-

*) Epistolam dedicatorem ad CALDANVM Patauinum Professore, quae primo volumini praemissa est, consulto omisimus, quippe quae nihil omnino, quod Lectoribus prodesse possit, contineat.

culus. In ordine itaque hunc fasciculum quartum in primam et secundam partem distribuimus.

Sed ut breuitati vel vbique consuleremus, singulorum verborum, vnam eandemque rem significantium, nec sensum mutantium, nec iam communicatas in veteri editione illustrantium res, aliquam habuimus curam. Quod porro attinet ad locos in vetere disiunctos et in noua editione vnitos aut in hac ex ea omissos aut breuius dictos, hi sedulo laudati et, rebus mutationem passis, prorsus repetiti sunt *). Noluimus enim non facile quicquam omittere; quare si eandem rem bis propositam deprehendimus, bis eam quoque descripsimus e. g. de granoso insectorum adipe **).

Deinde notarum ita est habita ratio, ut nouis additis, emendatae commemorarentur et omissae deleterentur.

Typographica errata, eaque non adeo rara, huius nouae editionis corrupta effecerunt loca varia. Id quod et falsus est Editor praefationis Fasciculo huius auctarii tertio ***) praemissae. Tum Graeca verba Latinis litteris in ea leguntur, quae suae linguae in hoc auctario reddidimus. Pariter nomina Auctorum, librorum inscriptiones cet. erroribus non sunt destituta. Quibus in rebus ita versati sumus, ut, si fieri posset, hos errores emendaremus. Quod si vero per eorum grauita-

*) v. Auctar. Fascic. I. p. 21. 68.

) vid. Fascic. I. p. 15. *) p. 3.

grauitatem atque difficultatem non licuit, quid esset sentiendum, non immodeste demonstrauius, ac denique, si prorsus nulla corrupti loci adhiberi potuit medela, saltem eam indicauimus ****). Forte Editor reliquorum voluminum eiusmodi loca corriget et praeterea quorundam errorum a nobis praetermissorum adhibebit emendationem, quos omnes, hoc auctario ad finem perducto, nos diligenter repetituros esse pollicemur.

Denique opus est, vt de tabulis aeneis quaedam dicamus. Quorum nouitas curabitur, vti forma huius auctarii poscit, eam vero earum varietatem, quae solummodo a diuersa horum editionum forma est repetenda, nec vllam praeterea mutationem affert, de industria negleximus.

Quae praeterea in veterem et nouam huius physiologiae Hallerianae editionem cadit diuersitas, intelligi facile potest ex praefatione veteris editionis aucta, nouae praemissa et huic ipsi auctario, quatenus nouitatem spectat, inserta.

Ergo in huius auctarii edendi occupatione nos ita versatos esse, ex his fasciculis, quos hic vulgamus et reliqui, editis ceteris nouae editionis voluminibus, eadem ratione sequentur, apparebit.

Omnibus demum his octo fasciculis finitis, qui, vti ab initio polliciti sumus, octo tomis veteris editionis ita accommodati et adaptati sunt,

****) v. Auctar. Fascicul. II. p. 20.

VIII

sunt, vt singulum tomm veteris editionis singulus fasciculus huius auctarii respiceret, vltimo loco index horum additamentorum addetur, partim vt Lectorum queat indulgeri studiis, partim vt et hac in re haec denuo vulgata additamenta veteri editioni elementorum physiologiae prorsus similia efficiantur. Elucet quidem hic quaedam varietas, cum index rerum contentarum cuilibet tomo prioris editionis est nexus, tuentur tamen, vti videtur, hanc exiguam diuersitatem spatii, voluminis et pecuniae parsimonia. Dedi Lipsiae mense Octobri C1810CCLXXX.

AVCTARIUM
A D
ALBERTI HALLERI
VIRI SVMMI
ELEMENTA PHYSIOLOGIAE
CORPORIS HVMANI.

PRAEFATIO.

Pag. III. l. 11. *adde* et nuperrima aliqua de neruo primi paris *CASCHÉ* et *SABBATIER*.

p. IV. l. 8. *post* vtilitas *adde* visceris, neque ab eo viscere ea functio pendet.

p. V. l. 27. imprudenter decet *lege* continuo debet.

p. VI. l. 2. a quibus per receptas leges eas frangi oportuerat, *lege* a quibus per receptas leges hygrostaticas eas vehementer frangi oportuerat.

p. VII. l. 8. *post* experimentorum *adde* et partium corporis animati historias etc.

ibid. l. 14. *post* licuerit *adde* diligenter descriptas ex libris addiscere facile est.

p. VIII. l. 14. *post* SWAMMERDAMIANIS *adde* etiam LYONNETIANIS.

p. X. l. 7. Quo tempore - - continentur *lege* Ea experimenta Rupe meliori vsus otio, per sex annos iteraui, dilataui, perfeci *b*).

p. XII. l. 18. Longum opus, vt finet - - - - exposita habeantur *lege* Haec anno 1757. 28 April. scripseram. Ab eo tempore annorum pene viginti intervalum aliqua me haud dubie docuit. Nam et ipse interim sex annorum ruficatione Rupensi in disseccandis viuus animalibus, in rimandis pulli incubati phaenomenis, in oculorum minutoribus particulis contemplandis, in comparanda cerebri auium, pisciumque fabrica, in primordiis noui animalis per quadrupeda speculandis, in ossium incrementis versatus sum. Multa etiam et inter ea bona et singularia opera prodierunt. De facultate sentiendi et mouendi experimenta in vtramque partem capta sunt, pene innumerabilia. Haec omnia decerpfi, cum meis contuli, si quid inde emendari liceret meorum, si addere non nihil liceret, ea emendaui, aut adieci.

Senium

b) *post* 2 Tom. *adde* de quadrupedum conceptione, de monstris,

Senium ipsum et frequens experimentum, quo conuicimur, quam facile sit, receptis opinionibus nimium dare, aut amatis praeceptoribus, multa me docuit dediscere, multa, quae putabam me perspicere, nunc video omnino sola me coniectura attingisse.

Dedi ergo innocentissimo rectiora dicendi desiderio, ut nouis curis magnum opus retractarem. Reperi passim, ab ipsa olim necessitate temporum me adductum fuisse, ut eadem repeterem, quae alio loco iam tractassem. Quando enim de corde scribebam, nondum de cerebro dixeram, nondum experimenta produxeram, quae non sinunt admittere, cerebellum inter et cordis modum necessarium quoddam vinculum intercedere; oportuit ergo aliqua eorum experimentorum in eo libro tradere, quo de corde scripsi, ut ostenderem, quare de causis moti cordis vitalem cerebelli potentiam remoueam.

Has nunc incommodas repetitiones, et sunt plussculae, licet omnino expungere, et breuibus verbis, dum de corde ago, ad libri X. sectionem IV. remittere, qua agitur de cerebelli functione.

Porro, cum de arteriarum vi contractili agere oporteret, visus sum non nemini, me modo admisisse aliquam, modo dissimilem mei eam vim repudiasse, ut aliis, aliisque huius operis libris de ea potestate agebam. Hae nunc obiectioes corruent. Apparebit enim, quoties de inuisibili arteriarum constrictione agitur, ex solis suis causis probabili, in magnis certe arteriis, fibris muscularibus munitis, eam vim me admittere. Quoties vero de eiusmodi vi contractili agitur, quae oculis se offerat, quam liceat experimentis conspicuam reddere, toties eiusmodi manifestam potestatem arteriarum reiici; et non reicere non potui, cum tot in experimentis nunquam arteriam contrahi vidissem.

Praefationes aduersariorum asperis iudiciis oppositas non potui totas omittere, cum essent ALBINI, FRANCISCI LAMVRE, aliorumque mihi oppositi libri, et aequum videatur tamdiu me tueri, quamdiu accusor. Multa tamen in breuitatem contraxi, et eadem ut erant mitia, etiam mitiora ut essent, vehementer studui. Additamenta suos in locos reposui.

Denique alia insuperabilis ratio me impulit, ut opus meum, quantum eius fieri posset, in breuitatem contraherem, nunquam speraturus, me tanto opere defuncturum, si longum, si priori longius foret. Et placebam, tamen mihi in ea spe, minus imperfectum et verius meum opus me daturum, quam dederam hactenus.

Ordinem seruauī eundem, et libros perinde triginta, sed multa contraxi, alia aptiori loco disposui, vere utilis omisi nihil,

Bernae d. 19. Martii clobcclxxvii.

CATA-



CATALOGVS

nonnullorum inuentorum Auctoris.

Hunc catalogum olim anno 1764 edidi, cum ab iniustis hominibus, et, quod aegrius me habebat, a *Francisco LAMVRE*, viro Cl. infimularer, alienis me thesauris diuitem esse. Putaui tantam post prouocationem licere mihi, quod absque vlla eiusmodi causa *ALBINVS* fecerat et *DOUGLASSIVS*, eorum edere catalogum, quae ipse prior aut rectius vidissem.

PROPRIA AVCTORIS.

Fabrica pene totius corporis animalis ex cellulosa tela, per experimenta euicta *a*). Pericardii vera historia et adhaesiones *b*).

Constitutus annulus venosus valvularum cordis continuus *c*), et minutae earum valvularum affectiones.

Cordis euolutio *d*). Ventriculus sinister primigenius est; post eum sensum dexter subnascitur: auris communis primum extra cor est, tunc in cor retrahitur, et in duas aures discedit.

De cordis motu: non pallere idem *e*), et de aliis eius affectionibus.

Cordis maxima irritabilitas *f*), et inde natus motus perpetuus, per vim stimuli continuatus.

Experimentum, quo ostenditur, ablato sanguine venoso dextro, sinistras cordis partes superuiuere vltimas *g*).

Sanguinis motus non multum tardatur in minimis *h*) vasis per experimenta.

Ponderis vis in sanguinem venosum *i*).

Vasa minima non sunt contractilia *k*).

Vis deriuationis et reuulsionis *l*).

Motus sanguinis a morte superstes ab attractione natus *m*).

A 2

Aneurysma

a) *Elem.* I. p. 19. 22. Non ita *ALBINVS*; sed cuique parti suam substantiam esse praeter vasa, *Annor.* L. III. p. 15. Mea esse fatetur, non ille aequus mihi, *Marherr Commens.* I. p. 127.

b) I. p. 269. seqq.

c) *Ann.* 1737. in disp. de mor. sangu.

d) *Ibid.* form. du poulet. T. II. Sect. VI.

e) *Oper. min.* p. 171.

f) *Oper. min.* T. I. p. 169. in experim. et in Comm. Gott. T. II.

g) *Comm. Gott.* T. I.

h) L. VI. p. 195.

i) *Oper. min.* T. I. p. 129.

k) L. VI. p. 210. *Oper. min.* I. p. 88.

l) L. VI. p. 214. post aliqua experimenta *Ant. de Haide.*

m) *Oper. min.* I. p. 28. seqq.

Aneurysma verum et varix artificio parari possunt *n*).

Maiores crassities tunicarum arteriosarum a debili sanguinis motu: minor crassities a plethora *o*).

Pulsus venosus ab inspirationis viribus *p*) natus, qui sanguinem in pulmones inuitat.

Pulsus venae pulmonalis *q*).

Musculos intercostales omnes costas leuare, demum per experimenta euictum *r*).

Costarum rotatio *s*), et reliqua respirationis phaenomena exculta.

Mammariarum arteriarum rami magni ad diaphragma *t*) dati.

Arteriarum intercostalium et mammariarum pulcherrimi annuli, et anastomoses cum vasis thoracis externis *u*).

Trunci quatuor arteriosi thoracici constituti *x*).

Aërem nullum esse in thorace *y*) per experimenta ita euici, ut neminis nunc meminerim, qui contrariam opinionem tueatur.

Tendines sunt infensiles *z*).

Et ligamenta *a*).

Et dura cerebri membrana *b*).

Cerebri piscium fabrica *c*).

Arteriae cerebelli et cerebri pleraeque constitutae *d*).

Et arteriae medullae spinalis *d**).

Emissaria plusscula *e*).

Constitutus per experimenta motus cerebri, qui respirationi obedit *f*).

Cerebelli nulla maior dignitas *f**), nec callosi corporis *f***).

Nervi

n) *Oper. min.* p. 85. 99.

o) *Oper. min.* p. 88.

p) *Conf. L. VI.* p. 332. *Oper. min.* I. p. 131 seqq.

q) *Oper. min.* I. p. 144.

r) *Oper. min.* T. I. p. 283 seqq.

s) *Ibid.* p. 288 seqq.

t) *Fascicul. VI.* In venis aliquid simile *FALLOPPIVS* habet.

u) *Ibid.*

x) *Ibid.*

y) *Oper. min.* I. p. 301.

z) *Oper. min.* I. p. 332 seqq. *Comm. Gott.* T. II. p. 113.

a) p. 341.

b) p. 345.

c) *Elem. physiol.* IV. *fin.* *Oper. min.* T. III.

d) *Fascic. VII.*

*d**) *Ibid.*

e. *Fascic. I.* et *Elem.* T. IV. p. 166. 167.

f *Comm. Gott.* T. II. et *Elem.* T. IV. p. 171 etc.

*f**) *Element.* T. IV. p. 353.

*f***) Etiam eo loco.

Nervi molles ab intercostali *g*) ganglio primo nati, post aliquas LANCISII voces. Thyreoidea arteria inferior pene tota *g**).

Vis insita musculorum, per suos limites constituta *h*).

Vis nervosa non eget continuitate cum cerebro *h**).

Classis musculorum vitalium magis irritabilis, animalium minus *h**).

Vasa vitrei corporis in piscibus *i*).

Et campanula lentis crystallinae *k*).

Zona ciliaris auium *l*).

Arteria ophthalmica pene tota *m*).

Iris non est irritabilis *n*).

Arteriae dentales pleraeque *o*).

Ductus ad STENONIANVM accessorius *p*).

Sublinguales ductus, longi et breues *q*).

Arteriae oesophageae pleraeque *r*).

tum palatinae *s*).

pharyngeae *s**).

Ventriculi humani fabrica musculosa, et stratum fibrarum intimum *s**).

Ventriculi cellulosae telae post paucas voces priorum *t*).

Omentum colicum *u*).

A 3

Omenti

g) *Art. maxill. tab. ad fin. Orig. nerv. intercost. n. 17. Elem. T. IV. p. 256.*

*g**) *Fascicul. III.*

h) *Comm. Gott. T. II. Element. IV. p. 449 seqq.*

*h**) *Element. IV. p. 364.*

*h***) *Elem. IV. L. XI. sect. II.*

i) *Element. physiol. V. p. 391. 392.*

k) *p. 391.*

l) *Form. du poulet, T. III.*

m) *Fascicul. VII.*

n) *Oper. min. p. 372.*

o) *Tab. art. maxill. et Fascic. VIII. et Elem. T. V. p. 30.*

p) *Fascicul. III. tab. art. labial.*

q) *Element. physiol. VI. p. 48.*

*r**) *Fascic. III.*

s) *Fascicul. II. tabul. arter. maxillar. Fasc. III. tab. arter. pharyng.*

*s**) *Comm. BOERHAAV. T. II. et Fascicul. III.*

*s***) *Cl. de FOVCHY hist. de l'Academ. 1761. p. 32. Cl. BERTINO tribuit, qui anno 1746, cum de equi ventriculo ageret, eius inuenti mentionem fecerit, cum ego anno demum 1751 eadem descripsim. Non recte Descripsi anno 1747. Voces enim eius editionis prim. lin. n. 524 eadem sunt cum vocibus editionis anni 1751. Deinde tomus Commentariorum anni 1746 anno demum 1751 aliquot adeo post meas primas lineas annis produit: Quae ita dicta volo, nihil ut inde decedat Cl. BERTINI laudibus.*

t) *Elem. T. VI. p. 132.*

u) *Progr. anni 1742.*

Omenti lamina posterior veterum verum est mesocolon *x*).

Arteriae pancreaticae pleraeque *y*).

Vena umbilicalis in fetu *z*) ramos dat in hepar, qui in homine adulto fiunt rami venae portarum.

Intestinorum tela cellulosa tertia *a*), post paucas voces priorum.

Mechanismus, quo coeci intestini facies sensum mutatur *b*).

Valvularum coli mensurae et varietates *c*).

Arteriarum capsularium tres classes *d*).

Vretericae *e*).

Haemorrhoida media *f*).

Perforantes magnae femoris, vtraeque praeter aliqua priorum *g*) vestigia.

Articulares genu, praeter aliqua verba priorum *h*).

Anastomoses ramorum superiorum cum inferioribus sub genu praeter priorum paucas voces *i*).

Sic arteria tarsea *k*).

Perforantes tarsi etc. *l*).

Arteriarum superiorum cubiti cum inferioribus pleraeque anastomoses *m*).

Arcus dorsalis cubiti *n*).

Arcus carpeus *o*).

Perforantes carpi *p*).

Interossea dorsales *q*).

Interossea mediae *r*).

Herniae congenitae: vagina pro teste in fetu praeparata *s*).

Testis in peritonaei cauea est, dum homo in vtero geritur *s**).

Vascula efferentia testis; et rete testis *t*) cellulosum vasculosumque.

Vesicula

x) Progr. anni 1742.

y) Fascicul. II. et Elem. T. VII. p. 131. seqq.

z) De feru bicipite anno 1739. tum in prim. lin. n. 833.

a) Prim. lin. n. 705.

b) Prim. lin. n. 730.

c) Progr. anni 1742.

d) Fascicul. III.

e) Ibid.

f) Fascic. IV.

g) Fascicul. V.

h) p. 23.

i) Ibid.

k) Ibid.

l) Ibid.

m) Fascicul. VI.

n) Ibid.

o) Ibid.

p) Ibid.

q) Ibid.

r) Ibid.

s) Progr. anni 1749. Elem. physiol. T. VI. p. 373. T. VII. et opusc. path. p. 53.

*s**) Ibid.

t) Progr. anno 1745 edit. et in Phil. Transact. Tum in Elem. physiol. T. VII.

Vesicula seminalis est intestinum ramosum *u*).

Corpus luteum oritur ex conceptione *x*), neque prius paratum adest.

Vrachus est ductus ad vesicam vsque apertus, quem replere facile sit *y*).

Foraminis ovalis et ductus arteriosi proportiones, et causa commutationis *z*).

Fetus sero apparet, eiusque in quadrupedibus prima phaenomena *z**), inque auibus *z**)).

Fabrica vitelli *a*).

Incrementa ossium *b*).

Mutatio ex gelu, rimae, opacitas etc. *c*).

Vasa ossis longa *d*).

Circuli vasculosi *e*).

Hemisphaerium vasculosum *f*).

Vascula cartilaginea intima *g*).

Formatio partis alveolaris *h*) ossis.

Et nuclei ossei *i*).

Haec omnia fusius exponuntur in *Iconibus anatomicis*, quarum ab a. 1741 ad 1756 octo fasciculi Gottingae prodierunt, tum in *operibus anatomicis minoribus* Laufannae 4 a. 1762, 1767 et 1768 editis, multo plenioribus, quam in Gallicis editionibus. Hos libros rogo, vt Lector hoc nostro cum opere conferre velit.

Commentarii in BOERHAAVII Praelectiones ab anno 1739 ad 1744 editi pertinent ad tempora definienda diuersarum a PRAECEPTORE opinionum, sensim a me receptarum, si contuleris cum primis lineis physiologiae anno 1747 et 1765 Gottingae excusis.

u) *Progr.* anno 1745 edit, et in *Phil. Transact.* Tum in *Elem. phys.* T. VII.

x) *Praef.* ad T. II. operis BUFFONIANI versionem germanicam.

y) *Prim. lin.* n. 837.

z) *Progr. de valu.* EVSTACHIAN. in *Fascicul.* IV. tum *Elem.* T. VIII.

*z**) *Oper. min.* T. III.

*z**) T. II.

a) *Ibid.* Sect. XI.

b) *Traité de l'accroissement des os.*

c) *Ibid.*

d) *Sect.* VI.

e) *Ibid.*

f) *Ibid.*

g) p. 201. etc.

h) *Sect.* V.

i) *Ibid.*

DE PRAECIPVIS
CORP. HVMANI PART. FVNCTIONIBVS.

LIBER PRIMVS.
CORPORIS HVMANI ELEMENTA.

SECTIO I.

FIBRA.

Pag. 2. l. 13. etiam *lege* forte etiam

ibid. l. 16. *dele* pilos

ibid l. 20. *post Kaaw BOERHAAVE h) adde.* Hoc est stamen primum, ex quo epidermis, epithelium, vngues, pili, demum totum corpus formatur *h*)*. Aliter visum fuerat Ill. ALBINO, qui cuique corporis parti suam propriam naturam esse docuit *h**)*. Mihi quidem de cerebro dubium superest, et de vniuersa medulla neruosa, de reliquo corpore nullum videtur dubium esse, nisi forte fibrae musculari alia natura est.

ibid. l. 24. Solidum elementum terra est --- HENKELIO auctore *lege* Solidum elementum terra est, de calcario genere *i)*, a'iquantum tamen diuersa, quod in calcem viuam non abeat, quod cum acore in nullum salem medium combinetur, quod cum spiritu salis in gelatinam coeat, quod cum acore vitriolico non ferueat, quod ab aceto nihil patiat, quod a nitroso acore lente soluat, quod difficulter vitrescat, et demum in lacteum opacum vitrum conuertatur *k)*.

p. 3. l. 2. aëri *lege* aëui

ibid. l. 6. nuper *lege* anno 1751.

ibid. l. 24. *post ENHÖRNING adde* de Episcopi corpore quinque seculis, vt videbatur, superstit, auctor vitae LVDOVICI XI. Delphini.

p. 4. l. 2. *post* obseruantur *adde* Huc pertinet nuperum elegans experimentum. De capillo annulus suspenditur; igne absque aëris motu capillus in cinerem redigitur; sustinetur de cinere haecenus annulus, tamen vt cadat, si minimus motus

h) Gorter Chirurg. n. 289.*

*h**) Nat. Homin. p. 36.*

k) lege HENKELII Flora Saturniz. etc.

motus accesserit. Apparet absque vinculo glutinis leuissimum esse nexum elementorum terreorum.

p. 4. l. 8. *post* parcius *adde* Quod eo promptius admittas, cum in ligni cineribus vbique reperiatur.

ibid. l. 17. *post* Buta *adde* in cornu cerui vsto cum oleo cocto, soliditatem recuperante; mechanicae enim cylindrorum cohaesiones docent, quae obtinentur aqua interfusa, et etiam magis oleo.

p. 5. l. 9. *post* efficit *adde* et duae tertiae partes ossis dissilantur.

ibid. l. 13. *post* BERTIN *adde* Incredibile est, in primis initiis gelatinosi ossis, quam parua squamula de integro femore in experimentis nostris superfuerit.

ibid. l. 24. *post* supersit *adde* Sed etiam gluten ex ossibus obtinetur, acore superfuso, deinde lixiuo, vt terra fundum petat.

p. 6. l. 2. Idem fere ostendit --- interpositum conseruet l. Sed etiam frequens est membranarum in gelatinam conuersio, et vicissim gelatinae in membranas. Ipsa sponte gelatina fila trahit; ex albuminosa parte sanguinis agitando fila parantur et membranae, quod alibi repetemus, et frequentissime ex gelatinosa aquula pericardii, cauique pectoris verissimae membranae nascuntur, quibus pulmo ad pleuram reuincitur. Morbus stridulus, quem Scoti *Croup* vocant, a muco solo in aspera arteria in membranam spuriam coacto provenit.

Vicissim in gelatinam membranae resoluuntur. Ipsa vis morbi ventriculi et intestinonem, aliasque membranas in gelatinam resoluit. Ichthyocolla, quae ipsa est interior tunica vesicae natatoria, cum aqua et cum debili frumenti spiritu in gluten abit.

ibid. l. 20. *post* aperuit *adde* deinde ego, inde nuperi Angli in physiologiam receperunt.

p. 7. l. 7. *post* nequit *adde* Nuper video in hac mea theoria et glutinis aquosi atque oleosi vim elementa terrea colligantem viris Cl. displicere, et aërem. Nihil horum meum est. Aërem apud Cl. STEPHANVM HALES inueneram, eo vtique vsus, dum ab aliis physiologiae scriptoribus negligebatur, gluten ipsius est BOERHAAVII.

Sed neque causam video, cur a sententia recedam. Esse in fibra aquam et oleum, certum est: ex his elementis gluten fieri, certum est, eo praesente elementa terrea coniungi, eo vtunque destructo discedere, perinde certum est. Particulae terrae non videntur se trahere sibi relictæ; nam et in gypso, et in calce

pag. 6. Not. h. *adde* VRBANVS HIAERNE sulphur habebat pro praecipuo corporum vinculo. *Alit. laborator. p. 90.*

calce moleculeae durissimorum lapidum in pollinem non cohaerentem abeunt, idemque gypsum in lapidem continuo redit, quando aqua amissa ei reddita est.

De aëre ne verbum addo: frequentissima nostro aevo in aëre fixo experimenta fiunt, neque vllum est ex millenis, quin confirmet, nulum corpus in elementa dilabi, nisi is aër per ignem, per putredinem, aut aliam aliquam violentiam fuerit abactus. Neque vllum corpus putrescit, quin aër prius fecedat *m**). In ossibus parciorem esse *m****) noui. Non ignoro claros viros esse, qui hanc aëris efficaciam reiiciant *m****). Neque tamen video, cur reiiciant.

ibid. l. 18. *dele* Idem est stamen solidum IOH. V. GORTER, Celeberrimi nunc Russiae Archiatri, cum nota huc spectante.

p. 8. l. 15. *post* contrahit *adde* Non ideo nulla fibrae vis contractilis est: inest et in viuo animali, et in mortuo, etiam in sicca cute, in animalium intestinis, certe in elasticas chordas contortis. Dum humecta est, fibra se contrahit minus rapide, quam muscularis fibra, vt minori ad longitudinem suam ratione decurtetur: sed dudum sicca membrana discissa se retrahit, chorda vero etiam validissime se conuoluit. Id volo, ferrum enim non sentire fibram, telam cellulosam, membranam, neque perinde adeo, vt muscularis fibra, conspicua pollere irritabilitate.

ibid. l. 20. *post* descendant *adde* Putredo aëri fixo naturam elasticam, et leuitatem reddit, qua corpus reddit natatile, in quo euoluitur.

ibid. l. 24. *post* oculo *adde* squamas cartilaginum.

SECTIO II.

TELA CELLULOSA.

Pag. 9. l. 9. *lege* carotidem sub cranio illigat.

p. 10. l. 15. *post* agnouit *adde* Nuperiora sunt de hac membrana THEOPHILI DE BORDEV, eiusque asselarum merita, qui textum fere mucosum dixerunt. Mireris autem omnino, cum tanto nuperior sit aut me, aut SCHOMBINGERO, ei viro adeo magno consensu Gallos tribuisse, quae nos non solum vidimus priores, sed diximus: mea enim experimenta prius, vt aequum est, facta, anno 1747 in *primis physiologiae lineis* descripta sunt.

pag.

*m**) BERTHOLET de l'air.

*m***) WIEGLEB von der Gahrung, p. 130.

*m****) BERTHOLET, SMETH de aëre fixo.

pag. 10. l. 14. notissimam *lege* notissimum

ibid. l. 21. externa *lege* interna

ibid. l. 24. arachnoideae nomine - - - amplectitur, *lege* arachnoideam inter et
piam membranam cerebri et cerebelli exterior piam amplectitur.

p. 11. l. 1. *lege* fibram carneam vllam, liberam arteriam vllam q*) etc.

ibid. l. 8. *lege* totum vasorum, neruorumque fasciculum ad etc.

p. 12. l. 1. aquam *lege* mucum

ibid. l. 4. *post* lignum *adde* Sed etiam vasa plantarum teneriorum certe et iuniorum cellulosa tela replentur. In cristis et palearibus auium similis, sed sanguinem receptura, subest cellulositas. Demum in ossibus planis manifesto ostendimus cellulosum rete, quod ossi pro fundamento est, quod idem lymphæ in areolas deposita abit in gelatinosam cartilaginem, terra vero in eadem spatio-la effusa in os u*). In ossibus longis eandem fabricam Cl. HERISSANT ostendit, et demum in testis u**).

ibid. l. 21. *post* secedat *adde* Legas ipsum vrsu huius arcani artificii non ignarum esse, et cadauera inflare y*), vt cutis decedat.

ibid. l. 26. *post* facit *adde* Demum nuper scriptum est, Nigritas orae Dentariae, vt rheumatismo incedantur, cutem bono euentu sufflare, idque auxilium etiam Belgas bono euentu imitatos esse c*).

p. 13. l. vlt. *post* MANN *adde* ex vulnere frontis emphysema ad abdomen continuatum s*).

p. 14. l. 5. *post* BEGGI *adde* Aqua in abdomen animalis impulsâ ipsam inter duram, piamque matrem apparet u*).

ibid. l. 29. *post* effluerunt *adde* Qui toto corpore tumebar, is norat eum humorem totum in maiorem oculi angulum compellere e*).

B 2

pag.

pag. 10. not. o. *adde* Conf. de his vaginis BORDEV *tissu muqueux* p. 45.

q*) GORTER l. c. In panno libera, neque connexa fuisse cum albugine a SCHVLZE et SCHAFNER *mechan. cur. vuln.* Sed ego manifesto cellulosam telam, eamque pinguem circumiectam vidi.

u*) *Mem. sur la struct. des os.* CRVWEL *osteogener.* Qui statum de cellula in cellulam transiisse vidi.

u**) In *Mem. de l'Academie des scienc.* etc.

p. 10. ad verbum distendet in *textu adde* not. Cl. ABADIE nuper experimenta fecit, aërem adegit in cellulosam telam; ita emphysema natum est, quod abdomen, faciem, palpebras, semora, pulmones, pericardium, lienem, vniuersum corpus occupauit.

y*) KALM *resa* II. p. 246.

c*) GALANDAT *Mem. de l'academ. de Berlin, 1772.*

s*) GOOCH *Wounds*, p. 292.

u*) ABADIE.

e*) ROBERT *traité de med.* I. p. 15.

p. 16. l. 2. *post* PAREVS *adde* In homine porro videas per eandem telam cellulofam aquam moueri, quae circa talum effufa, oedema fecerit. Ea quotidie per stationem, ambulationem, et calorem afcendit ad furam, peneque ad genu furgit, non vltra, nifi cum periculo. Eadem nocturnam per quietem latius diffufa euaneſcit. Neque rarum eſt, in pectore collectum humorem per peſtiluuiam, ſponteue ſua ad pedes praecipitatum, leuamen facere refpirationis, per nocturnum decubitum ſtationem circa pectus repetere, et ſuffocationem minari. Hae ſunt viae arcanæ, per quas abſceſſus mouentur, abſque vaſculis, per quae humor fluat, etſi iam eo acuo aliqui ea vaſcula vidiffe voluerunt, CAELIO dicti *y**).

Per cellulofam telam in plantis vaſa *y***) omnia mouentur, non ideo in homine, vti nuper paradoxo viri HARVEIANO per vaſa circuitui iter per cellulofam telam ſubſtituere conati ſunt.

ibid. l. 4. *post* capite *adde* Omnes membranae extus cellulofae ſunt *z**).

ibid. l. 8. retro *lege* pone.

ibid. l. 29. Obſcuriora alia interim - - ſolo a pondere *lege* Prima cauſa motus adipis per cellulofam telam eſt vis mortua cellulofae telae, cuius quodque filum, quaeuis lamina, in contractionem nititur, ſpatiola fibris, laminisque interpoſita arctat, ita humorem eo premit, vbi minor eſt reſiſtentia.

Accedit huic vi compreſſio muſculorum, dum in contractione turgent, et ſpatia cellulofa ſibi interpoſita comprimunt. Cutis ipſa lenta vi mortua contrahitur, et adipi diſtendenti reſiſtit, eumque reprimi. Arteriae, quibus cellulofa tela vndique percurritur, et quae in quoque pulſu vaginas ſuas, et circumiectam cellulofam telam comprimunt, adipem et ipſae vrgent. Denique pondus humorum eos regit, vt vel tumor vespertinus pedum demonſtrat, et matutina detumeſcentia in oedematibus, et leuamen inſigne *z***).

Ab humorum motu per cellulofam telam impedito obſtructiones, et abſceſſus fieri nuperi *z****) docuerunt. Lentiffima vero ea mala eſſe ex lento motu apparet, cui ſuſſaminato debentur.

p. 17. l. 9. *post* poſſunt *adde* Et haecenus omnino ad temperamentorum cauſas, firmique aut debilis ſtaminis diſcrimen cellulofa tela ſpectat. Induratur eadem, et inter cauſas eſt praecipuas non rugarum ſolum, quae ſenii ſunt indices, ſed ſenii ipſius, quod ſuo oſtenditur loco. Adeo duram fuiſſe vidi, vt ſola

*y**) Chron. V. p. 10. 587.

*y***) fluida haud dubie legendum eſt. Not. editor. hui. auctar.

*z**) BONN continuat. membranar.

*z***) p. 33.

*z****) BORDEV *iſſu muqueux*, p. 66.

*) *post* 230 *adde* In canibus SARCONE II. p. 259.

sola femora in curvitatē contraheret, artumque fecerit obstipum, cum nulla alia mali causa conspicua adesset.

Quare *tonum*, quem STAHLIUS tanti facit, in tela cellulosa residere tuto ponas, quae vasis circumposita ea constringit, et comprimit, et vicissim a dilatatis suis per humores vasis ipsa vrgetur. Inde illa, quae in ranis faciebam, aneurysmata, cum cellulosam telam delerem, quae arterias mesenterii ambit.

Hanc telae cellulosae vim contractilem, et potestatem robur fibrae muscularis in nuperi *a*)* vulgo agnoscunt *a**)*.

pag. 18. l. 5. *dele* Valvula coli intestini - - ipsa evanescit cum nota huc spectante.

ibid. l. 20. *post* efficiat *adde* aut demum pro sanguinis et receptaculo, et motore, et praeparante organo.

ibid. l. 24. *post* adscripsit *adde* Non sentire iam GALENUS vidit, neque ei sensus tribui debet, qui transeuntium nervorum est. Si propter nervos sensibilem esse reclamaveris, nihil agēs, nisi quod cellulosae telae tribuas, id quod fatearis nervi esse *l*)*. Qui omnia alia a nostris docere malunt, in principio suo parum sentire fatentur, in aponeurosis magis *l**)*. A pia vero meninge oriri, aut cum ea continuari non video *l***)*, utique cum dura membrana.

S E C T I O III.

M E M B R A N A E.

Pag. 19. l. 7. *post* reperio *adde* Nunc haec vulgo nota sunt, et recepta.

p. 20. l. 26. *post* separare *adde* Sed etiam putredo vterum in cellulosam naturam restituit.

p. 21. l. 7. *post* sodalibus *adde* Eaedem durae, perque morbum natae cystides pariter macerando, aut putredine in priorem cellulosam naturam, originis suae non immemores, reuertuntur.

B 3

ibid.

a)* Laborat certe haec periodus quodam vitio; ego legerem: *et potestatem robur fibrae muscularis augendi nuperi vulgo agnoscunt*; nam haec, si quid ego hic iudico, BORDEVII, la CAZII etc. mens est. Not. editor. hui. auctar.

*a**) La CAZE, BORDEV, ROBERT, FABRE. Mihi tribuit Cl. MAKITTRICK, practice p. 38.*

c) lege Coriago in qua pellis ossibus haeret, COLVMEILL. L. VI.

l) BORDEV rissu muqueux.*

*l**) La CAZE.*

*l***) Idem.*

pag. 22. not. y. *post* 164 *adde* ACRELL chir. haendelsf. p. 107.

ibid. l. 24. dudum *lege* ante quinquaginta annos.

ibid. l. 31. *lege* vt in frummarum membranis, in ouarii, in lienis inuolucro frequens est.

ibid. l. 32. *lege* idoneos interim testes

pág. 22. l. 4. *post* differunt *adde* Demum satis nunc constat, ossa fieri duplici parte, tela cellulosa cum vasis sanguineis, et materia calcarea inorganica, in eas cellulas effusa, vt possit cellulosa natura ossi reddi, si acido aliquo liquore calx illa deleta fuerat a*).

ibid. l. 13. Is enim, vt monui, *lege* Medulla enim nervosa, vt monui etc.

ibid. l. 15. *post* prodita *adde* quo anno, post multa experimenta mea, in primis physiol. lineis hanc fabricam membranaceam descripsi:

ibid. l. 27. *post* receperunt *adde* et nunc fere omnes.

p. 23. l. 4. *lege* Eam clarius proposuerunt EDMUNDVS KING et JOSEPHVS DUVVERNEY etc.

p. 24. l. 6. *post* non est *adde* Nuper demum, etiam microscopio acerrimo adiutus, I. B. A TORRE fila cellulosa vasa esse defendit.

ibid. l. 7. nuper *lege* ante viginti annos.

ibid. l. 8. *dele* nunc a paucis retro mensibus.

ibid. l. 19. *post* viscerum *adde* Non ergo vniuersum corpus vasis fieri.

p. 25. l. 6. *post* secant *adde* A vasorum natura fila cellulosa longe distant, quae breuissima sunt, multo latiora vasculis, truncos non habent, neque ramos. ALBINVS porro, ne quis criminetur, me ad consensum magni viri prouocare, qui longe a me dissideat, hactenus contraria meorum constanter docuit, vt cuique parti corporis humani proprium esse, suiue generis, stamen defenderet. Mihi vero, praeter fibram musculosam, et medullarem nihil occurrit, satis notis dotibus a cellulosa tela diuersum.

SECTIO IV.

ADEPS.

Pág. 25. l. 12. *post* attrahuntque *adde* Nunquam autem potui in his cellulis discernimen videre, nisi volueris laxiorem telam, magisque vicinam cuti adiposam vocare

p. 22. a) *lege* Cl. FOYGEROVX.

a*) Ill. de la SONE in Comm. Acad. Reg. Scient. Paris. ann. 1751.

p. 22. b) *post* 46 *adde* et SARCONE *Vajuolo* p. 67. 68. Mihi tribuit inuentum non blandus homo in T. I. *praelect.* p. 128. Cl. MARHERR. Huc et LOESEKE *physiol.* p. 21. et ROBERT *per. ver.* p. 75. et fere Cl. VAN GEVNS *de vira*

vocare, et cellulosa nomen ei seruire, quae filis fere absque lamine fiat, eademque tota macilenta sit. Nam et certus sum, adiposa laxa spatia cum tenerrimis, filorum intervallis communicare, ut aër de pectoris vulnere exiens inter oculi tunicas sibi viam aperiat, et gelatinam perinde in adiposis magnis cellulis vidi, natum exemplo, ut in tenerioribus spatiosis.

pag. 25. l. 24. *post* distinguit *adde* quem nuper et aliqui Angli sequuntur.

p. 26. l. 19. *post* HOFMANNO *adde* Sic infectis pinguedo rotundis fere globulis fit.

p. 27. l. 5. *lege* absque conspicuo adipe.

ibid. l. ead. verticales *lege* caluae subiectas.

ibid. l. 7. In piscibus tamen marinis cerebrum natat *lege* Neque enim hic de adipe mihi sermo est, qui plurimus ad ignem de cerebro stillat: et quod oleum in piscibus duram inter cerebri matrem, et cerebrum plurimum reperitur, id a cerebri humani natura in vniuersum longe diuersum est.

p. 28. l. 2. *lege* et buccinatorem etc.

p. 29. l. 7. *post* amisit *adde* In auibus aquaticis, et in struthio camelo fluidus adeps est, ut huc illuc concutiendo agi, et omnis per vnum cutis vulnus educi possit. In vrsos, certe boreali, pene fluidus est. Fulica fluidum oleum in faciem hostium expulit.

ibid. l. 10. *post* incipit *adde* cui tamen mollior, quam aliis herbiuoris, adeps est.

ibid. l. 15. *post* CARDANVS *adde* Quibus totus adeps sebaceus est.

ibid. l. 22. *post* cogitur *adde* Femur militis in cartilagineum pene adipem degenerans nuper descripsit I. WILDRICK (*).

p. 30. lin. 2. *post* transit *adde* Insectorum adeps granosus est (*).

ibid. lin. 11. *post* feruet *adde* Maiori calore bouis adeps eger, ut fluat, minori equi adeps; iterum minori felis, ut animalis carniuori.

ibid. l. 13. *post* fluit *adde* et in morbis malignis perinde olei in modum manat.

ibid. l. 15. *post* corrosurus *adde* Nupera aliqua per experimenta Neapoli facta valde volatilis, totus visus est de vitris diffilari, ut etiam per poros transiisse videretur.

p. 31. l. 18. viridem *lege* rubrum.

p. 32. l. 12. *lege* quare adeps et medulla sero putrescat.

ibid. l. 13. quod *lege* cuius pars.

pag.

1*) Hedend. letter - Oefening. IV. n. 2.

o*) CAROL. DE GEER Mem. pour servir a l'histoire des insectes, II. p. 2. p. 713.

pag. 32. l. 15. *post* experimenta *adde* Magnam partem adipis in pus abiisse, nuper SCHREBERVS vidit z*), et de parte puris fatetur BORDEV, etsi succos albuminosos admisceri pinguibus non repugno.

p. 36. l. 13. *post* conatu *adde* impulsus.

p. 37. l. 24. *post* dedi *adde* Ex mensibus repressis, in scorbuto frequens est, sanguinem macularum specie per vniversam corporis superficiem effundi, et denique manare, et sub epidermidi passim, et per internas vesiculæ felleae, ventriculi, et intestinorum membranas. Latius etiam effundi vidi aliquoties aut a dato arsenico, aut a repetito vsu antimonii emetici, vt late in ventriculo sub tunica musculari in cellulosa secunda sanguis effusus rubentes *) in manibus consisteret.

p. 38. l. 21. *post* oberrat *adde* quod saepe vidi, et suo loco dicam.

ibid. l. 24. *post* contigit *adde* mihiq; aegre sperabilis videtur.

ibid. l. 26. *post* RVYSCHIVS *adde* In vrina, quae de sanguine secedit, adeps minime rarus est, in renum tabe, et in lue venerea.

p. 39. l. 8. *post* animi *adde* et tranquillitas r*).

ibid. l. 14. *post* notum est *adde* Sic boues, quibus fatigatis ossa absque medulla fuerant, eam quiete recuperant.

ibid. l. 22. *post* arcentur *adde* Veteribus modus erat notissimus, quo corpora redderent ex aridis luculenta. Ferulis percutiebant eas partes, quas volebant crassescere e*). Id ad laxatam telam cellulosa refero.

ibid. l. vlt. *post* rapidae sint *adde* Qui obessimus obiit, virili tamen demum aetate id adipis incrementum senserat e**).

p. 40. l. 9. *post* faginant *adde* Alii venae sectioni purgationem addunt h*).

ibid. l. 20. *post* congerat *adde* Potentius etiam adeps obesitatem adiuvat l*).

p. 41. l. 13. *post* plenum est *adde* Opium etiam in aqua dissolutum, et sub cutem impulsus, soporem exitauit, quem solet per os assumptum, vt vim stuporiferam in venas resorberi necesse sit p*). Adeo vehemens huius medicamenti actio in venis fuit, vt eam superaret, quam deglutitum exercet, et bestiolam occideret.

Aër ipse sub cutem inflatus, aut in experimento, aut per vulnus, post aliquot dies, resorbetur et euanescit.

pag.

z*) p. 559. (*Abbildungen der Saugthiere*, vt equidem opinor; nam ipse liber ad manus non est. Not. edit. hui. auct.)

*) *Videtur rubens legendum esse.* Not. edit. hui. auct.

r*) FARRE *inquiry* 310.

e*) GALEN. *meth. med.* XIV. c. 16.

e**) BORDEV *malad. chronique*.

h*) SLOANE *voy. to Jam.* préf. pag. LXXXIV.

l*) HEWSON *inquiries*, p. 127.

p*) MONRO *Ess. phys. and liter.* III. p. 310.

pag. 41. l. 21. *post* testimonio *adde* In Islandia sebum ouibus iter facientibus disparere adeo vulgo notum est, vt de decem sebi libris quotidie selibram decedere lege statuatur y*).

Vniuersi fucci armentorum pariter per aestum factum exhauriuntur y**).

p. 42. l. 5. *dele* aut in abdomen non modicas in glebas coagulabilis effunditur.

ibid. l. 11. *post* documentum est *adde* Nuper haec a non nemine h*) reiici non ignoro, videntur tamen certa habere testimonia. Sed in abdomen etiam adipem effundi RYVSCHIVS, idoneus testis est, quando equi vehementi cursu defatigati fuerant. (Huc etiam spectat not. g.)

ibid. l. 23. *post* adeps est *adde* Boues a lue epidemica, quae maligna peripneumoniaputridi ingenii est i*), et oues ab hepatis corruptela misere emaciantur, vt ne medulla quidem in ossibus superfit. A dysenteria subito adeps disparuit i**), et in diarrhoea pingui bouum, quae in Gebennis saeuit. A copia puris, a longa gonorrhoea, enormem macilentiam FACVNDINVS ANGELINVS vidit i***).

ibid. l. ead. *dele* Ergo.

ibid. l. ult. *post* ossibus *adde* Colica pictonum carnem omnem consumsit o*), vt solae membranae superessent.

p. 43. l. 6. *post* natarent *adde* perinde vt equis, sed et vomitu idem reiectus est u*).

ibid. l. 10. *post* hydrargyri *adde* et saponis, a quo 28 libris hominem lego leuiorem factum.

ibid. l. ult. *post* inanes sunt *adde* Mures montani, quando auctumno quieti sedant obesi, macilenti de latibulis prodeunt, sic vrsi et testudines.

p. 44. l. 2. *dele* Non inde continuo - - certe resumit.

p. 45. l. 23. *post* denudatis *adde* deinde in peste Massiliensi idonei testes.

p. 46. l. 15. pectorali lege peritonaei

ibid. l. ead. *dele* prior illa

pag.

y*) OLAFSEN l. p. 189.

y**) LISLE agricult. II. p. 10.

h) *post* 57 *adde* Adipi similem materiem esse. GVERINIERE Ecole de Cavall. II. p. 150.

h*) GARSVLTI, p. 205.

i*) SAVVAGES sur les malad. des bestiaux, p. 112.

i**) DEGNER p. 18.

i***) Venae scilicet. p. 28.

m) lege LISTER de variol.

o*) de HAEN colic. pict. p. 110.

u*) GESNER Samml. I. p. 177.

p. 48. excitauimus in textu *adde* not. x*) Id. p. 85.

pag. 48. l. 6. *post* reparent *adde* Visa enim sunt animalia cum sua pinguedine de latebris prodiiſſe, et ipſi ſubinde vſſi.

p. 49. l. 6. *lege* ab vſſo quadrupedis oſſe etc.

ibid. l. ead. *post* crediderim *adde* Leonis oſſa, contra veterum opinionem, habent medullam *b*)*). Onocrotalo nullam eſſe, et in aliis auibus alte volantibus, certum eſt, quarum oſſa aëre replere neceſſarium fuerit. Nulla in teſtudinē erat, cauſam ignoro *b**)*).

ibid. l. 12. *post* oſtendetur *adde* In oſſibus enim fere meram lixiuiolaſam naturam reperimus.

p. 50. l. 10. *post* 500 *adde* 565, 569

ibid. l. 11. *post* 600 *adde* et 609 et demum ad 800

ibid. l. ead. *post* ad *adde* 2540 *r*)*

ibid. l. 12. *post* 2800 *adde* et 3520 *t*)*

ibid. l. ead. *post* pondus eſt *adde* Sus non magnum animal ſupra 600 libras *t**)*).

ibid. l. 20. *lege* viui ſuis

p. 51. l. 19. *post* vidit *adde* In femore duro adipe pleno muſculi euauerunt *i*)*).

ibid. l. 24. *post* ſcripſi *adde* Pluſcula autem ſunt exempla hominum, quibus adipis viſ ſibras muſculares ita eliſit, vt lacerti in ſibras diſſoluti quaſi euaneſcerent *l*)*). In fetibus, quibus artus ſuperflui aliqui acceſſerunt, frequenter pro carne merus adeps repertus eſt.

p. 52. l. 1. *lege* nimis ſaepe

ibid. l. vlt. *in fine* *adde* atque renum vicus.

b)* L. a CAPOA *raggionam.* V. p. 153.

*b**)* CALDESI *delle rare.*

p. 49. not. c) *lege* 119.

r)* STATIVS MÜLLER *ſuppl.*

t)* YOUNG *Eaſtrour* p. 81.

*t**)* MÜLLER *ib.*

p. 51. not. i) *post* deſectu *adde* et in *Eph. Nat. Cur.* Vol V. Obſ. 149.

l)* WILDRICK *Hedend. letter-Oſſen.* V. 2.

l)* *Verhand. der Holl. Maatſchapp.* T. XLII. 2. *Mémoires préſentés à l'Acad. des ſciences,* T. VI. p. 301.

ELEMENTORVM PHYSIOLOGIAE

LIBER SECVNDVS.

V A S A.

S E C T I O I.

*ARTERIAE.

Pag. 53. l. 12. Nam *lege* Num

ibid. l. 13. sunt *lege* sint

ibid. l. 14. *post* fluunt *adde* de eo nuper dubitatum est.

ibid. l. 16. De plurimis nunc omnino infectis - - - parallela includantur *lege*

Vasa quidem in multis infectis Cl. viri viderunt, in ephemeræ branchiis, et in alio infecto Ill. de GEER b). Vidit in verme marino, nereide, et arteriosa vasa, et venosa Ill. MÜLLERVS c), vidit in cochlea LISTERV. In cimice vas vniuersi corporis longitudine, ramosum LEDERMÜLLERVS depinxit c*), et in capite chrysalidis c**), et in serpentulo aquatico c***): in animalculis hepatis ouilli vascula adesse videntur, etiam in BIDLOI iconibus expressa.

Neque ideo potest dissimulari, post multa vasorum ramosorum in infectis visorum testimonia, valde fiduciam nostram a Petro LYONNET c†) labefactari, qui admirabili industria erucæ anatomen descripsit. Diserte enim negat, se vasa veri nominis in hoc animali vidisse, qui plenissime tantillæ bestiolæ fabricam persecutus sit. Nullum certe sanguinis circulum in multis animalibus esse Ill. FONTANAE est sententia c††): neque negari potest, in multis vermibus aquaticis cor longum conspicuum esse, nullos tamen ramos conspicuos inde prouenire. Sic alter peritus insectorum contemplator negauit, se aut in rotifero animalculo, aut in infectis vasa reperire c†††). Eam litem senex et infirmus conficere nequeo.

C 2

Id

b) *lege* Memoir. II. P. 2. p. 647. 697.

c) *lege* Wasserwürmer, T. VI.

c*) Microsc. Belust. II. T. etc.

c**) Belustig. II. T. 75.

c***) Ib. III. T. 27

c†) Chenille du Saule.

c††) Viper. p. 146. 147. etc.

c†††) SPALANZANI Opuscoli II.

Id tamen video, quoties alii docti viri corpus aliquod viderunt, non viderunt alii, in vniuersum affirmantium partes potiores esse. Facilius enim oculos aliquid fugerit, exiguum potissimum, quam se obtruserit, quod nulum fuerit.

pag. 50. l. ult. *dele* in anulis

pag. 54. l. 7. *post* inesse *adde* Et in vniuersum nulla esse vasa putes, vbi cor nulum est.

p. 55. l. 22. *pressione lege* aequalibus pressionibus

ibid. l. penult. *dele* quod

ibid. l. ult. *lege* reprimeretur

ibid. l. ead. *dele* exemplo aortae in lumbis et pectore

ibid. l. ead. *dele* quod

p. 56. l. 5. *lege* Venosa in dura meninge receptacula

ibid. l. 10. *lege* quam primum cera repletur

ibid. l. 17. *lege* aneurysmatum verorum

p. 57. l. 6. *lege* et in exitu de pericardio reperio.

ibid. l. 10. *lege* Petrus SENAC, et *adde* in salamandra vir perspicax Laz. SPALANZANVS.

p. 58. l. 20. quae *lege* quare

ibid. l. 21. decrescunt *lege* decrescant

ibid. l. 28. *post* ratione *adde* Demum si aliqua sedes arteriae a corde remotior multo, quam ea, laxior fuerit, quae cordi continuatur, fieri utique poterit, vt arteria eo latior sit, quo longius a corde recedit: id mihi in pulli aorta visum est, qui ovo continetur, cuius aorta alba et firma ex corde prodit, in abdomine laxa, rubra et debilis est, et mihi latior videtur.

p. 59. l. 2. *adde* Erit et his locus.

p. 61. l. 1. *dele* absque pinguedine

ibid. l. 11. *post* redditur *adde* quam remotis cellulosis filis in rectitudinem restituas.

p. 63. l. 8. *adde* In maioribus animalibus, vt aliae, ita haec cellulosa tela tendineam faciem habet.

p. 65. l. 16. *adde* ab Alex. MONRO sen. r*)

pag.

p. 55. not. y) *adde* POLEN. *epist. mathematic.*

p. 56. not. a) *adde* Mem. de Berlin, 1755. p. 34.

p. 62. not. b) Tom. leg. Tab.

p. 64. not. x) *adde* Oper. min. I. p. 229.

ibid. not. y) *adde* Oper. min. I. p. 375. seqq.

r*) ALBINI nomen in noua editione omissum est, quod tamen equidem typographi incuria potius, quam Auctoris suasu factum putauerim. Not. editor. hui. auctar.

- pag. 65. l. 17. *post* intimam *adde* potissimum
 pag. 68. l. 17. A cellulosis filis haec vascula vndique reuinciuntur,
 ibid. l. 24. *adde* a capsularibus
 ibid. l. 26. *post* vbique *adde* in brachio, et pede ex brachialibus et cruralibus.
 p. 69. l. 26. *lege* siue in tertiam quinti paris propaginem se immittit m).
 p. 70. l. 7. debilis *lege* debilior
 ibid. l. 9. *post* demonstraui *adde* Sensu arterias olim carere GALENVS, et nostro aeuo satis consentitur carere.
 ibid. l. 10. *post* portione *adde* neruos
 ibid. l. 11. *post* colligi potest *adde* et ex paruitate lacertulorum musculoform, quos adeunt
 ibid. l. 13. *lege* dum arteriam solam, et absque neruo, vinculo adstringebam n).
 ibid. l. 15. *adde* Arterias minores, et arterias animalium frigidorum, musculosis fibris destitutas, nulli stimulo obsequi omnino videtur. Quam enim musculosam vim in arteria admittas, ubi nullus sit musculus.
 ibid. l. 26. *post* collabitur *adde* aut certe lumen apertum arteriae diminuitur, demumque claudi putatur p*),
 p. 72. l. 10. *adde* Nondum tamen inde euictum erit, num elateri soli obediant, num omnino ad musculorum modum constringantur. Certum enim est, multis a morte diebus arteriam, dum humida sit, ita se contrahere, vt incisam mollem, qua repleta fuerit, expellat, quae vermiculi specie per vulnus prodit.

Quare experimenta oportet conquirere, per quae de hac lite definiatur. Nunc si de conspicua contractione quaeritur, quae ferro etiam, aut alia irritatione mechanica cieatur, mea quidem experimenta arteriam ad omnes eos stimulos furdam faciunt.

In arteriis maioribus, potissimum etiam cordi continuis et vicinis contractionem facilius admittas. Non vidi, non vidit Ill. CALDANVS, non Cl. IADELOT l*), non alii curiosi viri. Vidit tamen Cl. VERSCHVVR saepe quidem furdas ad stimulum arterias, nonnunquam tamen obsequiosas, vt ferro, veneno, scintilla electrica percussa, erosa, incisa, vossella demum comprehensa arteria se constringat. Huc etiam experimenta referas SPALANZANI et VERSCHVVRIL, in quibus, dum dissecabatur, arteria se contraxit.

C 3

Ex

- p. 67. not. h) Tom. *lege* Tab.
 p. 70. not. n) *adde* Idem est testimonium Cl. BROMFIELD *chir. obs.* p. 162. POYTEAV et olim GALENVS *add.* FONTANA *Mem.* p. 261.
 p*) ATKIN et WHITE ad quartam partem KIRKLAND.
 p. 71. not. e*) *adde* In *oper. min.* l. exp. 219. ad 230.
 l*) *Journ. med.* 1773. Fevr. et in libello.

Ex ea ergo lege, quae affirmantium experimenta paribus negantium experimentis potiora statuit, putes, in arteriis magnis, quarum fibrae circulares manifestae sint, vim esse insitam; non perpetuo conspicuam, non alacrem, non validam, quae sit paucarum fibrarum, sed aliquam tamen, si omnino, vt ego quidem malo credere, experimenta Cl. Iuuenis absque partium studio, et absque videndae contractionis cupidine instituta sunt. Bulbus certe aortae pulli, qui in ovo est, manifesto contrahitur.

Deinde si quaeratur de contractili vi inconspicua, quae oculis se ob debilitatem non offerat, vt tamen ad eam admittendam ex causis suis te deduci patiaris, omnino vbicunque fibrae sunt musculares, ibi vim contractilem esse putes, cum absque ea fibra musciosa cogitari nequeat, etiam quando eius teneritudo, et debilitas conspicuo motui ciendo non sufficit.

Pleraque frigidorum animalium arterias omnino tamen vi contractili destitui videtur*). Centies vidi, incisam subtili ictu lanceolae arteriam aliquam mesenterii sanguinem profudisse: nunquam autem ea rima vilo modo aut se contraxit, aut vicissim retractis labiis hiare visa est. Nobiscum sentiunt SPALLANZANVS et GALENVS (**). Sed hae arteriae, vt in parua bestiola, sunt de maximis (**).

Conuulsionum, quas non raro nuperi arteriis tribuerunt, nullum certum testimonium extat. Sic inflammationem (****) a spasmodica contractione vasorum minimorum deriuarunt, contractionem ab acribus: verum hypothesein vtique docuerunt, experimenta ei e directo contraria videntur prae-teruidisse.

pag. 72. l. 19. *lege*, Archiater Regius.

p. 73. l. 4. *lege* et aliquando inferius pondere libr. 131. vnciarum 10.

p. 74. l. 13. *lege* quae se facilius extendi patiuntur.

ibid. l. 20. *post* apparet *adde* Neque absque exemplo est, eo loco aortam, etiam absque vlla praegressa dilatatione, ruptam fuisse. Sed etiam femorales arteriae, et coronaria, et varii rami carotidis, etiam in facie, passim rupti fuisse leguntur. In varioloso corpore arterias coronarias ruptas vidit Ill. LIEVTAVD p*). Deinde arteriae flexuosae facilius ab aneurysmate distenduntur p**), vt

*) *Legendum est, vt opinor*, Plerorumque frigidorum animalium arteriae omnino tamen contractili vi destitutae videntur. *Not. edir. hui. auctar.* (GABLER videtur in textu legendum esse. *Not. edir. hui. auct.*)

(**) *De tubulis capillaribus*, Ingolstadt. 1774.

(***) *Oper. min.* I. p. 88. experimenta omnino 14.

(****) WHITT *nervous disorders*, p. 63. 227.

p*) *Sculcher.* II. p. 20.

p**) BIVMI *obs.* 10.

vt splenicæ *p****), et eadem rumpitur *p*****): sic aneurysma tibialis arteriæ ruptum *p†*). Animalibus in vniuersum multo robustiores arteriæ sunt, quam homini, maioribus potissimum, vt vasa exigua testis equini pene cartilaginea sint duritiæ. In ipso tamen equo frequentia sunt arteriæ mesentericæ aneurysmata *p††*), et idem sanguinem per nares, os, et penem amittit *p†††*).

p. 75. l. 28. *post* ostendi possunt *adde* Ipse demum in cartilaginum ipsarum epiphysebus intimis arterias trium generum vidi, quarum aliae ex arteriis rectis corporis ossis per hemisphaerium vasculosum in cartilagineum epiphyseos late penetrant: aliae ex nucleo osseo vndique exeunt, cum prioribus inosculatae: aliae demum ex arteriis superficialibus per puteolos in epiphysin se demergunt.

p. 76. l. 7. *dele* ex multis

ibid. l. 21. *lege* subiectum os

p. 77. l. 22. *adde* quae in animalibus, et demum in plantis pariter dominatur.

p. 78. l. 11. *post* 102 740 *adde* nimiam, cum aorta oriens in adulto certe homine aliquando latior sit:

p. 79 l. 15. 133 *lege* 123.

p. 80. l. 3. *lege* Petrus SENAC

p. 81. l. 17. *post* posuit *adde* qui 23 diuisiones sibi sumsit

ibid. p. 25. *adde* Vltimæ arteriæ diameter facile definitur, quae paulo maior sit globulo sanguineo, paulo inquam, cum nonnunquam hi globuli aegre per arteriam minimam viam sibi aperire videantur: globuli sanguinei diametrum alibi dicemus.

p. 82. l. 4. *lege* purgando in femirectos abeunt.

ibid. l. penult. *lege* sub angulo

p. 84. l. 10. *post* oculares *adde* Ita post curatum aneurysma, et ligatam arteriam brachii, cum ramus aliquis minor, trunci nunc dignitate consecutus, sanguinem omnem a corde ad manum veheret, is ramus mire flexuosus factus est, qui prius rectus erat. Ita vteri arteriæ in virguncula rectæ, in femina nunc adula flexuosæ sunt.

pag.

*p****) Giorn. de' letter. XI. n. 1. BEAUVSSIER Journ. med. 1770. Févr.

*p*****) Giorn. de' lett. l. c. et sanguis funesto euentu in abdomen effusus: iterum eadem post pulsationes hypochondriorum rupta, Att. fificocrit. II. p. 196.

p†) WEIZ Auszüge, IV.

p††) BOVRGELAT Elem. d'Hippiatr. p. 316.

p†††) SIND Stallmeister, p. 376.

p. 81. not. e) *lege* SAVVAGES de inflammatione, p. 218.

ib. not. g) *lege* p. 21.

pag. 85. l. 15. *lege* perspicitur

ibid. l. 16. *post* quae *adde* ab initio arteriae ad finem

ibid. l. 28. *adde* Non repugnat, ruptionem arteriarum et haemorrhagias per has ipsas flexiones caueri.

p. 86 l. 12. tun in homine - - - in vnicum truncum coeunt, *lege* In aubus ex arteria pulmonali duo, non vnus, ductus arteriosi in aortam descendunt, et alter post alterum inseritur. In piscibus frigidis duo aortae trunci in descendente aortam vniuntur. In homine porro arteria parietalis, minor equidem, coalescit ex ramo arteriae temporalis, et ex alio ramo arteriae occipitalis, in trunculum, qui per foramen parietale surculum in duram cerebri matrem mittit d*). Vertebrales arteriae, notissima in ponte Varoliano vnione, in vnum communem truncum conflunt.

p. 87. l. 16. *adde* Hi frequentes arcus, quibus dextri trunci cum sinistris late coalescunt, faciunt, ne possis nuperorum mediastinum, duasue corporis humani distinctas medietates admittere. Id vnum in ea hypothefi verum est, quod in vertebris, inque sterno, anastomoses dextra inter et sinistra vasa angustiores sint, interque minores ramos, vbique tamen innumerabiles sunt, et in osse sacro latiores.

p. 88. l. 10. Neque decuerat obscuriores esse *lege* Minus notae sunt.

p. 95. l. 3. *adde* Nuper demum *Lazarus SPALANZANVS* suis haec experimentis confirmauit. Vidit in animalibus frigidis modo plufculas arterias in vnam venam confluere: modo, vt in branchiis salamandrae aquaticae, arteriam reflexam in venam abire vnici globuli capacem: in cauda salamandrae alias arteriam venae parallelam in eam transuerfos ramos mittere, et ramulum arteriae in venulum reflexum abire. Vidit sanguinis modo vnicum globulum ex rubra arteria in primam venam transire: modo quatuor et quinque globulorum capax vasculum ab arteria in venam continuari.

ibid. l. 8. *post* fuerint *adde* Primum reperiio *Dominicum de MARCHETTIS* aquam de arteria in venam vrsiffe.

p. 96. l. 11. *lege* Columna aquae vndecim pedum incumbens fecit

ibid. l. 12. idem Auctor *lege* III. *HALES*

p. 97. l. 13. *post* liquores *adde* de vasis

pag.

p. 86. not. d) spectat ad verba: Duo trunci maiores — — — in vnam arteriam dorsalem confluit.

d*) *IANKE* foramin. caluar.

pag. 88. recurrent in textu *adde* not. o*) Vide has arterias in *TREWII* lib. de aneurysmate, apud *LVDWIG* de varietat. vasis. *POHL* obs. angiolo. de arter. *WHITE* casus, *Journ. de medec.* XXIX. p. 456.

p. 92. not. g) *adde* C. II. nempe in iecore, renibus, liene, pulmone.

pag. 97. l. 27. *adde* Cur vero cautus vir alioquin B. F. ALBINVS anatomos es arteriarum cum venis a ratione, ab experimentis, ab autopsia refutari: a microscopio, et ab iniectione vero vix confirmari scripserit *t**), nondum omnino video.

p. 98. l. 12. *post* habeat *adde* Vidi in ranarum mesenterio, et SPALANZANVS vidit *a**).

ibid. l. 19. *adde* Verum ea de re alibi quaeretur.

p. 99. l. ult. *adde* Cl. MECKELIO idem euentus non successit.

p. 100. l. ult. *lege* continuatum

p. 101. l. 5. *adde* Sudor sanguineus minime infrequens *n**). In vniuersas cellulosas telas in scorbutico *n***) cruor exit.

ibid. l. 8. *lege* Paucissimas

ibid. l. 13. *adde* In febre regionum feruidarum CARLI ipse per os, nares et aures *p**) sanguinem amisit.

ibid. l. penult. *post* causis *adde* incitatus

p. 102. l. 20. *dele* papillae, quae mammae praeponitur.

ibid. l. 23. *lege* Secundi generis exhalatio, in qua

p. 103. l. 13. *adde* Vasa exhalantia angulum cum vase, in quod sanguis impellitur, obtusum facere Cl. SWEDIAVER, cum resorbentque obtusus est, nescio an ad naturam *b**).

p. 105. l. 20. *post* erumpebat *adde* Eaedem sanguinis effusiones peculiarem febris flauae characterem constituunt.

p. 106. l. ult. *post* secuti sunt *adde* A thermarum vsu in rheumatismo, cum bonis aegri rebus, globuli sanguinei vndique de cute exsudarunt: et in aestuoso Africae aëre idem sudor collegae nostro Cl. ADANSONIO molestus erupit.

pag.

*r**) *Naz. hom.* p. 32.

*a**) *Mor. sangu.* p. 41. 53.

p. 99. not. i) *lege* obl. 17.

p. 100. not. g) *lege* 168.

p. 101. not. h) *adde* Lacrumae sanguine tinctae infantis Fr. TRENER *disp.* Witteb. 1768.

*n**) ESCHENBACH, *obs.* p. 42.

*n**) LIND *fever and infest.* p. 285.

p. 101. not. p) *adde* LIND *health of scamen*, ed. 1774. p. 55. et olim LABADIE *de la peste* per os, nares, aures, vterum, penem, oculos, sudorem, venam ruptam, varicem ruptum, mammas fluxisse vidit sanguinem.

*p**) *Rilaz. del viaggi.*

p. 102. not. u) *lege* L. penultimo, quo

*b**) In *disp. de thesaur. anas.* n. 59.

- pag. 107. l. 18. *adde* Sanguinem per porum faciei in formosa et docta virgine exsiliisse noui, alii per digitorum, perque cutis capillatae poros. ✓
- p. 109. l. 4. *adde* Ex arteria spermatica liquorem in vasa aquosa traici apud SOGRAPHVM c*).
- ibid. l. 9. *adde* et a nobis.
- p. 110. l. 9. *post* Nempe *adde* ommissis venis per totum corpus exsanguibus, quas EMPEDOCLES dixit.
- p. 111. l. 16. *lege* inflammato eodem
- ibid. l. 22. *lege* arteriae
- p. 112. l. 20. *adde* SKETONO o*), BRAMBILLAE o**), aliis
- ibid. l. 25. eo *lege* quoque
- ibid. l. 27. eos *lege* tenues
- p. 113. l. 4. *lege* in vasa rubris minora
- p. 114. l. 6. *lege* Sed ne hos quidem globulos satis tenues esse pergebat,
- ibid. l. 23. *post* lentis *adde* rubrum succum vehere probabile fit
- p. 116. l. 3. *adde* Deinde cum in piscibus, inque cephalo facilius, vasorum pulcherrimorum rete contemplerer, quod vitreum corpus ambit, manifesto vidi, nudo oculo inconspicuum, idem tamen microscopio adhibito non solum facile distingui, et a trunculo centralis retinae arteriae per vtramque vitreae membranae conuexitatem numerosissimis ramis spargi: sed veris rubris vasis fieri, quae pallent, et tamen rubros omnino globulos vehunt. Quare omnino nullo errore loci opus est, vbi vasa pene pellucida oculum fugiebant, vt nunc rubra vasa sint: sufficit aut acriorem oculum adhibere, aut sanguinis aliquando plus in ea vasa vrgeret, quae dudum, sed parcum sanguinem vehabant.
- p. 117. l. 12. per *lege* praeter
- ibid. l. 21. *post* videntur *adde* siue venas potius claudī putes, vt refluxus sanguinis inhibeat, dum a corde acriter sanguis per arteriam vrgetur.
- p. 118. l. 27. *post* venire *adde* qui ne prima quidem et flaua sine illata violentia subire posset.
- p. 119. l. 11. vrgentis *lege* vrgente
- ibid. l. 24. quae *lege* quare ea
- ibid. l. 29. decimas *lege* vigesimas

SECTION

p. 108. not. g) *adde* alter finis arteriae est in vas lymphaticum PARENT. *dialog.* p. 55.

c*) *Theor. lymph.*

o*) *De ophthalm.*

o**) *De phlegmone* p. 13.

p. 112. not. r) *adde* BRAMBILLA

S E C T I O II.

V E N A E.

Pag. 121. l. 5. *post* exoriens *adde* In nereide et magna arteria, et eadem in venam reflexa adest cum suis ramis venosis c**),

ibid. l. 6. *adde* aſtaco.

ibid. l. 8. *post* arteriarum *adde* ſi omnino nobis licet in fabrica inſectorum arterias nobis ſumere d**).

p. 122. l. 2. *post* haberent *adde* nempe, vt putabant, hepar:

ibid. l. 21. ſpinas neruoſa *lege* ſpinam dorſalem

p. 123. l. 12. *post* cylindricae ſint *adde* Vnicum enim globulum certiffime vehunt, vt in rete venoſo meſenterii ranae et buſonis maniſeſtiſſime vidi f**),
vti SPALANZANVS pariter vidit

ibid. l. 14. aut *lege* vt

ibid. l. ead. Facillime autem - - - apparent *lege* Cylindricas ergo neceſſe eſt, quarum conſtans meſura globulus ſit g). Longe cylindricae ſunt venae potiſſimum cutaneae, quae magnum ſpatium abſque ramis emetiuntur, ſaphenae, cephalicae, hepaticae exemplo.

ibid. l. 24. *lege* ea inſigniter minus eſt

p. 124. l. 11. *lege* virorum.

ibid. l. 23. *lege* ſanguinis congeſtione

p. 125. l. 2. Vti vero contractio - - - longitudinem ſequuntur *lege* Inde, in ſuperioribus experimentis, etiam in vena pulmonali contractionem vidi, quae cum diaſtole alternas vices ſeruet.

In nulla alia vena aut ſponte, aut per irritationem, excitatum motum vidi, tot in experimentis. Qui vidit, ab irritatione natum, in iugulari, aliisque venis Cl. VERSCHVR, fatetur ſaepe tamen ſibi nullam apparuiſſe. Quare memor, me ſibras carneas in venis nullas reperire, nondum auſum modum aliquem inſutum in venis recipere. In animalibus frigidis nulla demum venarum vis eſt contractilis, ſi a cauâ recedas. A veneno quidem chemico tactae vtiq; conſtringuntur: verum ea contractio non pertinet ad motum vita-

D 2

lem

c**) PALLAS *miſcell.* p. 130. MÜLLERVS venam et arteriam habet *Wafferwürmer*,
p. 126.

d**) vid. Auſt ad Libr. II. Sect. I. p. 19.

p. 121. not. i) *adde* *Somm.* et *vigil.*

f**) *De mor. ſangu.* 15.

lem musculofum, qui perinde integris a vera morte diebus elapsis excitatur, dum vena humecta fit.

pag. 125. l. 14. *lege* Huic iterum extimae membranae

ibid. l. 15. Huic membranae - - - pariter, *lege* Magnae venae alicui membranae incumbunt, vt pleurae, pericardio, peritoneo: ea membrana pariter,

ibid. l. 18. *lege* deferturam continuo venam, quando ea musculus adiit, aut viscus.

p. 126. l. 3. Quae de venarum irritabilitate hoc loco Auctor dixit, in noua editione defunt.

ibid. l. 27. *lege* quae ad crassitiem etc.

ibid. l. 28. *lege* ad suum pariter fluidum comparata, in ea ratione est, quae est etc.

p. 128. l. 15. *lege* sanguinem

ibid. l. 17. *dele* et millecuplo

ibid. l. ead. *post* auctiorem *adde* Varix in cubito capiti humano aequalis *m**).

p. 129. l. 20. *lege* arterias

ibid. l. ult. In minime deformi - - - ruptam fuisse *deest* in noua editione.

p. 130. l. 3. *post* haemorrhagia *adde* vt nuper in domestica femina vidi. A re-tentis mensibus vena saphena *g**), poplitea et cutaneae venae et aliae, etiam cum bonis aegrae rebus, rumpuntur. Frequenter satis reperi, venam cauam in pericardio *g***), et alibi, et supra hepar, tum saphenas, iliacas, venam portarum dissiluisse. CAROLVS XI cum amico ab vrsu periclitanti subuenire properaret, venam rupit *g****). Ex rupta vena mors inter choreas, sanguine in abdomen effuso *g*****).

ibid. l. 5. *post* mors *adde* Sic a vena caua *k**), saphena *k***), iliaca *k****).

ibid. l. penult. *post* impetu *adde* nata.

p. 131. l. 12. *post* visa est *adde* et in diuersis exemplis fuit aorta 52, vena caua 57, aorta 15, vena caua 25, vena caua 56, aorta 41.

pag.

*m**) Med. obs. and enquir.

pag. 129. not. e) haec *lege* hic et *adde* Aët. Mogunt. p. 531. Ceterum haec nota spectat ad verba: Venarum ruptiones - - citabo.

ibid. not. f) 278 *lege* 78.

*g**) FABRIC. Sciagraph. Butisbac. p. 16. WEPFER Apoplex. p. 26.

*g***) SALZMANN in disp.

*g****) ROBINSON, p. 238.

*g*****) SMET. miscell. L. X.

*k**) PERRUS ORTESCHI Giornale di medic. II. p. 217. sub diaphragmate, HAEN XI. p. 2.

*k***) Journ. med. 1762.

*k****) TARGIONI Obs. p. 45.

- pag. 131. l. 20. *post* 16 ad 9 *adde* alias cum parua esset 55 ad 52.
 p. 132. l. 9. *dele* Arterise cruralis rationem - - - rationem sesquialteram.
 ibid. l. 18. *adde* et alias diam. et 103 vt 33 ad 14
 ibid. l. 23. *lege* renalem venam sinistram
 ibid. l. vlt. *post* 16 *adde* vti 22 ad 35
 p. 133. l. 24. *adde* Minimae venae arteriis non maiores sunt, neque potuerunt,
 cum arteriolae et venulae, vt certo vidi, vnicum globulum transmittant.
 p. 134 l. antepen. quo venae, *lege* venae in quo
 ibid. l. penult. potuerint *lege* non possent.
 p. 135. l. 28. *Verbis* „In vniuersum, venae mihi minus etc.“ *noua orditur paragra-*
phus, quae „Alia discrimina“ inscripta est.
 p. 136. l. 17. *lege* In venis
 p. 138. l. 1. *post* reiecit *adde* Hippolytus BOSCVS negat se reperisse.
 ibid. l. 14. *post* fuit *adde* Anno 1601 sibi visas esse Henricus SMETIVS.
 p. 139. l. 12. *lege* prima
 ibid. l. 21. *dele* et in valuulis - - inprimis breuiora.
 ibid. l. 22. *lege* cum antiquiori littera C. comparata
 ibid. l. 28. *post* lacerari *adde* eas,
 ibid. l. 29. *post* valuulas *adde* laceras
 p. 140. l. 1. et minori de circulo *lege* et pars minoris circuli.
 p. 146. l. penult. *lege* raro
 p. 147. l. 9. *lege* pari
 ibid. l. ead. *dele* Deinde non adeo - - apparent
 p. 148. l. 2. *lege* vel ab eo remotiores
 ibid. l. 7. *lege* In venis intercostalibus
 ibid. l. 16. *lege* sed nec in homine
 p. 150. l. 20. *adde* et ductus galactophori mammarum.
 ibid. l. 22. *lege* eos frustra etc.
 p. 151. l. 4. *post* caueis *adde* ex ipsis vesiculis seminalibus s*)
 ibid. l. 13. *post* ostendemus *adde* Sed etiam ex cellulosa tela vndique venae re-
 sorbent. Primum enim a venis in eam cellulosam telam via liberrima est,
 in quas impulsâ aqua facillime, tamen etiam sebum calidum, adeps porcinus,
 hydrargyrus, gluten piscium, aër demum viam sibi aperiat t*).

Eam autem viam a cellulis in venas ducere, natura ipsa venae demonstrat,
 quam alibi euincemus, et quae a corporis ambitu ad cor, non vnquam contra-

- rio ductu humoribus vehendis patet. Deinde sanguis non reorbetur solum ex cellulosa-tela, sed in sanguinis viam redit, quae certe per venas solas ducit.
- pag. 151. l. 14. *dele* Ex cellulosa tela -- facta sunt.
- ibid. l. 16. Sed etiam *lege* Primum
- ibid. l. 20. *post* lapsu *adde* effusi
- ibid. l. 27. *lege* Deinde in sanguinis massam resorptum humorem recipi apparet, cum ab vniuersali fustigatione etc.
- ibid. l. 29. est *lege* sit
- ibid. l. ead. vt *lege* et
- p. 152. l. 7. *adde* ei adeo opii resorpta.
- ibid. l. 15. *lege* per quam humor de iis etc.
- ibid. l. 17. *adde* aut per paracentesin.
- ibid. l. 21. *post* fecerat *adde* Mulsam pectori impulsam per lotium produisse
- SANCTORIVS auctor est
- ibid. l. 22. *adde* et TANARON
- p. 153. l. 16. *adde* Rupta vero vasa esse, quae aquam injectam sinant transsudare, quae HEWSONI est coniectura, omnino non possum admittere. Centies post injectam aquam ceraceum ego liquamen in vasa exhalantia vrsi, neque eam viam unquam secutum est, neque in magnas caueas exiit, quo exiisset vtique, si aqua, ruptis vasis, ei viam aperuisset.
- p. 153. l. 18. *lege* sanguini
- p. 154. l. 2. *post* iugularibus *adde* Eo quidem hoc experimento vti nolim, quod neque CL. HEWSONO nuper successerit, neque mihi, vt omnino nihil a ligata iugulari vena in cane superstite euenisse viderim. Certa vero sunt, quae nunc dico.
- ibid. l. 9. *post* redire posset *adde* Polypum cordis cum hydropo frequentissime coniungi reperi.
- ibid. l. 19. *post* secutus *adde* et nuper iuniorem HUNTERVM
- p. 155. l. 1. *lege* vt in cerebro et oculo.
- ibid. l. 9. *post* humoris *adde* oculi
- ibid. l. 12. *adde* Oleum terebinthinae ex vesiculis feminalibus reorbetur in venas rubras d*), in venas lymphaticas nequaquam.
- p. 156. l. 3. *lege* aërem per venas iubent inflare *et adde* Neque hae communicationes ruptis vasis imputari possunt. Hydrargyrus enim, qui ex venis in lactea vasa transit, omnino nunquam in ea vascula penetrasset, si quicquam ruptum inuenisset, quem certum sit, vt cogor repetere, quae comperi, quoties

d*) MECKEL obs. non. de vaf. lymph.

ties aliquid in vasis violatum est, quae replet, certissime in maximas guttas effundi.

pag. 156. l. 5. Verum experimenta quidem - - - nunc continuo dicitur *lege* An vt tenuiores arteriae, ita venae dantur seriferae aliae? Ita non solus BOERHAAVIUS, sed difficilis ceterum in controuersis admittendis ALBINVS m*). Ceterum paragraphus huius sectionis ultima, in qua de venarum in arterias mutatione agitur, a noua editione abest.

SECTIO III.

VASA LYMPHATICA.

Pag. 157. l. 5. nondum *lege* nuper

ibid. l. ead. *dele* satis

ibid. l. ead. vestigia *lege* series

ibid. l. 6. sunt *lege* est,

ibid. l. 10. *post* BARTHOLINVS *adde* SWAMMERDAMIUS in Gallinae abdomine vas lymphaticum vidit.

ibid. l. 19. Quare de quadrupedibus - - - nondum satis certo innotuit *lege* Verum nuper demum vasa lymphatica, vasa lactea, quae ad eam classem pertinent, et ductus thoracicus in auibus, in testudine, vt animali ouiparo frigido, demum in piscibus frigidis, asellis etiam potissimum, ostensa sunt, et delineata. De gloria nobilis inuenti lis est MONROVM inter iuniorem et Guilielmum HEWSON, quorum ille vasa aquosa iam a. 1758 in auibus, et a. 1760 in raia pisce vidit: iste in vtraque classe plene descripta dedit u*).

p. 158. l. 22. *lege* 1649.

p. 160. l. 21. *post* communicatas *adde* Mess. Aureae.

ibid. l. 23. *adde* Neque auctori *entretiens en forme de préface* multum tribuas, qui BOVRDELOTO lymphatica vasa tribuit, inuenta cum lactea quaereret, vt RVDDECKIUS tres post menses, postquam a BOVRDELOTO audiverat b*), ea viderit.

pag.

m*) *Nat. hom.* 29. Probabile videri.

p. 155. not. g) *post* aquos, *adde* SOGRAPHI *lymph.* p. XII.

p. 156. not. h) *adde* SOGRAPH. p. XI. XIV. facilius, qui per arterias.

u*) *Exper. Inquir.* T. II. 1774. 8.

b*) GALLOIS, p. 51. 52.

p. 151. not. r) *lege* 298.

pag. 160. l. 19. *adde* Porro *Olaus* WORM in epistola posthuma 1017 die V. Nou. cloclclm de nouo inuento Sueci ait, quod expectet, et eum tractatum se accepisse ex Suecia in epist. 1019 d. xiii Ian. cloclcliv agnoscit, nulla BARTHOLINI nepotis sui, mentione facta.

ibid. l. 23. *post* possidemus *adde* Multae enim partes corporis sunt, in quibus vasa lymphatica nemo vidit, aliae, vbi et raro quisquam, et cum dubio aliquo.

p. 164. l. 7. *post* cellulosa tela *adde* Ill. MECKELIVS passim ad eorum historiam aliqua addidit, tum *Alex. MONRO* fil. et potissimum *Guil. HEWSON*, qui multas novas ex humano corpore tabulas dedit, etiam in artubus, et in his non sola curi vicina vasa, sed etiam profunda, neque prius dicta.

ibid. l. 20. *lege* Multis locis numerosae sunt, etc.

p. 165. l. 2. *post* animalis *adde* interioris

ibid. l. 4. *post* SCHMIEDEL *adde* In liene sub membrana communi. Vasa lymphatica glandulas inter iugulares et venam subclauiam, alia a cellulosa tela orientia absque valvulis sunt MECKEL.

ibid. l. 6. *adde* Quare non bene vbique quasi articulata pinguntur, quae cylindrica sunt, et demum in nodulos assurgunt, quando a liquore retento distenduntur.

ibid. l. 23. *lege* Vasa lymphatica satis valida sunt, vt ne a magno quidem hydrargyri pondere facile rumpantur.

Ne, quae cohaerent etc.

ibid. l. 25. *post* superare *adde* Exemta de animali mortuo, et in tabulam disposita, contrahuntur vi mortua adeo valide, vt retractus ex trunco hydrargyrus vasa rumpat. Sed etiam in viuo animali, aut nuper mortuo, non solus ductus thoracicus, qui vere etc.

p. 166. l. 13. *post* repleti possint *adde* Quae quidem mihi adeo manifesta videntur, vt dubia contra experimenta mota refutare non videatur necesse.

ibid. l. 18. *post* insentur *adde* Vasa galactophora mammae cum vasis lymphaticis, aliquando tamen minus libere, quam per venas communicant.

p. 167. l. 9. *post* fuisset *adde* A sugillatione, cum dissecaretur, lympham rubello colore tinctam fuisse ASTRUC vidit. Haec vasa lymphatica melius in cadavere ostendi, quod putredinis vim senserat, a qua cellulosa spatiola grandescunt, aëre turgida.

Morbos addunt videri per vasa lymphatica transferri. Nam a veneno venereo bubones inguinales nasci, a cancrroso veneno vicinas glandulas axillares turgescere, a cantharidibus admotis in vicinia tumores dolentes natos esse in glandulis eius generis.

Haec omnia admitto, neque recuso vasa lymphatica esse reſorbentium vaſorum ſyſtema, quae de cellulosa tela, et de magnis caueis liquorem ſorbeant, neque ea ab arteriis continuantur. Haec, quae olim GLISSONII, nuper I. HUNTERI, Alex. MONROI et Guilielmi HEWSON theoria eſt.

- p. 167. l. 19. *adde* In teſte conquaſſato liquorem ex arteriis primo in cellulosa telam exire, inde in vaſa lymphatica iidem Cl. viri. In liene eundem euentum reperi, poſtquam vaſa rupta fuerant. In ea hypotheſi id ſolum deſidero, quod omnis reſorptio ſolis aquoſis vaſis reſeruetur, et quod iisdem caueis omnis cum vaſis rubris continuatio negetur. De iſta diximus b*), et certe nouimus, nulla arteria fracta, nullo liquore extra vaſa effuſo, tamen per arterias vaſa lymphatica, ipſumque thoracicum ductum repletum fuiſſe. Venas vero rubras et de cellulosa tela, et de magnis caueis ſorbere, per ſua experimenta mihi euictum videtur.

Cum praeterea vapor effuſus in cerebri ventriculis, et in medullae ſpinalis infundibulo reſorberi debeat, et tamen ea tota in ampliſſima regione nullum vas lymphaticum vnquam detectum ſit, nullum pariter in tota facie, (exiguo circa aures tractu excepto), in cute capillata capitis, in tota ampliſſima cute dorſi, cum demum in artubus exigua, quae reperiuntur, vaſa lymphatica nullo modo reſorptioni ex ampliſſima cellulosa ſede ſufficere videantur. Reſorptio venarum rubrarum euicta videtur.

ibid. l. 25. *poſt* KAAVWIVS *adde* ſibi tamen notum,

p. 168. l. 5. *lege* hydropicis

ibid. l. 10. *adde* Ex minoribus etiam caueis in vaſa lymphatica via patet, potiſſimum ex ſeminalibus veſiculis.

ibid. l. 11. *poſt* venis *adde* vaſa pellucida

p. 169. l. 3. *poſt* auctoris *adde* ſententia.

p. 170. l. 4. *dele* me -

p. 171. l. 13. *adde* His Guil. HEWSON varia addidit. In artubus alia vaſa aquoſa ſuperficialia ſunt, et ſubcutanea, a digitis in parte dorſali aſcendentia, comitantia muſculum tibiale anteriorem; et alia in parte flexoria inter tibiā et tendinem internum muſculi gaſtrocnemii. Valvulas habent, ſubeunt nonnullas glandulas, et inde ad inguinales veniunt, et ibi cum vaſis a genitalibus venientibus communicant. Plexum faciunt, et abdomen ſubeunt ſub tendine obliqui interni.

Alia

b*) p. 152.

p. 168. not. g) *lege* p. 180. *et adde* Hydrops ex ſcirrhis pene omnium viſcerum, ROSE Progr. 1776.

Alia vasa profunda inter musculos comitantur arteriam tibialem posteriorem, inde cruralem, cum ea tricipitem musculum perforant, et in glandulas inguinales veniunt, vbi cum superficialibus miscuntur.

p. 172. l. 11. *adde* in plexum inguinalem se immittunt.

ibid. l. 13. *post* vesica *adde* et circa veru montanum n*)

ibid. l. 15. *post* accedunt *adde* et hypogastricam fere arteriam comitantur.

ibid. l. 18. *adde* Rami aliqui huius plexus, qui vasa iliaca comitatur, plexum in osse sacro faciunt.

p. 173. l. 14. retro ipsam aortam *lege* pone ipsam aortam *et adde* Ea demum conueniunt in secunda vertebra lumborum, inque ductum thoracicum vniuntur.

ibid. l. 17. *post* veniunt *adde*, pone eius arteriam et pone aortam,

ibid. l. 20. aque hepate nata *lege* alia a liene orta, quae eius arteriam comitantur.

ibid. l. ead. *dele* Ea vel in vnicum - - plerique scriptores tuentur.

ibid. l. 24. *adde* Alia in curuatura minori coronariam arteriam sequentiā, alia in maiori, prope minorem curuaturam duodeni cum iisdem coniuncta, reteque facientia, denique et cum vasis lienis, et vesiculae felleae, et hepatis vnita. Ex hepate nempe concauo ea vasa et ad truncum coeliacae arteriae conflunt, et vna in thoracicum ductum abeunt: dum ea, quae in conuexa sede hepatis sunt, aliqua per ligamentum sinistrum ad ductum thoracicum tendunt.

p. 174. l. 2. *lege* aut duo maiusculi canales

p. 175. l. 5. *adde* posteriora quidem fere medio in pectore thoracico ductui inserta; anteriora in angulum venam inter iugularem et subclauiam dextri lateris, HEWSONO auctore.

ibid. l. 16. *dele* quae inguinalium - - glandulas tendunt

ibid. l. 19. *lege* inserta, *et adde* Deinde Cl. HAGEN in brachio oedematoso vasa lymphatica, eaque praegrandia et flexuosa vidit c*).

ibid. l. ead. *post* obscura *adde* Iterum hic Cl. HEWSONVS et superficiei propiora vasa aquosa vidit, et in parte flexoria brachii, et in extensoria, quae etiam, perforato ligamento interosseo, communicant, et ad glandulas demum axillares veniunt.

Ibi coniunguntur cum vasis profundis arteriam radialem, et procul dubio vlnarem et interosseam, comitantia.

Ex

n*) Rere ea sede depinxit Cl. WATSON *Phil. Trans.* V. LIX. 1. 2.

c*) *Wahrnehmung.* p. 27.

Ex utrisque in glandulis axillaribus plexus fit, qui in dextro latere in angulum inter venam iugularem et subclaviam fere inseritur, cum vasis aquosis pulmonis et colli.

In latere sinistro in ductum thoracicum, vel in subclaviam HEWSON.

Haec brachii vasa aliquando in venae sectione pertusa molestissima et diuturna lymphae profluvia faciunt, quale et ipse vidi.

pag. 176. l. 15. Vtriusque generis - - dedit I. H. PAVLI lege Numerosa etiam vasa aquosa sunt thyreoideae glandulae. Haec omnia in trunculos unita, cum ramis a capite descendentibus et comitibus ramorum arteriae carotidis, demum in dextro latere cum vasis pulmonis et thyreoideis, dextra quidem in angulum venae subclaviae cum iugulari, sinistra vero et in ductum thoracicum se immittunt, et in subclaviam, iterum HEWSON o auctore.

p. 177. l. 3. adde Demum placenta et secundinae aquosis vasis destituuntur, et in magna parte cutis, dorsoque toto nondum visa sunt. Deinde fateri oportet, post tot industriorum virorum labores, fragmenta tamen esse ea omnia, quae de lymphaticis vasis scimus, neque vilo modo cum arteriarum, aut venarum, aut nervorum historia descriptiones vasorum aquosorum comparari posse. In capite enim et artubus pauca, et hiulca: in vola manus, dorso pedis, natibus nulla omnino descripta habemus.

In quadrupedibus, auibis et piscibus systema vasorum lymphaticorum fere est, quod in homine diximus, et pariter ductus thoracicus, eadem fere in se, in magnam venam immixtus, communis idem truncus lacteorum vasorum et lymphaticorum. In piscibus tamen omnino nullae glandulae conglobatae notae sunt.

p. 179. l. 13. adde Nuper Cl. MERTRVD vascula lymphatica vidit, quae et cum ductu thoracico communicant, et in lumbales venas aperiuntur f*).

ibid. l. ult. nusquam lege perraro

p. 180. l. antepen. adde Et subclaviae quidem venae, aut iugularis cum ea vena coniunctioni, venas lymphaticas inseri non dubium est: sed eae venae ductui, quem dixi, proximae sunt.

p. 181. l. 2. post pleraeque adde quod magis est probabile. Reperiuntur in quadrupedibus et auibis: piscibus et quadrupedibus frigidis nullae sunt n*).

p. 176. not. a) lege ZELLER.

p. 178. not. k) lege 48.

f*) Mem. des sav. étrang. T. VI.

n*) HEWSON, PALLAS Comm. Petrop. L. XIX. in lacerta.

pag. 181. l. 7. *post* retinuit *adde* Non vt accurate separaret; nam lac, saliuam, ferum, pituitosum in mesocolo humorem separari scripsit, cum conglomeratis adeo coniungit *q**).

ibid. l. 19. *post* retulit *adde* Nuper etiam Cl. BROMFIELD nullum conglobatarum a conglomeratis discrimen esse docuit, vt in alio animali conglobatae sint, quae in alio conglomeratae *a**).

p. 182. l. 6. malo *lege* scirrhus

p. 184. l. 16. *post* violationem *adde* lac

p. 186 l. 2. *adde* vt in inguinalibus et alibi.

Vasorum aquosorum ad reliquas partes, quae glandulam conglobatam constituent, adeo magna ratio est, vt possis eas pro fasciculis aquosorum vasorum habere, quae per tenacem, multamque cellulosam telam coniungantur.

ibid. l. 19. *lege* posset.

p. 190. l. 15. *lege* seorsim

ibid. l. 18. *adde* Aliquae pancreatis capiti, duodeno inferius adhaerenti, adiacent.

p. 191. l. 7. *adde* sex, septem HEWSON. Superiores aliae sunt, aliae inferiores.

ibid. l. 11. *adde* Qua sede vna, duae, tres glandulae reperiuntur.

ibid. l. 12. cum in tibia, fibula, pedeque *lege* et sub eadem in tibia vna et altera, in pede nullae etc.

ibid. l. 13. *lege* Hae et popliteae

p. 192. l. 11. *post* inguine *adde* esse lego,

p. 193. l. 21. et ex frictione, quae fit, *lege* deinde, etsi vasa efferentia pauciora sunt, et in vniuersum inferentibus non maiorem habent luminum summam, in iis tamen non potest amissa celeritas reparari, cuius pars non exigua destructa sit frictione, quae fit etc.

*q**) *Meth. medendi*, XIV. c. II.

*a**) *Obs.* II. p. 45. 46

p. 193. not. c) *lege* L. VI. Sect. I.

ELEMENTORVM PHYSIOLOGIAE

LIBER TERTIVS.

CIRCIVTVS SANGVINIS EX CORDE IN ARTERIAS, EX ARTERIIS IN
VENAS, EX VENIS IN COR.

SECTIO I.

QVO SANGVIS PER ARTERIAS FLVAT.

- P**ag. 197. l. 15. *post* redierint *adde* et totae nunc planae sint.
 ibid. l. 19. *lege* sanguis se confert,
 ibid. l. 21. *post* trunci *adde* sanguinis momentum retinent.
 p. 198. l. 16. *lege* eorum
 p. 199. l. 9. *post* perforatur *adde* Optime vero succedit in aorta, quando supra
 cor ligatur, siue calidum animal fuerit, siue frigidum. In vmbilicalibus arte-
 riis GALENVS experimentum fecit, in pulmonali nuper Cl. PORTAL o*).
 Quae vinculum, ea tumor facit, qui arteriam comprimit. In sarcocoele arte-
 riae testis digiti crassitie fuerunt o**). Cum aorta arteria in abdomine am-
 plissima esset, eadem supra cor, et vna carotides latissimae o***).
 ibid. l. 23. *lege* ex arteria incisa
 p. 200. l. 17. *post* fudisse *adde* Neque rarum est, cum arteria brachialis ob ane-
 vrysmia vinculo intercepta fuisset, eam sub eo vinculo sanguinem fudisse g*).
 ibid. l. 18. *post* brachialem *adde* incisam
 p. 201. l. 9. ex trunco humerariae, supra vinculum, natae *lege* infra vincu-
 lum natae
 ibid. l. 11. *post* humerariam *adde* supra vinculum liberam
 p. 202. l. 19. *post* legem *adde* pugnet,
 p. 203. l. 12. *post* necesse est *adde* In terrore genae expallescent, et sanguis in cor,
 inque magna vasa congeritur.

E 3

SECTIO

o*) COLOMBE p. 22.

o**) Svenska Vetensk. Ac. Handling. 1737. no. 1.

o***) LIEVTAUD Sepulchret. II. p. 94.

g*) BERTRANDI chir. II. p. 207.

SECTIO II.

ITER VENOSI SANGVINIS.

- P**ag. 204. l. 8. *adde* tamdiu dubii.
 p. 205. l. 8. *post* sinus *adde* valvulosi
 ibid. l. 23. *adde* requiri enim aggerem, qui sanguinem relapsurum sustineat, vir acuti iudicii sensit.
 p. 209. l. penult. *lege* quae cordi propior est *et adde* Cum tonfor venam ad carpum ligaret, nullum sanguinem obtinuit *i*)* stulte miratus.
 p. 210. l. 24. *post* habent *adde* Idem tonfori accidit nuper dicto.
 p. 214. l. 17. *adde* Cum luxatae vertebrae earum venam comprimerent, venae artuum inferiorum turgidissimae fuerunt MORGAGNI *q***)*.
 ibid. l. 22. *post* effundi *adde* Hoc experimentum iam ASCLEPIADI innouit *r*)*.
 p. 216. l. 1. sed praeterea efficaciam - - - explicatam demonstrant, *lege* sed praeterea humoris venosi iter per cor, et arterias, ad omnes corporis humani partes, continuatum demonstrant.

SECTIO III.

- P**ag. 218. l. 12. *lege* aut ab inhalantibus
 p. 222. l. 15. *post* inanitio *adde* Neque GALENVS id ignoravit. Plus semel enim mutuam arterias inter et venas commercium eo experimento demonstravit, quo constat, vel arteria magna, vel vena magna incisa, sanguinem vniuersi corporis ex eo vulnere effluere: demum ex venis in arterias aliquid, eas vt alat, sanguinis transire *i*)*.
 p. 224. l. vlt. *post* secuta est *adde* Ex saphena, ex poplitea vena rupta mortes pene subitae.
 p. 226. l. 1. ramorum *lege* venenorum
 ibid. l. 3. *post* aut *adde* olim ARISTOTELI dictae *u*)*

pag.

i)* Apud STORCH *Iahrgang*. IV.pag. 210. not. q) *lege* 108.*q***)* MORGAGNI *de Sed. et caus. morbor.* II. p. 356.*r*)* SCRIBON. l. c. 21.*i*)* *Facult. nat.* L. III.*u*)* MARCELL. p. 1904.

pag. 226. l. 10. *post* infecerit *adde* Alia similia venena Americani indigenae temperare norunt, effectu perinde pestilenti, si vel leuissime vulnus cruentatum fuerit.

ibid. l. 12. *adde* Analogus effectus venenorum est, quae cuti cruentatae applicata occidunt, quo venena mineralia fere spectant. Cobaltum ab ignara muliere ad achores siccandos capiti pueri inspersum, miserum Göttingae occidit. Sic arsenicum, cum caput eius decoctione ablueretur *e**), ita mercurius sublimatus *e***) ulceribus inspersus, et crocus metallorum *e****). Huc etiam lues pertinet, quae per venenatam lanceolam a scarificatione late per Morauiam *e*****) sparsa est, cum ea lanceola virus venereum contraxisset. Olim etiam nicotiana in vulnus pulli et serpentis data, bestias enecauit, et vomitum ciuit *e******). Ab aqua phagedaenica, in qua sublimatus mercurius solutus erat, salivae fluxus *e*†) secutus est. Tactis genitalibus feminae infectae chirurgus periit *e*††), et ab hellebori radice in fonticulum data *e*†††).

p. 227. l. 13. A corde et medicamentis *lege* A medicamentis acidis

p. 228. l. 10. *adde* Vno verbo spiritus et salis, et sulphuris, et nitri, et vitrioli in venam viui animalis impulsu eiusdem funesti euentus, subitaeque mortis causae fuerunt. Minus magnum malum ab aceto expectares, et ipsum tamen animal perinde et subito occidit.

ibid. l. 12. *post* excitat *adde* alias rabiem fecit:

ibid. l. 14. *adde* Oleum etiam oliuarum funestum soporem fecit.

ibid. l. 17. *post* habent *adde* si in venam dederis,

p. 229. l. 18. *post* vomitus *adde* A vitro antimonii vehemens purgatio *a**). Ab arsenico extus admoto vomitio sanguinis et mors. A mercurio sublimato in lotionem adhibito salivae fluxus.

p. 230. l. 5. *adde* Et in alio experimento a BORRICHIO citato liquida faex de vena profluxit.

pag.

pag. 226. not. c) *adde* De Americanis sagittis HERBERT de cassava amara, 483.

*e**) BÜTTNER Tödllichkeit, p. 200. WEFER cicur. aquat. p. 289. et motus cruris ademptus BARTHOL. cauter. p. 16.

*e***) STAHL Merh. med. p. 56, 57. PEYER exerc. p. 197.

*e****) E. N. C. Dec. II. ann. I. obs. 43.

*e*****) Ap. Iordanum BRYNNAGALL. MAVCHART ophthalmoxyst. I. p. 15. BOYLE porosit. p. 23.

*e******) E. N. C. Dec. II. ann. 2. obs. 108.

e†) Mem. de l'Acad. de chir. p. I. 157.

e††) KRAMER med. milit. II. p. 81.

e†††) ETTMÜLLER chir. inf. BORRICH. de venen. p. 722.

*a**) MAIOR l. c.

- pag. 230. l. 19. *post* mittebatur *adde* et perinde a sanguine hominis peste infecti in animalis venam impulsio.
- p. 231. l. 8. *adde* Denique lac in arteriam impulsū post octo horas de vena perfluxit *), cuius experimenti eadem vis est t*).
- p. 232. l. 4. defunt *lege* supersunt
- ibid. l. 24. ad totum, quem *lege* ad partem corporis, quam
- p. 234. l. 20. *adde* Nuper Cl. COLOMB canem recreatum esse expertus est, qui sanguinem transfusum receperat.
- p. 236. l. 6. *post* periissent *adde* et denique medicus Italus *Venantius VEN-TRONI* transfusionem in se ipso molitus morte audaciam luisse x*),
- p. 238. l. 19. haecenus ne motum quidem sanguinis, et multo minus circuitum conspicuum videre datum est, *lege* circuitum sanguinis ex arteriis in venas conspicuum videre nunquam datum est u*):
- ibid. l. 27. *post* depingitur *adde* In rana et cochlea *LISTERVS* vidit z*).
- p. 240. l. 12. *adde* Ill. viri *Lazari SPALANZANI* experimenta diximus, qui in salamandra transfusum sanguinis ex arteria in venam, huic arteriae continuam, pariterque per ramos transuersos parallelae venae immisos versus cor redeuntem sanguinem s***) dixit.
- p. 242. l. antepenult. *post* frigore *adde* repulsum.
- p. 244. l. 14. *adde* *Francisci de la REYNA*, medici veterinarii, et *Oliue Sabugo*, feminae hispanae, alii circuitum sanguinis inuentum adscribunt, quos libros non vidi: nihil vero percipio ex ipsis laudatorum locis aut experimenti, aut rationis, quod virum nullius partis studiosum mouere possit.
- p. 248. l. 12. *adde* Frigida etiam *Olai WORMII* i*) et priora *CONRINGII* i***) de circuitu sanguinis inuento iudicia fuerunt. Monspelienſes adeo a vero admittendo alienos se praebuerunt, vt ob suam *HARVEIO* praestitam fidem *T. BARTHOLINVS* i***) in ea schola magna odia passus sit.
- p. 249. Paragraphum tricesimam tertiam in noua editione excipit

§. XXXIII *. *Nuperi aduersarii.*

Quae nuper in Gallia se extulit secta semistahlianorum, quae rebus humanis *Principium Vitale*, siue archaicum praefixit, vt in vniuersum anatonem et experi-

*) Profluxit forse. Not. edit. hui. auct.

i*) *BIRCH* IV. p. 205.

pag. 235. not. e) *adde* *Philosoph. Transact.* n. 20.

x*) *PANELLI* II. p. 296.

z*) Ap. *BIRCH*.

s***) De motu sanguinis.

i*) 444. 445 et anno 1645. p. 694.

i**) Ap. *WORM*. p. 444. 445.

i***) Ap. *WORM*. p. 672.

experimenta parui facit, ita in circuitum *Harveianum* cum acerbitate inuecta est, cuius causam non datur diuinare. Utuntur contra nobile inuentum meis et SPALANZANI experimentis, non factis, vt HARVEIO noceremus, et per quae id solum euincitur, sub mortis atriola, certisque in vitae humanae conditionibus, sanguinem retroire, et per arterias versus cor relabi, perque venas, nonnunquam ad sedem pertusi vasis contra ductum circuitus confluere. Oportebat veri amantes agnoscere, et SPALANZANVM, et me directe, nostris oculis, diuersos modos vidisse, quibus sanguis ex arteriis in venas transeat, et contrario ductu ad cor reuehatur. Deinde isti contemptores testimoniorum, quibus sensus vero subueniunt, nullum proprium periculum afferunt, quod quicquam de HARVEII affirmationibus detrahat. *Henricus FOVQVET*. demum potissimum contra demonstratum verum iasurrexit a*), et, qui nuper obiit, *Theophilus BORDEU* a**).
 p. 249. l. 19. lege qui post aliqua sua dubia egregiis etc.

SECTION IV.

L Y M P H A E I T E R .

Pag. 250. l. antepenult. lege praeter ea vasa aquosa, quae etc.
 p. 251. l. 10. lege in quas dicuntur se immittere.
 ibid. l. 17. adde et nuper G. HEWSON
 p. 252. l. 3. adde Demum in diuturno moerore, qui humorum motum retardat, vasa lymphatica turgida, coactaeque lymphae plena visa sunt c*).
 p. 253. l. 2. adde In cubiti vasis, quo loco quodque suo trunco inseritur, valvulam esse iter retrogradum morantem, sub ea longe viam versus digitos liberam patere lego. In lymphaticis pectoris vasis passim hydrargyrum contrariam legitimae viam sequi MECKELIVS. De lymphaticis vasis similia MONROVS iunior habet, et passim G. HEWSONVS.
 p. 255. l. 7. aliqua lege non satis vera
 ibid. l. 16. adde Et si aliqua, per arterias, vt puto, vasis serosis cum excretoriis ductibus coniunctio est f*).

EXCER-

p. 250. not. o) adde LANGSWERT, II. p. 7.

a*) In decem praelectionib. Monspelii 1777, 8. et in duodecim quaestionibus, ibid. 1776.

a**) Passim per sua opera.

c*) *Memoires présent.* IV. p. 192. 193.

f*) p. 166.

* * * * * *
* * * * *

EXCERPTVM EX PRAEFATIONE AVCTORIS SECVNDAE
PRIMI TOMI PARTI PRAEMISSA.

Plura mutata, auctaque in hoc volumine sunt, quam quidem in priori. Non ita valde in parte anatomica, tamen vt aliqua nupera inuenta adiecerim, vt PORTALII de fibris carnis auris cordis dextrae, et de nervis cordis, tum de iis nervis NEUBAVERI, etsi non potui summi olim incisoris laboribus perinde vtiliter frui, ac quidem licuisset, si ante editum *functionum* opus accepissem.

Dextras caueas cordis porro defendi ampliores esse.

In physiologicis aliqua mutavi, plura addidi. Mutare me aliqua coegerunt nuperorum cogitata, quae expendere, et aut probare necesse fuit, aut meas rationes opponere. Cor in sua systole tamen brevius reddi porro contra nuperrimos scriptores defendi, neque testudinem excepero; in anguilla enim, de qua eadem dubia repetuntur, manifesto vidi, sollicita cura adhibita, cor mucroni scalpelli apice suo obiectum in systole non laedi, in diastole vero vulnerari: quo in phaenomeno, nonnullisque aliis a CL. FONTANA inuitus dissentio. Sed et cor totum inaniri posse puto me ostendisse; neque posse solum, sed vere omnino inaniri, et demum, quoties cum superflite in cauis suis sanguine quiescit, causam silentii esse in virium defectu, qui non finat ad contractionem niti.

Ordinem etiam *Harueianum* in contractione sibi succedente partium cordis porro secutus sum. Neque in cordis viribus aestimandis a prioribus recedo: neque in cordis praerogatiua, quod solum vniuersitatem humorum in circulum agere potens sit, neque in alio privilegio, in quo haec ipsa praerogatiua fundatur, quod nempe cor super omnes alias corporis animalis partes natura irritabili emineat. Noui aliquas exceptiones esse: pleraque tamen experimenta pro corde stant.

Magni momenti porro est inquirere, quae sit scaturigo vis eius motricis adeo pertinaciter in corde conspicuae. Nempe quaeritur, num a nervis sit, aut solis, aut certe adiutoribus. Hic libratis et prioribus argumentis, et nouis, confirmor per experimenta, nullas quidem partes nervorum in cordis motu apparere, non tamen ideo continuo nullas esse dixerim, cum cor musculus sit, et nervos accipiat. Id verum manet, exiguas esse, quod illa vis aduentitia nervorum adeo exiguum portionem efficiat conspicui motus cordis, vt eo auxilio natura ad cor contrahendum minime egeat; atque in experimento absque nervorum auxilio perinde munere suo defungatur.

Stat ergo mihi, cordis irritabilitatem causam esse motus cordis. Haec eadem causa motus, vt in omnibus musculis, atque partibus contractilibus corporis animalis, causa pulsus est, vitaeque et incrementi. Neruofam vim suo loco addemus.

De stimulis aliqua licuit addere ex nuperis F. FONTANAE et SPALANZANI experimentis. Quae stimuli efficaciam destruunt, ea hic primum persequi potui, quae pericula fere apud CARMINATIVM fideliter et copiose exposita reperiuntur.

Potissimum vero hic repetendae fuerunt FONTANAE leges de amissa per ipsam contractionem natura contractili fibrae, vt post vnam irritationem vna contractio sequatur, post eam, nisi interim reparata sit irritabilitas, omnino quies.

Ab vno stimulo putat ergo Vir Cl. consumptam esse naturam irritabilem: verum eam vim, post quam exercendo se interiit, renasci, et sponte post aliquod tempusculum, iterumque efficaciter a stimulo ad motum reuocari. Quae causa sit alternarum vicium, quae vulgo in motibus a corde pendentibus percipiuntur.

Stahlianam porro animae potestatem reiicio. Ostendo etiam nuperorum inuentorum rotiferi animalis, et pigri, aliorumque vermiculorum longam in exercenda potestate intermissionem nihil posse ad abrogandam animae quamcunque potestatem.

Causam summae in motu constantiae, qua cor supra alios musculos eminet, non in saepe repetito motu poni putem, vt eo facilius cor contrahatur, quo frequentius se contrahit, lassitudo enim ista non videtur pati vera esse, eo certius musculi motum suppressura, quo saepius et potentius eodem tempore idem se contrahit.

Sed porro de fide experimenti certus sum, quo ostenditur, cor inanitus quiescere, vtique adeo in perpetua stimuli praesentia perpetuam cordis contractionem fundari.

Bernae, d. xx. Mens. Oct. clcclxxvii.

ELEMENTORVM PHYSIOLOGIAE

LIBER QVARTVS.

COR.

SECTIO I.

VELAMENTA EXTVS CIRCVMPOSITA.

Pag. 257. l. 18. *post* visum sit, *adde* Consentiant tamen plurima nupera experimenta, et sanam cum pleuritide pleuram repertam esse, et absque dolore inflammata, ipso demum III. HAENIO teste, et MORGAGNO. In viuo homine insensibilem CALDANVS per experimenta comperit. In alio experimento ipso in homine denudata pleura nullum doloris signum dedit, cum cutis irritatione vehementer doleret a). Mediastinum indolens esse CARRERE b).

p. 257. l. 19. *adde* Qui contra pleuram aut sanam, aut certe inflammata, dolere c) defendunt, non adeo experimenta d) producant, quam magnos nervos per superficiem dispersos. Ad litem autem de sede doloris in pleuritide non licet nobis hic nos demittere, quibus immensus in physiologicis campus apertus sit. Neque debent nerui, qui per eius superficiem decurrunt, pleurae tribui, cui soli ii adscribi possunt, qui in eius naturam diuiduntur.

ibid. l. 26. *post* vertebrae *adde* posita,

p. 258. l. 2. *retro* lege pone

p. 259. l. 14. *lege* terminetur.

p. 260. l. 3. *lege* ponebatur,

ibid. l. 4. *lege* pertinebat

p. 261. l. ult. *lege* aut ei pro externa etc.

pag.

a) G. DOWE de pleuritide. Edimburg, 1771. 8.

b) Inflamm. p. 470.

c) PANZANI Giornale di Medicina, 1776.

d) Ita HAENIUS rar. medendi, IX. p. 124. Qua dolor fuerat in pleura, inflammatio post mortem reperta est.

p. 257. not. x) *adde* HUBER Eph. Nat. Curiosor. III. obs. 101.

p. 262. l. 2. *ad verbum* coalescit *in textu* *adde* not. u*) Cor, pericardium, mediastinum, LIEVTAUD sepulchret. II. p. 57.

pag. 264. l. 23. *post paradoxus adde* Neque dissimilem historiam ZACVTVS habet *m**). Cor etiam in vulnere nudatum vidit Cl. GOOCH *m**). Est vbi sternum perforari oportuit, quo pus in caueam mediastini anteriorem effusum emitteretur.

p. 266. l. 13. *adde* Addit ad venam cauam BARDAVT.

p. 267. l. 1. pericardio *lege* mediastino

ibid. l. 6. *lege* innexa

ibid. l. 12. *post* locus *adde* in fetu maior

p. 268. l. vii. *adde* idemque in vespertilionem obtinere lego.

p. 270. l. 25. *adde* cum res vulgo nota non sit.

p. 276. l. 23. *post* DISDIER *adde* Ill. LIEVTAUD, comes nunc archiattrorum Gallicorum, tendineam membranam distinguit, et tenerum interius velamentum, et cellulosa telam, quae utramque membranam vniat. Porro in maioribus et senilibus corporibus tendineas fibras admittit, quarum equidem nullus certus ductus sit, quae ipsae cum tendineis fibris diaphragmatis continuantur. Verum ego quidem nihil ultra vidi. Exteriorem laminam PORTALIS retinuit.

p. 277. l. 21. *adde* Tendineam membranam et fibras tendineas habet vir Ill. I. LIEVTAUD *t**). Nuper Cl. SABBATIER spasmodicam pericardii constrictionem admisit *t**); verum neque tendo conuellitur, neque tendinei quid in pericardio humano est.

p. 278. l. 5. *adde* In viuo animale pericardium non contrahi CHIRACVS testis est *y**).

p. 280. l. 11. *adde* deinde GALENO.

ibid. l. 19. *post* DIONIS *adde* et a morte generari Ill. LIEVTAUD.

F 3

pag.

*m**) *Prax. chir.* I. p. 121.

*m**) *of wounds*, p. 337. HABICOT *Journ.* IV. L. VI.

p. 265. not. *b**) *adde* SABBATIER, II. p. 117.

p. 267. not. *r**) *adde* Ad 6 et 7 costae cartilaginem, VESALIUS, p. 321.

p. 268. l. 17 *ad verbum deduxisse in textu adde* not. *c**) Etiam MOSCATI, p. 25.

p. 268. not. *s**) *adde* In crocodilo Parisini.

p. 271. not. *a**) *spectat ad lincaam veritatem textus.*

p. 272. l. antepen. *ad verbum comprehendit in textu adde* not. *p**) *Gaine donnée aux deux grandes arrières*, LIEVTAUD *Mem. de l'Acad.* 1752. p. 257.

*r**) *Mem. de l'Acad.* 1752. p. 251. seqq. *Essais d'Anatom.* p. 187.

*r**) *Anat.* p. 135.

*y**) *Atuers.* p. 49.

p. 278. not. *c**) *adde* Ex oesophageis *Mem. des savans étrangers.* I. p. 291.

p. 280. not. *f**) *adde* Ita Cl. CARRERE *inflamm.* p. 470.

ibid. not. *i**) *adde* LIEVTAUD.

ibid. not. *k**) *adde* In leone Serrao, Neapel, 1764. 4.

- pag. 280. l. penult. *post* DIONIS *adde* Non in omnibus corporibus reperit
 I. LIEVTAUD *q**); neque in fatuis omnibus Cl. GREDING *q***).
- p. 281. l. 2. *adde* phthificis *y**), in convulsis *y***),
- p. 281. l. penult. *post* aqua *adde* in plurimis animalibus *h**),
- ibid. l. ead. *adde* cochleae *i**).
- p. 282. l. 1. *adde* in salamandra *n**),
- ibid. l. 3. *post* aëribus *adde* quas Rupe numerosas incidi;
- ibid. l. 7. *adde* H. VINK *k**).
- ibid. l. 10. *post* vulgaria esse *adde* Nunquam non reperit Cl. GREDING *k***).
- ibid. l. 15. *post* enecto *adde* In homine subito mortuo Cl. BASSANI *p**), in
 apoplectico Cl. P. C. FABRICIVS *p***).
- p. 283. l. 9. *adde* Constantiter in hominibus se vidisse SCHNEIDER *t**), VINK *t***),
 Ill. STOERK *t***), in fatuis frequenter GREDING *t*†), in infantibus mul-
 tam *t*††).
- p. 284. l. 10. *adde* inque fibras densantur *k**). Sponte demum in gelatinam
 constitit *k***). Quare si in cane vapor pericardii totus exhalavit, probabile
 est, in experimento Cl. viri putridum fuisse. Nam in pectore ipso coagula-
 bilem esse fatetur Cl. COTVNNVS *k****)).

pag.

- p. 280. not. o) *adde* P. C. FABRICIVS *progr.* 1759.
*q**). *Mem. de l'Acad.* 1752. p. 267.
- q***). GREDING apud LUDWIG *Aduersf.* II. p. 4.
- pag. 281. not. u) *adde* JAMES canine madness. p. 65.
- ibid. not. y) *adde* PLANCVS *app. ad acad. coniect.* p. CIII.
- y**) BIVMI.
- y***). MORGAGNI *de sed. et causis morbor. per anat. indag.* II. 410.
- h**) GALEN. *loc. affect.* L. V. JAMES l. c.
- i**) HARDER multum esse addidit.
- n**) SPALANZANI.
- pag. 282. not. d) *adde* CHIRAC *aduersf.* p. 57.
- k**) Bloedvaten p. 15.
- k***). *Aduersaria* LUDWIGII, III. p. 3. 4.
- p**) *Fränkische Anmerkungen*, IV. p. 72.
- p***). II. *Sammlung*, p. 10.
- t**) *Catarrh.* II. c. 9. *t***). l. c. *t****) *Ann.* I. p. 138. 139.
- t*†) l. c. multis productis exemplis.
- t*††) *Journal de médecine*, V. p. 120.
- pag. 283. not. a) *adde* COTVNNVS *isch.* p. 16. Subflava, p. 12. de hydropo pericardii
 HAEN l. c. 9.
- pag. 284. not. e) *adde* In homine melancholico. GREDING *adu.* III. p. 34.
- ibid. not. g) *adde* Gelatinosa LA FOSSE *cours d'hippiatrique*.
- ibid. not. h) *adde* Crustam sibi induxit GREDING.
- k**) *Ischias nervosa*, p. 25. 27.
- k***). GREDING.
- k****) VIEVSSENS *malad. intern.* II. p. 67.

pag. 284. l. 24. *lege* Est vbi cum syrupo florum maluae et violarum viridem cet. *ibid.* l. vlt. *post* reperta est *adde* quo frequentia exempla refero, in quibus Cl. viri exiguum huius aquae portiunculam viderunt cogi *g**)

p. 285. l. 3. apparuisse *lege* circumfufum habuiffe liquamen puris simile *s**) ; verum ea in fede pus adfuisse passim legas, et demum ipsum pericardium quasi in pus dissolutum *s***). Crustam inflammatoriam *s****), qua cordis superficies tegebatur, non dudum in febre epidemica mali moris frequenter vidimus.

ibid. l. 10. *adde* et in peripneumonicis

p. 286. l. 2. *adde* Eiusmodi glutine pericardium cum osse conferruminatum fuisse passim lego apud illustres viros HAENIVM *g**) et MORGAGNVN *g**)

p. 287. l. 20. *post* extant *adde* In tabe *h**), hydrope *h***), pectoris asthma *h****), post cordis *h*†) palpitationes, deliquia *h*††) animi, aliaque mala *h*†††).

p. 289. l. 15. *adde* Similia mala in cordis actione subnascuntur, quando pericardium crassescit *d**), et cartilagineum, et demum osseum fit, vt quidem non rarissime factum est. Durum cartilagineum, cum adhaereret VIEVSSENS *d***).

Adhaesio enim respirationi nocet. Septum enim transuersum difficiliter explanatur, et respiratio impeditur *d****).

Per vulnus tantisper amisso humore motum cordis vtique pergere non mireris *d*†).

pag.

*g**) MORGAGNI de sed. et caus. I. p. 184. II. p. 98. DVERNEY posth. II. p. 92.

*s**) BIRCH T. IV. p. 429. SENAC II. p. 346. 354. LIEVTAUD *précis*. p. 166.

*s***) *Journal de Trevoux* 174 Avril, MEDICVS *Wahrnehmungen*, p. 653, HAEN *rat. med.*

T. XIV.

*s****) STÖRK *ann.* II. DE HAEN T. XIV.

pag. 285. *ad verbum* spissescit in *textu* lin. 6. *adde* not. *s*****) Vitis COTVNVS pag.

29. 30.

ibid. not. *x*) *adde* In febre frequens esse LIND *fever. infect.* p. 280.

*g**) Ratio *medendi*, p. 45. *g***) De sed. et caus. morb. I. p. 171. II. p. 187.

pag. 287. not. *h*) *adde* Post vulnus cordis RICHARD *recueil* II. p. 594. Saepè VIEVSSENS *mal. int.* II. p. 168.

*h**) *Journ. med.* 1761. Mars. STÖRK *ann.* II. A peripneumonia SARCONI p. 58.

*h***) BRUNNER de corde occulto, Fränk. *Anmerk.* T. IV. p. 278. BADER *obs.* 8. HEVERMANN *urin.*

*h****) IENTY *course* T. III. p. 251.

h†) LIEVTAUD *sepulchret* II. 47. 17. *Journal. de médecine*, 1756. Févr.

h††) *Apoplexia* ADAVS *obs.*

h†††) Cardialgia HAEN, XI. Anxietas, debilis pulsus, MECKEL *mem.* V. XI. Hoc malum per omnes gradus increfcens vidi: paucis filis, MORG. *sed. caus.* II. pag. 96. vt ipse reperi, deinde latius per cartilaginem, demum totum pericardium.

*d**) Ad pollicem BADER *obs.* 36. *d***) *Malad. int.* p. 165. *d****) *ibid.* p. 168.

d†) HAEN T. XI. *Journ. de med.* 1761. mars. *Journ. des sçavans*, 1691. n. 2.

- pag. 290. l. 9. *adde* testudinem *p**),
 p. 291. l. 16. *adde* cum cor alio fundamento destituatur.
 ibid. l. ult. *adde* syncopas *g**)
 p. 292. l. 15. *adde* Annotatum est, medio solo in dorso quiescere posse, quibus is hydrops est *c**). Hydropem in cellulosa tela circumposita PORTALIVS vidit *c***).
 p. 293. l. 2. *adde* et passim testimonia reperimus.
 p. 294. l. 17. *post* glandulae *adde* aut PETRIOLIANAE *u**)
 ibid. l. 23. *adde* Proprios villos partem aquae pericardii stillantes SANTORINVS depinxit, quos eius interpretes pro cellulosa adipe ebria tela habet *x**).
 p. 295. l. 4. PVTEI *lege* POZZI.
 p. 296. l. 3. *adde* In viuo cane videas vaporem foetidum in guttas consistere *o**).
 In cane strangulato rubrum liquorem de auriculis exsudare POTALIVS vidit *o***).

- pag. 290. not. o) *adde* TARGIONI *viaggio*, VII. p. 171.
 ibid. not. p) *adde* Eph. Nat. Cur. II. I. obs. 130.
 p*) Feuillée *suite du journ.*
 pag. 291. not. f) *adde* Cum cordis laceratione vnciae 48. HAEN *rat. med.* IX. cap. I.
 ibid. not. g) *adde* VISO *colluv. sangu. saepe.*
 g*) LIEVTAUD *sepulchr.* II. p. 15, MORG. l. c. p. 20.
 p. 292. not. i) *adde* BARRERE, *obs.* 234. LIEVTAUD II. p. 60. 61. MORGAGNI, I.
 p. 136. 139. FANTON. *obs.* 37. *post* pleuritidem, BLASIVS I. *obs.* 19.
 ibid. not. p) *adde* HANNIBAL ALBERTINVS.
 ibid. not. q) *adde* COTVNN. l. c. p. 15.
 ibid. not. b) *adde* VIEVSSENS, *maladies internes*, p. 164. 165. etc.
 c*) VIEVSSENS *malad. intern.* p. 165.
 c**) l. c. p. 61.
 p. 293. not. e) *lege* XXX.
 u*) Nam sibi tribuit in *orto* *studere.*
 x*) SANTORIN. *posth.* p. 18.
 p. 295. not. g) *adde* IENTV III. p. 451.
 p. 296. not. o) *adde* de intervallis fibrarum cordis musculosorum se sudantem vidisse LA
 FOSSE *cours d'hippiatrique.*
 o*) KYPER *hum. pericard. n.* 36.
 o**) Ad LIEVTAUD p. 383.

S E C T I O II.

C O R D I S A V R I C V L A E.

Pag. 298. l. 1. *adde* lepore marino,
 ibid. l. 3. *adde* De rotifero ambigitur; sunt, qui admittant (*), sunt, qui dubitent (**).

ibid. l. 10. *post* reperit *adde* Nullum est in seta aquatica m*); nullum, quantum reperi, in aenia, in holothurio m**), nullum in echino m***).

ibid. l. antepen. Verum pisces aliqui - - - incumbente adipe habere obseruauerunt, *lege* Sic et in cochlea veri nominis cor est, certe in cochlea, quae vitalem humorem per sua vasa in corpus p) didit.

In vermibus terrestribus et aquaticis, in scolopendra et marina hystrice, inque multis insectis reperitur alternis nodis interstinctum q). Id cor in vermibus videtur intra canalem alimentarium contineri r), et ex duobus s), tribusue truncis fieri t). Idem vero cor, etsi salit, motuque videtur peristaltico agitari, tamen quod nulla in vasa suum humorem didat, *Petrus LYONNET* certe in eruca, cor verum esse negat. Analogia tamen et motus, et proportio ad corpus cylindricum animalis, cor esse suaserint, et paradoxum videtur, cum alii Cl. viri, minori cum vitrorum conuexorum apparatu, insectorum vasa viderint, *LYONNETO* nulla apparuisse; de qua equidem lite nihil habeo, quod de meo lucis afferam t*)

Vnicum denique in omni animali cor est, neque enim exceptionem a monstrosis fetibus repetas, in quibus nonnunquam cum duobus capitibus duo corda fuerunt. Si vnquam, vt in raro illo *VIEVSSENII* t**) exemplo, vere duo corda in eodem homine, inque quadrupede visa sunt, putes mon-

strofiae

p. 298. not. i) *adde* *CORTI* p. 177.

l*) *CORTI* p. 173. oscillans vllum quamdiu rota circumagitur, *FONTANA viper.* p. 150.

l**) *SPALANZANVS*, qui pro ventriculo habet.

m*) *FONTANA viper.* p. 147.

m**) *Svensk. Vet. Acad. Handl.* 1765.

m***) *Comment. Acad. Bonon.* VI. p. 241.

p) *HARDER in obs.*

q) *PALLAS miscell.* p. 130. in *Nereide*.

r) *MÜLLER Wasserwürmer*, p. 27. 28. 29.

s) *Id. ib. Naturforsch. Gesellsch.* 373. 374. in animaculo aquatico.

t) *Naturforsch. Gesellsch.* I. c.

t*) *Conf. Lib. II. et Auctar* p. 19.

t**) *Malad. mern.* T. II.

strosae fabricae fuisse vestigium, qualis est in corde inuerso, quod mucrone suo dextrorsum inclinatur. Duo esse in perdicibus doleas SPONIO excidisse, erudito viro. VIEVSSENI secundum cor dilatatam venam cauam fuisse Cl. SABBATIER autumat.

Si cor longum erucarum et vermium quemque nodum habet seorsum salientem *u)*, videbitur potius esse canalis alterne dilatatus, quam cordum series. In nereide cuique articulo suam esse arteriam MÜLLERVS *x)*. Verum non dubium est, quin a cauda, vna continua serie, sanguis ad caput promoueatur.

p. 299. l. 18. *lege* rectilineo

p. 302. l. 13. *adde* Sed etiam superiores medici pro re insolita habuerunt, quod cor mucroni suo non diaphragma, verum sinistras costas respiceret *l*)*.

p. 303. l. 8. *post* mutare *adde* et inspirante animali retrorsum descendere, expirante sursum et extrorsum *e*)*

p. 304. l. 10 *post* perciperetur *adde* In latere dextro cor frequenter pulsauit, idque vitium saepius STORCHIVS vidit, quando aqua in pectus effusa erat *k*)*

ibid. l. 13. *post* TORREZ *adde* et apud Ill. SANDYFORTIVM Cl. DINKLER,

ibid. l. 19. *lege* de pectore emeruisse,

p. 305. l. 10. *adde* Cor venarum esse principium olim ARISTOTELES dixit *r*)*.

Cor ad venas pertinere idem Stagyrtes *r**)*. De auriculis res manifestior est.

ibid. l. penult. *adde* Ranae aliquid simile est, vena nempe caua sub corde amplissima; sic in piscibus video, inque phoca, animali calido, quod ex vitae suae ratione diu sub aquis degere cogitur. Amplissimum receptaculum in bipede amphibio HVNTERVS reperit, pericardii simile, et perinde cor comprehendens.

p. 306. l. 14. *retro lege* pone

p. 307. l. 1. *adde* inque amphibio animali bipede HVNTERI

pag.

u) MÜLLER l. c. p. 175.

x) *Wasserwürmer*, p. 27. 28.

l)* *Eph. Nat. Cur. Dec. III. ann. 3. obs. 188.*

e)* Habet etiam SABBATIER *anat. II. p. 136. 137.*

p. 303. *ad verbum* declinat in *rexxu* *adde* not. d) SABBATIER, *ibid.*

p. 304. not. e) *adde* AVBERTIN *Journ. de Medec. 1776 May. Studgard. ökonom. Samml. n. 2.*

p. 304. not. k) *adde* l. L. TARGIONI *raccolta I. p. 122.*

k)* *Fahrgaeng. 1721. p. 58. et alias.*

r)* *Somn. vigil. part. anim. II. c. 4.*

*r**)* *Part. Anim. II. c. 4.*

p. 306. not. i) *adde* In Xiphia KÖLPIN *Svenska Vet. Handling.*

pag. 307. l. 6. *adde* Suspiceris alteram auriculam hoc ipsum carnosum esse receptaculum, vel demum imperfecto septo auriculam diuidi, vt in lacerta apode s*).

ibid. l. 9. *adde* cochleae.

p. 308. l. 17. *post* duas *adde* MORGAGNVS g*), et PORTALIUS i*).

ibid. l. 21. *adde* vt tamen verae carnis aliqua crassitie distingui videantur.

Ultima sextae paragraphi verba: Quare non male - - - relatae fuerunt *Autor* in noua editione ad quintam paragraphum retulit.

p. 309. l. 16. *adde* in equo et boue certe in basin auriculae LANCISIUS.

ibid. l. 17. *lege* ea fabrica

p. 310. l. 6. *adde* duas Cl. POHL e*), quae aortae vtrumque latas tegebant, et quarum dextra maior erat, sinistra ex renali sinistra orta in duas iliacas findebatur. Alio modo duae cauae venae sunt, et constanter, in ouiparis frigidis, vt in crocodilo e**).

ibid. l. 10. *post* donarunt *adde* minus commodè, cum nunquam ad sphincteris modum suam venam claudant.

p. 312. l. 6. *adde* Nuper demum Cl. PORTALIUS z*) has fibras auriculae dextrae nouiter descriptas dedit. In vniuersum enim fere alias longitudinales, cordi parallelas esse; non oriri a fibris cordis, hinc auriculam coctam de corde decedere, vt in morbo etiam visum est z**). Aliae porro fibrae auriculae dextrae circumducuntur, eaeque vberiores sunt. In apice vniiformiter contorqueri addit, et vasa (quae?) ambire, denique in fasciculos abire; supremas sibi propiores esse; in coniunctione auris dextrae cum vena caua superiore in torum intumescere. In fundo auricularum telam esse fibrarum muscularium; sub iis duos latos fasciculos se decussare, in ventriculos terminatos, et pone vtramque aortam vniri. Sub istis planum esse continuum fibrarum longitudinalium pene parallelarum, transuersarum, quae se circa orificia ventriculorum circumducant. Ex fundo auriculae dextrae in columnas recuruas fecedere, et in diuersa abire versus auriculae conuexitatem; alias compositas, simplices alias, quarum illae passim tendineae sint, istae totae carnae. Hae columnae simplices et compositae faciunt rete, ventriculorum reti fere simile.

G 2

Exterius

s*) *Nov. Comment. Acad. Petrop.* Vol. XIX.

g*) *Adv. Anat.* V. 22.

i*) *Ad LIEVTAYD T. I.* p. 414. 415.

e*) *Progr. de venar. variet.* 1773. 4.

e**) *Acad. Parisin. Mem. pour l'histoire.* etc.

z*) *l. c.* p. 400. seqq.

z**) *Apud QVEXE Sync.* p. 76. saccus pulmonalis ab auricula diuulsus dicitur.

Exterius fasciculo musculoſo ambiuntur, et duos fasciculos conſtituunt, in vena caua inferiori, inque ſuperiori poſitos, ad latera diſcedentes, etiam circulares. Nolim nuperrimam deſcriptionem per me ignorari, etſi mihi intellectu difficilis fuit.

pag. 312. l. 17. *lege ſanguinis*

ibid. l. 18. *adde* In pullo incubato aliquoties nimiam dextrae auriculae dilatationem, vidi et *dele ea, quae in huius paragraphi fine de irritabilitate muſculorum auriculae dicta ſunt.*

p. 314. l. 14. *lege* venae cauae inferioris, *ſed in noua quoque editione corruptus eſt hic locus; videtur legendum eſſe:* ad auertendum a ſanguine venae cauae inferioris pondus ſanguinis venae cauae ſuperioris, etc.

p. 316. l. 6. *lege* Vittam

p. 318. l. ult. *poſt* interponitur *adde* tum fibrae carneaе venae.

p. 319. l. 18. *adde* Sed neque facile puto valuulam deſiderari, etſi ea DVVERNEYI vox extat.

ibid. l. 25. *poſt* fabrica *adde* in noſtra valuula

p. 320. l. 14. *lege* eandem intercedere poſſe,

ibid. l. 16. *adde* in eo ſanguinem verſus foramen ouale ducere, fibrasque muſculares valuulam anguſtiorē reddere dictum eſt, vt aditus ad aurem lateſcat.

Quare nuper ab Ill. LOBSTEINIO annotatum eſt, foramen ouale etiam in adulto homine patere, quoties valuula deleta eſt, aut certe in reticulum reſoluta; quando autem foramen ouale clauſum eſt, valuula ſolet integrior ſupereſſe. Quo ipſo confirmatur, eam ab imperu nitentis ſanguinis rumpi.

p. 321. l. ult. *adde* Ita nuper vidit F. A. WEBER y*).

p. 323. l. 9. *adde* Aliam deſcriptionem vide apud PORTALIVM g*).

ibid. l. 13. *adde* denique annuli oualis foramen ouale ambientis partem inferiorem, tranſtui ſuppoſitam; et muſculum in ſoſſam oualem deſcendentem.

ibid. l. 24. *poſt* exponas *adde* Maiorem rationem inuenit Ill. MECKELIVS, quae ſit 16. ad 7.

p. 324. l. 2. *adde* In fetu auriculae ventriculis capaciores ſunt. Contra in adultis hominibus o*). Sic in lacerta apode auricula ventriculum magnitudine ſuperat o**).

SECTIO

pag. 312. *ad verbum poſtulant in textu adde* not. b*) Don. MONRO in *Eff. phyſ. and literature*. III. p. 272.

pag. 317. not. g) lin. I. Tab. II. *lege* Tab. I.

y*) *Obſ. anat.* 4.

g*) l. c.

pag. 323. not. k) 24 *lege* 14.

o*) PORTAL l. c. p. 435.

o**) *Nou. Comm. Acad. Petrop.* T. XIX.

S E C T I O III.

C O R D I S I P S I V S F A B R I C A .

Pag. 325. l. 6. *post* colligitur *adde* Idem per inflammationem et suppurationem consumitur, ut in vulnere cordis d*).

Minime enim rarum est, cor etiam in epidemicis malis inflammari, et abscissibus extus erodi, quorum pus in pericadium effluit. Per alios morbos vix evanescit, et in phthisicis reperitur, quando non alibi pinguedo superest. Est etiam, ubi praeter morem auctus cor compressit, et in minorem molem redegit.

ibid. l. 7. *eo lege* in has cellulas

ibid. l. 11. *adde* quae numerosissimis aliis augere possem; cartilagineae, osseae, lapideae materiae inter fibras, et in cordis superficie effusae.

p. 326. l. 3. *post* aestimatum *adde* ab alio ad 13. nonnunquam etiam 24 et 28 vnciarum pondus attigit, et in *Gustavo Adolpho* vnciarum 26.

ibid. l. 15. *adde* In fetu uterque ventriculus aequali est crassitie.

ibid. l. 16. *post* ventriculus *adde* et facilius dilatur,

ibid. l. 22. *post* crepat *adde* Et ea etiam in sede in augustissimo olim principe dissiluit.

p. 328. l. 9. *post* desit *adde* In senibus magnum discrimen esse PORTALIS a*), ut in ventriculo dextro septem, in sinistro quinque vnciae liquoris contineantur. Huic ipsi senio eam enormem cordis latitudinem tribuas.

ibid. l. 11. *lege* quae in cadauere apparuit,

ibid. l. 14. *dele* et I. N. WEISS,

ibid. l. 15. *lege* inuenit et *adde* alique nuperi, mira e) distinctione vsi, utique ventriculum dextrum ampliorem videri, neque tamen vere ampliorem esse, dilatabilem vero magis, et a sanguine de vena pulmonali redeunte fortius distentum

G 3

stentum

d*) RICHARD p. 559.

pag. 325. not f) lin. 1. *adde* In MAXIMILIANO II. asthmatico ossæ natura prope valvulas cordis cum hydropse pectoris A. THANMÜLLER apud WELSCH Cent. IV. Cas. 35. — lin. 11. *adde* Duo ossa follicite descripta, tum alia quasi testacea, et cartilaginea in intimis cordis, et in aorta pariter squamæ osseae CRVVEL cord. vaf. osteogen. — lin. 14. *adde* Anseris cor totum osse factum, le MEILLEVR Journ. de med. Mars 1770. — lin. vlr. Tom. nouiss. p. 106. 107. *lege* T. XII. p. 52.

pag. 327. not. u) *adde* Aequales SABBATIER II. p. 159.

a*) PORTAL l. c. p. 495.

e) *lege* I. N. WEISS Progr. anat. V. p. 15. 16. et in disp. de dextro cordis ventriculo post mortem ampliorem. Nempe in vino homine negat disseire.

stentum latiore videri. Poterant meminisse Cl. viri, in viuo homine, de quo negant, eam ipsam causam ventriculū dextrum perinde latiore reddere.

p. 328. l. 18. *post* ventriculū *adde* in adulto homine

ibid. l. 22. *adde* Hic interim monco, ventriculū dextrum serioris temporis partem videri, ut aliquamdiu cor embryonis vnico ventriculo constet, qui nempe aortam educit arteriam: deinde ad tuberculi similitudinem de vnico sinistro ventriculo dexter incipit emergere, et aliquamdiu, ad quintum mensem, minor est, quam sinister, minor etiam in phoca, cuius foramen ouale apertum, et fabrica eadem est, quae fetui. In maturo infante eadem vtriusque ventriculi est capacitas. Deinde paulatim vincit dexter, et eo maiori fere ratione, quo aetas est prouectior. Casu utique haec ratio turbari potest. Cum aorta arteria ossēa esset, et ventriculus sinister malignius se inaniret, idem dextro amplior fuit g*).

p. 331. l. 13. *lege* si omnino aliquam cet.

p. 333. l. 20. *adde* Quae pars ventriculi ad arteriam ducit, eadem leuior est, et minus elatis musculis carnosus distinguitur.

p. 335. l. 14. *post* duas *adde* In Xiphia valvulas arteriosas similes vidit Cl. KÖL-
PIN k*).

ibid. l. 21. *lege* arteria pulmonalis

p. 336. l. 7. *adde* Splendidi quid subesse nonnunquam non repugno.

p. 338. l. 21. *post* occurrit *adde* neque eam PORTALIS recipit s*).

p. 341. l. 7. *adde* Nescio an forte ARISTOTELI occurrerit aliquid simile eius, quod nuper DONALDUS MONRO vidit, sinus nempe ad apicem cordis ascendebat polypis plenus, in sinistram ventriculū apertus a*).

p. 343. *Paragraphus decima quarta in noua editione sic incipit*: Primigenius iste solus cor constituit cum minimo dextro, quamdiu pulmo nondum euolutus exiguum sanguinem admittit. Idem ventriculus cordis sinister rectius posterior vocatus, et nuper secundus minus commode, qui primus existat t*).

Idem fere cum dextro descriptus est, cet.

ibid. l. 9. *adde* Musculi papillares valvulas retinentes tres, quatuorue.

ibid. l. 12. *lege* et aliquando dextro minus.

pag.

g*) Apud MECKELIUM.

pag. 331. not. r) *lege* Tab. 28.

k*) l. c.

s*) l. c. p. 427.

a*) Praelect. p. 107.

pag. 342. ad PAYANI nomen in textu lin. 6. *adde* not. k*) Epist. de sepro cordis, p. 262.

- pag. 344. l. 9. *adde* tendines numerosi ex musculis papillaribus orti plurium ordinum, et sibi incumbunt imbricati, et in triangula expansi.
- ibid. lin. ult. *adde* Cartilagineas cum polypo vidit Cl. LOEBER a*).
- p. 347. l. 16. *lege* via.
- ibid. l. 18. *adde* Neque rarum est, coalescere, ut ostium perangustum ex corde pateat. Post orthopnoeam, aut asphyxiam valvulae ossae et lapideae ostium aortae pene claudere p*).
- p. 348. l. 7. *post* IDEM *adde* sed omnino nullum nuper vir ill. P. CAMPER y*).
- ibid. l. 11. *post* PLEMPIVS *adde*, Et in eo animali ab ipsa natura pendere videtur, non a morbo, cum in vituli corde amici Amstelodamenses iam ossiculum cum medulla repererint b*).
- ibid. l. 15. *adde* In Alce, de cerui genere, perinde repertum est.
- p. 351. l. 14. *adde* Consentit nobiscum Ill. LVDWIGIVS a*).
- p. 354. l. 25. *adde* Ita Ill. LIEVTAUD sinistrum ventriculum a dextro et eius fibris comprehendi reliquit.
- p. 357. l. 16. *adde* Ill. denique LIEVTAUD ita has fibras descripsit, ut summam operis difficultatem ipse sentiret.
- p. 358. l. 6. *dele* nondum autem ius acquisui edendae.
- ibid. l. 15. *post* demum *adde* aliorum ad experimenta.
- ibid. l. ead. haec *lege* hoc
- p. 360. l. 8. ad *lege* a
- ibid. l. 9. *lege* confiniis
- p. 364. l. 16. *adde* Qui vero nuper eiusmodi vertebralem nervum dixerunt, ad cor tamen non duxerunt h*).
- p. 366. l. 16. *adde* His post primam editionem addi possunt, quae in posthumis Iosephus Guichard DUVERNEY, et in disputatione ann. 1772. vir doctiss. Adolphus MURRAY de his cordis nervis dederunt. Demum non possum PORTALII nervos omittere, quos icone illustraverit, nostrasque et SENACI descriptiones incompletas vocet. Duos esse plexus, *superiorem* maiorem, inter duos

a*) *De cordis fabrica*, edit. 1767. 4

p*) LIEVTAUD *sepulchr.* II. p. 40. 44. et 45.

y*) *In letter-Oeffning.*

b*) *Colleg. priv. Amstel.* II.

pag. 350. not. p) *adde* CHIRAC *advers.* p. 250.

a*) *Epistol.* 169. ad me.

pag. 358. not. i) *lege* Prostat haec tabula in *Nou. Comm. Soc. Reg. Acad. Gott.* T. II.

pag. 360. not. u) *lege* 85.

pag. 363. not. o) *lege* 36. 37.

ibid. not. s) *lege* 29. 30.

h*) SABBATIER *anatomic.*

duos bronchos positum magis ad sinistra: dare ei broncho furculos o*), tamen ut alius sit, aliusque. Esse, ubi fere a solo octauo neruo fiat.

Inferiorem plexum et minorem imponi basi cordis ad latus radice magnarum artiarum, magis in sinistris. Oriri a neruis plexus superioris, qui rami coronarias arterias ambiunt o**).

Alios neruos super magnas arterias spargi o***). In dextro latere ramos a laryngeo neruo octauo paris, a trunco octauo sub clauicula, a cardiaco superiori intercostalis ramo, a recurrente dextro, ab octauo sub eo neruo nasci.

In sinistro latere ab octauo prope glandulam thyreoideam neruum venire, cuius furculus alter in aortam spargitur, alter pulmonem adit et cor. Tum a recurrente sinistro flabeliformem ramum prodire ad plexum magnum; in faciem superiorem ventriculi, et alium posteriorem in aortam.

Ramos aliquos plexum superiorem perficere, alios super neruos incedere, venasque cordis, serpentino ductu. Porro alios ramos octauum par dare ad aurem sinistram, eiusque venas.

Intercostalis neruus dat neruum superiorem praelongum a laryngeo furculo natum, sub aortae arcu transeuntem, coniunctum cum ramis ganglii vertebralis inferioris euntem ad plexum superiorem. Non constantem esse o†).

Alius neruus, ex media ceruice aut inferius natus, recipit ramum paris octauo, descendit, in fila diuiditur, posteriora ad magnum plexum, anteriora ad magnas arterias o††).

Iterum a ganglio ceruicali inferiori furculis it, multos abiens in ramos, quorum aliqui cum recurrentis furculis coniunguntur, etiam alio modo ludens.

Truncus sinister intercostalis fere similes dextro furculos dat, tantum ut sinistram ramum fere antrorsum, dextri retrorsum eant, sinistri inferior oriantur, cardiacus superior fere ex medio collo nascatur, eius vnus ramus inter duas arterias magnas cor adeat, furculus pulmones o†††).

A ganglio ceruicali vltimo furculus etiam a primo dorsali accedit. Haec *PORIALIVS*, quae pleniora nostris videtur existimare. Multa nos aliter vidimus; superiorem cardiacum plerumque in sinistro latere supremo loco, multo pluribus ramis conspicuum; ex ganglio ceruicali medio ramos alio ordine, denique non omnes, sed multos, ex imo.

§. XXVIII.

o*) Ad *LIEVTAUD anar.* p. 651. T. I. g.

o**) p. 652. T. I. g.

o***) T. I.

o†) p. 653. o††) p. 654. o†††) p. 655.

§. XXVIII*. *Ioh. Ernesti NEUBAUER, Nervi dextri.*

Hunc egregium virum nuper amissimus. Pleraque o + + + +) cum meis satis consentiunt, quorum ecce compendium.

Nervus cardiacus superficialis raro ex solis nervis mollibus, plerumque ex ganglio ceruicali superiori, coniunctis cum molli furculis, et ex aliis nervi intercostalis ramis in collo natis, etiam cum ramo ex thyreoideo ganglio, prodit, commistus cum ramis ab eo ganglio cardiacis, trans subclauiam arteriam it, in ea potissimum finitur, ramis nonnunquam in plexum cardiacum datis.

Ganglion ceruicale medium nervi intercostalis ramos ad plexum cardiacum emittit, aliis cum nervo cardiaco superficiali communicat, et nonnunquam principes cordis nervos constituit.

Ganglion ceruicale infimum cum recurrente communicat, et cum superficiali cardilaco; sed potissimum principem cordis plexum constituit, tantum ut in ramorum numero et situ ludat, tum ganglion thoracicum primum auget. Plexus ipse inter duos magnos arteriarum principum truncos ponitur.

pag. 367. l. 2. *adde* Habet tamen simile quid PORTALIVS, nervum natum supra diaphragma, ab intercostali, vnum, alterumue s*).

p. 368. l. 13. *post* salire *adde* Cl. etiam SPALANZANVS in suis minutis animalculis vidit, vasa cordis in eius systole repleti, in diastole evanescere. Nobiscum sentit, quem honoris causa nomino, Cl. SABBATIER b*).

Nuper Cl. MIEG et a corde has arterias repleti docuit, et ab aorta, cuius sanguis retrorsum versus cor nitatur; huc puto referas, quod etiam in diastole cordis coronaria percussa saliat, equidem debilius. Verum si in spirante bestia etc.

p. 369 l. 4. *post* expallescit *adde* uti iam 1740 in praelectionibus BOERHAVIANIS monui

ibid. l. 7. *post* quadrupedum *adde* Vidit nuper in infantis humani pendulo corde Cl. DINKLER apud SANDYFORTVM.

ibid. l. 16. *lege* residet in maioribus

p. 370. l. 1. admissi *lege* non negat

ibid. l. 3. *adde* et MIEGIO

pag.

o + + + +) In proprio libello, Francf. 1772. 4.

s*) p. 655.

b*) Cl. Vir Achilles MIEG, *theses* 1776.

pag. 380. not. d) *adde* Nobiscum etiam Cl. PORTALIVS p. 443. et in icone.

ibid. ad verbum expallescere in *textu* lin. penult. *adde* not. g*) CHIRAC *advers.* 232. etc.

pag. 370. l. 7. *adde* Necdum certo puto oculis constare, in sano homine, cu libera vasa sunt, tantam esse arteriae constrictionem, ut sanguis contra subsequens in plena aorta fluentum retroagatur. Valvulas callosas vidi, ut non possent ostia arteriarum tegere *).

p. 371. l. 1. *lege* neque alium ductum fere necessitas tulit,

ibid. l. 17. *post* reperitur *adde* etsi sunt, qui eius modi quid in hac arteriae tunica viderunt.

ibid. l. antepenult. *adde* Ruptam fuisse in variolis exemplum extat.

p. 373. l. antepen. *adde* sed exiguam, quam Cl. NEUBAVER aliquando infiniorem vidit, saepe et plures vidi.

p. 374. l. 13. *dele.* vimerosi.

p. 376. l. 17. *post* valvulas *adde* Parisiis a. 1727.

p. 380. l. 20. *adde* Ex vena caua ad sinistrum sinum euntem venam vidi.

ibid. l. 26. *lege* impulsus in eius caueam emitte.

p. 382. l. 8. *post* mora *adde* etiam in Cl. Viri *Arnoldi* DVNZII experimentis,

p. 383. l. ult. *adde* neque innatum calorem ARISTOTELI dictum,

p. 384. l. 20. sunt *lege* esse dicuntur,

ibid. l. 26. *post* admitti *adde* Sed neque in elephante *Petrus* CAMPER, peritus incisor, glandulas DVVERN OII reperit.

p. 385. l. 17. *adde* neque nuper Cl. *Guilielmus* HEWSON.

*) SANTORIN. p. 117.

pag. 382. *ad verbum* auricula *in textu* lin. 6. *adde* not. a*) VIEVSSENS *mal. int.*

p. 85. *et ad verbum* suu not. b*) VIEVSSENS l. c. *mal. int.* p. 12. 85.

ibid. not. g) *adde* PORTAL.

ibid. not. r) *adde* PORTAL.

ibid. not. s) *adde* PORTAL.

ibid. not. t) *adde* PORTAL.

ibid. not. a) *adde* PORTAL p. 445. *mal. int.* II. p. 54. 12.

ibid. not. c) *lin.* 2. *adde* Tantundem et in dextro *mal. int.* II. p. 85. *et lin.* 5. *adde* In ventriculum sinistrum PORTAL l. c.

ibid. not. e) *adde* SABBATIER *anat.* II. p. 152.

pag. 368. not. l) *adde* In animalculo microscopico WRISBERG *sarur.* p. 69.

pag. 387. not. a) *adde* FONTANA *leg. irritabilitat.*

pag. 388. *ad verbum* manet *in textu* lin. 19. *adde* not. h) Legem nuper confirmavit III. FONTANA *et in ricerche fisiologiche.*

SECTION IV.

MOTVS CORDIS.

Pag. 389. l. 5. *adde* Videtur enim contractio musculi eius irritabilitatem debilitare, et demum destruire, vt quiescere ei necesse sit, etiam si causa stimuli superfuerit: nam cor etiam, quod fusus repetetur *n**), lapideo concremento perpetuo irritatum, alterne tamen quiescit.

p. 390. l. 10. *post* durius sit, *adde* dum contrahitur,

ibid. l. 14. quam in systole minui scripsi, *lege* quam in diastole minorem nunc esse scripsi,

ibid. l. 20. breuius *lege* longius

p. 391. l. 5. *post* QVEYE *adde* aut vir Cl. qui calamum amico praestitisse dicitur, FOVRNIER,

p. 392. l. 2. *post* excitauit *adde* Vidit in homine Cl. DINKLER.

ibid. l. 13. Denique, quid Cl. QVEYE - - - cordibus insigniter differt, *lege* De animalibus frigidi sanguinis lis nondum confecta videtur. Mecum equidem Cl. SPALLANZANVS sentit, qui in salamandra, etiam mensuris captis, apicem ad basin accedere vidit. Deinde cum *Felix* FONTANA et in rana, et in anguilla, et in testudine, cor in agendo longius esse confirmaret, eamque anomalam peculiari cordis fabricae tribueret, molle enim esse, et in diastole sanguinem in cor receptum, a mucrone ad basin descendere, cum idem superior sit, sic accedente ad basin mucrone cor breuius fieri: in systole vero cor sanguinem suum expellere, ita distendente humore se liberare, et naturalem longitudinem recuperare *e*).

Verum in rana quidem hic Ill. viro aliquid imposuisse certus sum, qui oppositum acus mucronem a corde animalculi in systole non attingi, in diastole omnino feriri repetito viderim.

Sed neque in anguilla quicquam reperio, cur alio modo in constrictione mutetur.

p. 392. l. 19. *lege* longius fieri putatum est.

ibid. l. 22. *post* scripserunt *adde* Verum nuper vir acutissimi iudicii M. Ant. L. CALDANVS et in testudine cor contractum breuius fieri vidit, et in rana, et in anguilla, in qua ego quidem propria experimenta non habeo, nihil reperio, cur aliter se habeat, quam in affinis frigidi sanguinis quadrupedibus.

H 2

pag.

*n**) L. XI. L. IV. Sect. V.

e) *Ricerche fisiologiche*, p. 221. In testudine breuius fieri olim scripserat *Epist.* T. IV.

pag. 392. l. penult. eiusmodi *lege* aliam

p. 393. l. 24. *lege* perfectissime intumescit et repletur, eo magis quod etiam aliquis ex contracto eo ventriculo sanguis in auriculam redeat o*), et ipse praeterea etc.

ibid. l. penult. *adde* Addit Cl. FERREIN motum conuersionis. Cor nempe circa medium in basi punctum arcum circuli describere: eius motus causam esse, quod sinister sinus vehementius compressus cor magis ad sinistram replet, quam dexter sinus ad dextra, per sua experimenta p*).

p. 394. l. 11. *adde* Ita nuper Cl. FOVRNIER r*) ostendit, cordis pulsationem non esse a resistentia sinus sinistri repleti. Aqua sinum dextrum repleuit, vidit cor perinde ad costas accedere, vti accedit, quando auriculam sinistram repleuerat.

p. 395. l. 7. *lege* latiore

p. 396. l. 2. *lege* quem errorem ab ARISTOTELE ortum CARTESIVM etc.

p. 397. l. 10. *post* euacuari *adde* Et nuper eo rediit lil. FELIX FONTANA, in ipso pullo e*), et in frigidis animalibus ruborem aliquem in corde contracto superesse e**), in calidis vero animalibus eneatis nunquam non aliquam sanguinis copiam se in corde reperisse e***). A nuce vomica data cor sanguine plenum e†). Nam etiam in systole aliquantum sanguinis in cor redire ex arteriis coronariis e††), cum pariter etiam a sanguine de carotide redeunte repletur e†††).

p. 398. l. 2. *dele* neque editis

ibid. l. 5. *adde* Eadem phaenomena in salamandra, et in rana SPALANZANVS, in pullo, qui ovo continetur, HARVEIVS et CALDANVS viderunt. Id facile dederim, debile m**) cor nonnunquam minus bene euacuari, cuius cuen-

tus

o*) SABBATIER II. p. 146. 147.

pag. 393. *ad verba* cedere possit *in textu adde* not. o**) FERREIN duodecim quaest. qui hunc motum rectum vocat, et sinibus repletis tribuit.

p*) l. c.

pag. 394. not. g) *adde* LAMVRE Anonymus ad l. de Cacao. Aliquid conferre SABBATIER.

r*) Journ. de medec. 1774. Iuillet.

pag. 394. not. x) *adde* Vide in Oper. anat. min. T. I. p. 164. seqq.

e*) Recherche p. 117.

e**) Ibid. p. 118.

e***) Ibid. p. 120.

e†) Strahlsfund. Magaz. I.

e††) Recherche p. 105.

e†††) MIEG thes. a. 1776.

pag. 397. not. l) *adde* CHIRAC aduers. p. 292. de corde in vniuersum.

pag. 398. *ad verbum* feci *in textu* lin. 2. *adde* not. m*) Oper. min. p. 265.

m**) Irritabilitate destructa Strahlsfund. Magazin.

tus testimonium est in historia monstrofi infantis DINKLERIANI, eius enim cor nudum non euacuabatur. Robustum vero cor, et impatiens stimuli, vtiq; in homine perinde inaniri aequum est, vt in pullo et cane inanitur. Ipse demum sibi FONTANA respondet, qui cor, vt alios musculos, irritabilitatem ipsam per motum amittere scripsit, quare minime euacuatum tamen alterne laxari, quod et ipse vidi *m****).

Si autem omnino cor non integre euacuetur, tamen necesse fuerit ad eam angustiam idem reduci, vt quolibet in pulsū nihil de sanguine retineat, nisi eandem semper sanguinis copiam, quae in primo pulsū in corde superfuerat.

Si vnica gutta in quoque pulsū intra ventriculos relinqueretur, et decem guttae in decem pulsibus intra vnicum diem, in fere 100000 pulsationibus, enormem copiam sanguinis in corde manere necesse foret, qualem omnino continere non posset.

Quare quoties cor ob valvulas aorticas obstructas, ob concrementum osseum cor comprimens, aut ob aortam arteriam osseam, aut ob arctatam, aut polypos maligne euacuatur, toties innumerabilibus in exemplis idem miram in molem dilatatur, qualem, quae totum pectus repleret, in iuvene vidi. Vidit id LANCISIVS *m†*), et exempla collegit valde numerosa.

Neque defunt exempla, vbi vel auricula, vel cor ipsum eam ob causam denique dissiluit, cum arteria aorta concremento osseo virgeretur, aut valvulae induratae magligne paterent.

Corollarium eius theorematism est, quod cor eo minus sit, quo robustius et perfectius se deplet. In leone et auriculae, et cor ipsum paruum est Cl. viro teste C. P. WOLF *m††*). Contra in debilibus, in hydropicis cor amplum est *m†††*). Denique vti frequenter aliquantum cruoris in cordibus hominum aegrorum reperitur, quem debilitas funesta non finit expellere, ita et exempla sunt cordis integre inaniti *m††††*).

pag. 398. l. 9. *lege* perfecta cordis systole

ibid. l. 12. *lege* et perfecta diastole

p. 399. l. 13. *adde* aut ab electrica scintilla,

p. 400. l. 18. *post* recipit *adde* Aliquem etiam a cordis ventriculis retrogradum *o*)*

H 3

dixi-

*m****) Recherche p. 129.

m†) LIEYTAUD II. p. 49. Medical Transactions III. p. 16. V. p. 146. VIEVSSENS mal. int. II. p. 178. E. N. C. Dec. III. ann. 3. obs. 24. FANTON. obs. etc.

m††) Nou. Comm. Acad. Petrop. XVII.

m†††) HARDER apiar. 77. obs. ROBERT traité de médecine II. p. 385. E. N. C. Dec. III. cur. 5. 6. obs. 8. et cur. 3. obs. 3.

m††††) GREDING in acturf. LVDWIGII Vol. III. P. IV.

o)* n. 13.

diximus: nonnihil denique addit Cl. FONTANA o**) ab arteriis coronariis, quae nunquam non plenae cum sint, et incisae nunquam non sanguinem fundant, nullo etiam non tempore sanguinem suum per venas in aurículas dabunt. Denique addimus sanguinem ostiolorum, siue minimarum venularum in auriculae caueam patentium o***).

p. 402. l. 1. *post* pulmo *adde* Exemplorum iterum plus satis est. A solo impedimento in valvulis arteriae pulmonalis apud VIEVSSENIVM g*), MORGAGNVN g**).

Ab aneurysmate arteriae pulmonalis in *Philippo NERIO g***)*. Ab impedimento in aortae exitu, et valvulis aorticis offeïs aut crassioribus.

In orthopnoea et pulmone et sanguine impedito dextrae caueae cordis amplissimae sunt.

p. 406. l. 16. *adde* Deinde per interualla fibrarum tendinearum valvulofarum aliquid sanguinis in contractione cordis retrorsum in aurículas rediisse testimonium adest r*).

p. 407. l. 5. *lege* orthopnoicis

p. 408. l. 11. *post* arteria alia *adde* quae omnia absunt a frigidis.

p. 409. l. 20. *adde* Asthma, hydrothorax, auris dextra vasta, sinistra perparua d*).

ibid. l. 25. *post* subita *adde* A valvulis aorticis offeïs aut calculosis cor vastius fieri frequens est annotatio g*).

p. 411. l. 17. *lege* contractae, et offeae

p. 412. l. 12. *lege* per vas vero sinistro sinui commissum

pag.

o**) FONTANA *ricerche*, p. 106. MIEG *rhaf.* 1776.

o***) Sed. II.

g*) *Hist. de l'acad.* 1701.

g**) MANETT. *in vita* COCCHI Cl. GVARNIERO *dedicat.* ORTESCHI *Giorn. di medic.* T. II. PISONI.

g***) HAEN *rar. med.* VI. LANAIS. MECKEL *in Mem. de l'Acad. de Berlin.*

pag. 405. not. i) *adde* Olim GALENVS valvulas intercedere, ne sanguis ex ventriculo in venam cauam (auriculam) rediret.

pag. 406. not. q) *adde* SABBATIER *anat.* II. p. 146. 147.

r*) CHIRAC *aduers.*

pag. 408. not. k) *lege* *Opera min.* T. I. p. 168.

pag. 409. not. d) *adde* *Malad. intern.* II. p. 179.

d*) E. N. C. Dec. III. a. 5. 6. *obs.* 8.

g*) LIEVTAUD *sepulchret.* II. p. 40. VIEVSSENS *mal. int.* II. p. 181. 182. *Med. Trans.* III. p. 16.

pag. 410. *ad verbum* vidi in *textu* lin. 13. *adde* not. m*) *Oper. min.* I. p. 144. *seqq.*

ibid. *ad verbum* redditur in *textu* lin. 28. *adde* not. m**) *Oper. min.* T. I. p. 144. *seqq.*

pag. 411. not. r) *adde* LIEVTAUD II. p. 40.

pag. 412. l. 13. *adde* Modice calidum ex venis sanguinem in cor venire, ex arteriis calidissimum *Idem d**)

p. 413. l. 8. *lege* aortam

ibid. l. 17. *adde* Conus vero sanguinis, quem annulus valvulosis in basi ambit, etiam in auriculam repellitur.

p. 414. l. 21. *post* rediisse vidi *adde* per arterias vero coronarias Ill. FONTANA. ibid. l. penult. *lege* a sanguine sinus earum subeunte distendi,

p. 415. l. 7. *adde* Similia exempla sunt, ubi vel totum cor, vel solus sinister ventriculus mole increvit, cum valvulae aortae induratae, pene coactae, vel aorta angustior, vel cartilagineis et ossibus squamis varia esset. Est, ubi non solae sinistrae caueae; sed et pariter dextrae, ob eiusmodi vitia, dilatatae fuerunt. Numerosa adeo exempla collegi, ut enarrari nequeant.

ibid. l. 9. *adde* Aliquantum tamen sanguinis de aorta subsidente in cor redit. Aquam aortae injectam refluxisse vidit Ill. FONTANA l*). Sed eo experimento nollem uti, cum valvulae in vivo animali, sanguine cor replente, utique peruerso sanguinis reditui melius resistent. Verum utique, ut de venis dictum, ita in arteriis is sanguis, qui inter conuexitatem valvularum et parietem aortae est, is intra cor reicitur, dum arteria subsidet et contrahitur l**). Annotatidem viri sagacissimus valvulis in retinendo sanguine laborantibus subvenire arteriarum coronariorum ostiola, parata partem sanguinis contra cor nitentis recipere, valvularum pressionem minuere, intercedere, ne valvulae rumpantur l***), aut ipse demum ventriculus laceretur l****)

p. 418. l. 2. *post* confirmauerint *adde* Inter eos et Cl. SPALANZANVM, egregium in natura obseruanda virum, cito, et viros minime mihi fauentes Cl. VERSCHVVR et van GEVNS.

ibid. l. 13. *post* LANCISIUS *adde* PETRIOLIVM forte secutus est, quo in administrationibus anatomicis ministro vir splendidus utebatur; idem ad sua etc.

p. 419. l. 4. *adde* Aliquid simile habet Ill. FONTANA in auiibus, nempe finem contractionis cum initio relaxationis fere coincidere q*).

ibid. l. 20. *adde* Cl. MEZGERVS adeo certam legem esse reperit, ut etiam tunc auriculas et ventriculos alternis vicibus moueri viderit, cum utrisque eodem tempore stimulum admouisset u*).

pag.

d*) *Form. fet. c. 3.*

l*) *Ricerche p. 110.*

l**) FONTANA *ricercch. p. 100.*

l***) *Ibid. p. 113.*

l****) *Ibid. p. 111.*

q*) *Irritab. leg. diff. V.*

u*) MEZGER *Actu. f. p. 134.*

pag. 419. l. 25. *post sequatur adde* Haec princeps auricularum micatio frequens omnino est visu, VESLINGIO olim dicta, et in puella nuper Cl. DINKLER, inque pullo Ill. CALDANO.

p. 420. l. 6. *post agunt adde* Alias ventriculus dexter frequentius sinistro contrahitur. In ultimis etiam incubationis diebus non raro vidi, succeffionem motus in cordis regionibus turbari.

ibid. l. 8. *adde* Primis diebus, nempe secundo, tertio et quarto, quibus cor animalculi manifestissime coram micat oculis subiectum, ordo perpetuus est, quem dixi, neque haec sani animalis constantia debet per confufionem refutari, quae debili aut moribundo animali superuenit.

ibid. l. 11. *lege* frustra in cordis systole laboraret ista,

p. 421. l. 23. *lege* nondum diuisam *et adde* Adeo connexae sunt duorum ventriculorum, duarumque aurium carnes, ut quiscens altera cauea, ab altera per stimulum in modum reuocata, pariter ad contractionem intermissam redeat.

p. 423. l. 14. *adde* Nuper Cl. MONFILS receptam sententiam impugnare Suscepit; negauit enim vtrumque ventriculum vna contrahi, neque cessit experimentis in animali captis, quae non vult demonstrare quicquam. Nihil tamen attulit, cur paradoxam opinionem receptae praeferamus *b**).

ibid. l. penult. *adde* Vidit in pullo Ill. CALDANVS pulsus ante mortem ad 25. 21. 12. et 8. in minuto primo rediisse; clar. vero WHYT in ranis ad 28. 18. 16. ad 45. 40. 36. 30. ad 15. 6. et 2. et ad 11. 10. In cane CALDANVS ad 25. 21. 12. 8. in minuto primo *f**) vidit reductos.

Demum ventriculus cordis in rana post longam quietem quasi expurgiscit, itarumque sopitur, et denuo post quindecim minutorum moram pulsus molitur.

p. 424. l. 2. *adde* quiescunt.

ibid. l. 10. percipiantur *lege* solae appareant *et adde* Et dextra auricula, et dexter thalamus in cane motum suum diutissime conseruauerunt, in Ill. viri experimento, quem nuper amisimus *p**). Cordis vero languentis motus frequentiores sunt, quam arteriarum micationes, ut omnino ad aliquot cordis pulsus semel arteria respondeat *p***).

p. 425. l. 3. *post saltit adde* Cor semel, auricula decies nouies micauit *d**).

pag.

*b**) *Journal de medecine* etc. ann. 1776. Sept.

pag. 423 not. g) nondum editis anno 1756 *lege* in *Oper. min.* T. II. p. 164. editis.

*p**) *Rat. medendi* IX. p. 218. 219.

*p***) PORTAL apud COLOMB. p. 31.

*d**) MASSIMI *esp. anat.* II. exp. 2.

pag. 426. l. 10. *adde* Finem motus cordis, qui nonnunquam cum contracto statu coniungitur z*) alias dicemus. Ipsa plenitudo contractioni resistit z**).

ibid. l. 25. *post* efficitur *adde* atque paulo post eadem aorta in pullo constringitur atque expallescit; quousque vero haec pulsatio cet.

p. 427. l. 13. *adde* Ita vidi frequentissime, vidit vir acutissimus *Felix FONTANA*, vidit *Cl. SPALANZANVS*, vidit *Cl. REICHELIVS*.

ibid. l. 18. *post* viri *adde* inter eos *Cl. SPALANZANVS*.

p. 428. l. 1. *post* circuitum *adde* ciendum

ibid. l. 4. *adde* In medias vsque venas pulsus non pertinet *SPALANZANO* teste.

ibid. l. antepen. *post* dicitur *adde* quod quidem experimentum a me repetitum ad superstitem post mortem motum musculorum redit, quem sopitum scintilla electrica potenter suscitatur. Huc referas demum notissima etc.

p. 429. l. 3. *dele* aut nerui cordis

ibid. l. 12. *post* tangi potuit *adde* Frequentia sunt exempla mortis subitae, cum valvulae aortae osseae factae denique conuiuerent, neque sanguini ex corde in aortam aditum concedent.

Deliquium animi, quod cordis est quies, subito et pulsui finem facit, et haemorrhagias omnes, adeoque motum arteriosi sanguinis suppressit

ibid. l. 15. *post* occidit *adde* et polypus subito in ventriculum dextrum delapsus a*), qui suspensus fuerat a**)

ibid. l. antepen. *post* liceat *adde* multosque demum post dies in musculis, inque intestinis, motus aliquis irrationem sequi incipiat.

ibid. l. ult. corpori *lege* torpori.

p. 430. l. 4. *adde* Sic vir mathematicus innutritus *Matth. GABLER b*)*

ibid. l. 15. *adde* Die demum 14. irritabilis apparuit in intestinis c*), die vigesimo in musculis, in corde ante secundum c**).

Ita in deliquio animi, quando et sensuum officium interceptum flet, et cordis pulsus, prius semper cor ad officium redit, tunc demum cerebrum.

ibid. l. 20. *adde* In pullo cor primis animalculi diebus multo pulmone maius est, artuue quolibet.

p. 431. l. 8. *Verba*: Iterum cor ferocibus animalibus - - - Sed et macilentis maius est in noua editione desunt.

pag.

z*) In pullis *CALDAN. riflefioni*, p. 253.

z**) *Kongl. Svenska Vet. Acad. Handling. 1764. Tom. 4.*

a*) *VERSCHVVR Exp. I. SPALANZAN. mot. sangu.*

a**) *POSTEL factum p. 49.*

b*) *de tubul. capill. Ingolstadt 1774. 4.*

c*) *Form. du poulet, II. p. 391.*

c**) *Ib. p. 416.*

- pag. 431. l. 19. *post* habent *adde* Cor canis piscis, Germanice *Seekatze* dicti, exiguo nummo Danico (*Schilling*) non maius est *t**).
- ibid. l. 21. *dele* Et in vniuersum habitus - - - maximam rationem habet.
- ibid. l. penult. *post* pendere *adde* quam etiam sententiam Ill. SPALANZANVS mecum tuetur, cuius consensum plurimi facio.
- p. 432. l. 13. *adde* Aliud Cl. CVRTIVS egregie descripsit, aliud Cl. HENKEL. Fetus capite destitutus et corde *b**); fetus absque pulmone, corde *b**); sic absque corde apud Cl. AZZOGVIDIVM *b****), Cl. COOPER nuper fetum descripsit, cui neque caput, neque cor, sed vmbilicalis vena motus principium fuit *b*†). Cl. SABBATIER de corde refert, de quo ad BOERHAAVIVM a. 1720 Edimburgo rescriptum fuerit. In eo nihil de corde supererat, praeter auriculam dextram, vt pulmonis arteriae ex aorta prodirent *b*††).
- ibid. l. 14. *post* narrationes *adde* Inflammati cordis *c**), et vlcerosi, et laceri *c**).
- ibid. l. ult. *adde* Cordis loco nihil nisi putrida caro *m**). In tabidis cor erosum passim lego *m**). Vlcera in corde, et post syncopen mors *m****).

Vulnera etiam cordis non rara sunt, quae aut fero valde et quarto, nono, decimo octauo demum die mortem intulerunt, aut omnino sanationem admiserunt. Nam de globo plumbeo in corde cerui reperto BARTHOLINI est testimonium, et de sagitta *Caspari a REYES*, de bacillo *Henrici ab HEERS*. Ceruus etiam, qui vulnere cordis superfuert, recenset *c. a REYES*.

- p. 433. l. 12. *adde* Dudum STAHLIVS negat, corde quiescente mortem extemplo adesse *z**), nec animal corde euulso mori vult, dum venas ligaveris *z**).
- p. 434. l. 18. *lege* pendere

pag.

*1**) Abhandlung. der Drontheim. Gesellschaft, T. II.

*b**) BIRCH I. p. 393.

*b***) Guilielm. COOPER Philosophical Transactions T. LXV. P. II.

*b****) Obseruat. p. 55.

b†) Phil. Trans. T. LXV.

b††) SABBATIER, II. p. 62.

*c**) BÜTTNER Zweyköpff. Kind, TRECVRT Memoires inde pus in pericardio.

*e***) HAEN rat. med. IX. c. 1. in hydrope pectoris.

*m**) Euth. E. N. C. Dec. III. ann. 2. obs. 3.

*m***) FANTON. obs. 14.

*m****) FERNEL. patholog. V. p. 288.

pag. 433. ad verba languis euulso corde in textu lin. 3. *adde* not. *n**) Nempe viuunt animal tardigradum in *Hist. nat. Brasili*. L. I.

*z**) Theor. mort.

*z***) GLOS ad I. FRAGOSI chirurgiam.

pag. 434. l. 20. *post* pertineat *adde* Cordis vires non maiores esse, quam $\frac{2\frac{1}{2}}{100}$ intra minutum secundum eleuatis, cum voluntariae vires sint = 70 l. intra idem tempus n*).

pag. 435. l. 19. *adde* Multum existimarunt contra cordis praerogatiuam experimentum valere, per quod constat, in singula parte corporis humani, inque ea sola, posse inflammationem cieri, adeoque in eam solam partem sanguinis fluentum inuitari. Nunc id fieri non posse si ponas, solum cor sanguinis motus fontem esse et causam: cor enim aequa vi in omnes corporis animalis partes sanguinem didere.

ibid. l. vlt. *adde* Ita porro vulgare est visu, quod ex DINKLERI relatione repeto, quiescentibus arteriis cor porro moueri d*).

p. 437. l. 6. *lege* Dudum l. *Sophronius* KOZAK a vaporibus sanguinis motum deriuauit r*); inde Cl. HUTCHINSON etc.

ibid. l. 9. *post* ostendimus *adde* a calore haemorrhagias fuscitari, quae conquieuerant u).

ibid. l. antepen. *adde* Veterum ergo huc reuocarunt numerosis animalibus familiarem, meli, erinaceo, muribus montanis, aliisque calidissimis etiam bestiolis, cum certum sit, hirundines, et magna saepe copia, in arundinetis atque fluuiorum ripis a frigore hierno constrictas et exanimis proximas repertas, aut aëreo calore, aut igne suppeditato reuixisse. Pulsus, et calor, et cordis motus in his animalibus frigore tolluntur, a calore restituuntur.

p. 438. l. 24. *dele* sensim cor consumtum, et

ibid. l. penult. *post* sustinuerunt *adde* Accurate AZZOGVIDIVS, quoties cor nullum adfuisse p*), analogum aliquid superfuisse.

p. 440. l. 3. *adde* Calculi etiam illi, quibus Cl. viri ostendere voluerunt, non posse magnam cordis potestatem esse, omnino nihil euincunt, cum eorum auctores vim irritabilitatis ignorauerint, quae nullis legibus ponderum regatur, et cuius ope pondera multo corde maiora ab eo moto subleuentur, quae a resistentiis augeatur, quae potentiam vulgarem minuunt.

ibid. l. 8. *adde* Embolo percutienti confert Cl. FOURNIER b*).

n*) SAVVAGES *inflammi*. p. 229.

pag. 435. not. c) *adde* RÖDERER *Comment. Gott. T. IV. p. 212.*

d*) Apud SANDYFORTH *bibliorh. II.*

r*) *De haemorrhagia.*

pag. 437. not. b) *adde* Conf. Lib. VI.

pag. 438. not. o) *adde* RÖDERER *Comm. Gott. IV. p. 212.*

p*) pag. 16.

b*) *Journal de medecine, 1774.*

pag. 440. l. 10. Ad potentias transeo, quae cordi - - - Ceterum natura irritabili debilissima gaudent *lege* Ostendi alibi, arterias contrahi et mortua vi c), et procul dubio insita, quatenus in iis fibrae musculares sunt d), quam vim praeter nos Cl. aliqui incisores in viuo animali viderunt. Id volo, vim mortuam non plurimum quidem posse, instam, vt aliqua sit, debilem videri, quam neque sponte agentem vnquam viderim e), neque irritatio mechanica fuscitet.

p. 441. l. 22. *post esse adde* Dudum CALDESIVS testudinis arteriam magnam immotam cordi vnice obsequi, et in galeo pisce Cl. GOYEAV aortam immotam vidit.

ibid. l. antepen. *post vixerunt adde* Exempla eiusmodi senum, in quibus a morte arteriae osseae apparuerunt, passim collegi, et VESALIVS olim habet m*), et nuper C. LVCAS m**), interque senii symptomata FISCHERVS osseas arterias retulit.

p. 442 l. 6. Denique arteriarum vis contractilis - - - arteriis impensae sunt *lege* Denique si viceris arterias, et potentissime, contrahi, nihil certe de cordis praerogatiua demes. Quo potentius arteriae contrahuntur, eo maior erit resistentia, quam cordi vniuersum arteriosum systema, vna vnda sanguinis impulsâ, dilatatur opponit. Da in cordis diastole sanguinem nouum motum a contractis arteriis accipere, vt non subsultorie, sed perpetuo vrique fluente progrediatur, primo tempusculo a corde impulsus, altero ab arteriis. Possêt inde progressius motus sanguinis adiuuari, cordi nihil accedet, quod contractum nunc, ex hac hypothesi, et sanguinis vniuersum pondus superandum habet, et noua velocitate propellendum, et praeterea insignem partem, dimidiam fere virium, super illam priorem resistentiam, in vincenda arteriarum resistentia impendere debet; nempe cordis nunc dupla potentia requiritur eius, qua egeret, si arteriae omnino vi contractili destituerentur.

ibid. l. 15. *adde* Neque de vasis lacteis, de vasis ex cellulosa tela, ex magnis caueis, ex cute-humorem sorbentibus, de vasis fetus in vtero radicatis attractionem excludero.

p. 444. l. 20. *post arteriarum adde* equidem probabilem,

pag.

c) *adde* et AUGAR. p. 21. Lib. VI.

m*) *Exam. obs.* FALL. p. 36.

m**) *Essay on waters*, T. I

pag. 442. *ad verbum* attractionem in *textu* lin. 10. *adde* not. p*) Lib. VI. Ei multum tribuit RÖDERER *Veer*. p. 212.

pag. 443. *ad verbum* reducuntur in *textu* *adde* not. y*) HALES *veget. stat.* IV. p. 122.

pag. 445. l. 8. *adde* Totam illam oscillantem vasorum vim *Matth. GABLER* mecum reiecit *g*)*, et vir Cl. I. C. D. SCHREBER *g**)*.

p. 446. l. 13. *adde* Denique quàm parum calor in promouendis humöribus animalis possit, manifestum est ex pullo, qui ovo continetur. Cor si destruxeris, si id alioquin quieuerit, in eodem calore incubantis gallinae nulla pars animalis crescit, nullus sanguinis per sua vasa motus est. Et contra pergit cordis motus, et sanguinis, vt certo vidi, multis horis in ipsa circumfusa frigida.

§. XL*. *Ad Cl. WILSONI obiectiones.*

Non ideo nulla foret cordis vis, etsi aliqua ei auxilia accederent. De motu musculari ostendetur, accelerari inde vtique sanguinem. De cibo sumto, vtunque id fiat, ipsum phaenomenon certum est, et ab eo incalescimus. In venas portarum non nulla erit cordis potestas, cum eius muscoli vis in venas vsque penetret. Verum in vniuersum vir Cl. motum intestinum cum progressu confundit, iste enim ab intestino motu minime iuuatur, neque aqua stagnans ab euaporatione in fluentum concitatur, neque fermentatio magis versus partes externas, quam contra cor sanguinem vrgeret. Musculos, interque eos sphincteres, ab irritatione laxari omni experimento aduersatur. Vacuum spatium a corde parari, quo se sanguis venosus recipiat, haetenus potest admitti, vt credas, si cor plenum maneret, nullum ei sanguini de vena exitum fore, qui nunc sit aliquis, quod auricula se in ventriculum depleat.

p. 446. l. 15. *lege* cum aliquo. non satis certo ab arteriis etc.

ibid. l. antepenult. *adde* Nobiscum sentit, quem honoris causa citamus, *Lazarus SPALANZANVS.*

p. 447. l. 12. *post* Cl. viri *adde* *Ioh. DVVERNEY, Th. SCHWENKE, IADELOT, ARTHAUD* et Cl. *LAMVRE; et post* *BOVRGELAT* Cl. etiam *SPALANZANVS* in viuo animali nunquam potuit in sanguinis motu successionem aliquam percipere.

ibid. l. ult. *adde* In animalibus frigidis longum illud cor erucae, monoculi, nereidis vtique peristaltice conspicuo mouetur; vt sanguis in primum nodulum veniat, tunc iste contrahatur, ita secundus nodulus repleatur, paulo post secundus arctetur, sic ex ordine ad vltimum. Conspicuum autem

I 3

succes-

g) De tub. capill.*

*g**) Atque I. LEONH. MAK de comparatiua sanguinis in diuersis vasis celeritate, Erlang. 1775. 4.*

successionem reddit longitudo arteriae, et motus minus velox humoris vitalis.

pag. 448. l. 17. *lege* alii a fortioribus demum stimulis etc.

ibid. l. 20. *post* sumit *adde* ZENDRINVS vim cordis facit ad resistentias, vt 48 $\frac{2}{3}$ ad 1.

p. 449. l. 22. *post* impulsu *adde* in minuto primo

p. 450. l. vlt. *adde* s' GRAVEZ ANDIO, MVSSCHENBROEKIO,

p. 451. l. 20. *adde* Aortae diametrum a KEILIO nimis paruum sumi Cl, de SAVAGES obiicit.

ibid. l. penult. *dele* et decolorum immensam vim

ibid. l. vlt. *lege* humor ex corde expulsus celerrime replet

p. 453. l. 14. *lege* praepositas

ibid. l. 15. *lege* Huic theoremati analogiam superfruit,

p. 455. l. 20. *lege* vero

p. 456. l. 18. *lege* $\frac{7}{8}$

ibid. l. 28. *lege* 5000.

p. 457. l. penult. *lege* et lineae longitudo

p. 458. l. 19. *lege* non raro efficiunt

p. 459. l. 7. *dele* proximo libro

ibid. l. 12. *lege* cogitur,

ibid. l. 19. *lege* harum

pag. 456. *ad verbum* sequitur in *textu* lin. 9. *adde* not. d*) Mem. de l'Acad. de Berlin, 1775.
II. A. N. C. *obf* I.

pag. 459. *ad verbum* superantur in *textu* lin. 6. *adde* not. x*) L. VI.

ibid. l. 7. *ad verbum* autem *adde* not. x**) L. VI. L. IV. s. 42.

SECTIO V.

CAVSSAE MOTVS CORDIS.

Pag. 461. l. 9. *lege an a Nervis?*

ibid. l. 18. *post fecerunt adde aut in recurrente*

p. 462. l. 11. *post tamen adde totis decem horis*

ibid. l. 23. *adde Sic Cl. LAGHI.*

p. 463. l. 10. *post necessarium adde* Sed etiam Cl. MASSIMI experimenta sua producit, quae his nostris placitis, si nostra dicere licet, vndique contraria obnuntantur. Nervis nempe irritatis, motum cordis accelerari *a*)*, et cor a quiete ad motum redire *a**)*. Medulla spinali irritata, cor quietum ad motum rediisse, aliisue nervis irritatis *a***)*. Sed etiam tunc cor ad motum reuersum irritato nervo, cum ipsum irritatum nihil mutaretur *a†)*; Resectis vero nervis recurrentibus, irritabilitatem cordi subtractam fuisse *a††)*; cordis etiam euulsi motum, recurrentibus nervis irritatis, accelerari *a†††)*.

pag. 463. l. ead. Sed neque vidi *lege* Verum abunde est testium

ibid. l. 11. *lege* cordis motum nunquam acceleratum fuisse, neque pulsum etc.

ibid. l. 12. *post erupisse adde* Ita ego vidi,

ibid. l. antepen. *adde* A convulsione, per irritatam medullam spinalem excitata, aliquantum quidem sanguinis motum turbari, sed cito in ordinem redire vidit accuratior L. SPALANZANVS; neque irritamenta nervorum, neque resectam medullam spinalem, neque cerebrum resectum motum cordis interrumpisse. Vidit MONROVS iunior destructa medulla spinali tamen pulsum superesse. Nuper Cl. JOHNSON medullam spinalem irritatam negavit quicquam in cordis motu mutare. In repetitis experimentis CALDANVS nervorum irritationem convulsionem fecisse, cor immotum ad motum non revocasse reperit. Perinde in Ill. FONTANAE experimentis, octauus nervus et medulla spinalis, et cerebrum, stimulo suo motum cordis neque accelerant, neque suscitant quando conquieuit *n*)*, vt omnino is motus voluntati non obediatur *n**)*. Qui minime mecum amat sentire Cl. TRABUCCHI, ligatis nervis, pulsum cordis potius augeri vidit. In experimento Ill. SWIETENII, a Cl. MARHERR relato, et intercostalibus, et vagis nervis ligatis animal

pag. 462. not. b) *lege Aduersf. anat. p. 65.*

a)* MASSIMI II. *esper. 15.* reclusum octauo et bronchialibus.

*a**) Id esper. 4.* *a***) Esper. 14.*

a†) Esp. 2. *a††) Olf. 3.* *a†††) Esp. 13.*

n) Recherche p. 90.* *n**) p. 98.*

animal vitale superfluit. Resectis nervis octavi paris, pulsus cordis per 50 horas superfluit, testibus Cl. viris BONIOLO et PAGANO. Demum ipse Cl. MASSIMI vidit, nervis irritatis et medulla spinali lacerata, cor nihil mutatum, et ab effectu *u**), vt puto, opii *u***), et absque opio in plussculis experientis.

pag. 463. l. penult. *lege* Poterat motus cordis ligatis nervis superstes ab iis maioribus etc.

P. 464. l. 18. Primus experimentum GALENVS protulit - - - Neque irritata medulla mihi cordis modum reuocasse visa est *) *lege* Verum his experimentis enarrandis suis erit locus c), et ostendendum, etiam hic vulnere medullae spinalis vim in occidendo animali nimium fuisse ornatam d).

P. 465. l. 20. *adde* Video etiam pro nervosa in cor potestate opii vim produci, quod in aqua solutum infusum cor celerrime ad quietem reducat *r***)), in ipsum cor impulsam promte motus finem faciat. Verum experimenta haec partim nondum satis firma sunt, partim aliam admittunt interpretationem. Cl. TRABVCCHI, scriptor rebus meis potius infensus, opiatam aquam cordis motum accelerare reperit, cicutae extractum et hyoscyami nihil omnino mutare. Ill. FONTANA opium extus musculis admotum nunquam vim insitam minuisse vidit. Cl. CARMINATI nuper in plurimis experimentis ab opio cordis actionem vidit *r*†) aut augeri, aut certe conservari. Denique ex insigni effectu, quem opium in ventriculum, atque in intestinum edit, locus est suspicioni, non nerveam solum vim ab opio imminui, sed pariter etiam vim insitam.

Quare puto, libratris contrariis experimentis, me iis, quae ipse vidi, quae summi in experiundo viri constanter viderunt, omnino assensum debere. Cor nempe ab aliis musculis hactenus dissidere, quod nervorum vis in eius motu producendo non ea sit, quae experimento possit demonstrari. Possè ad integritatem cordis, ad vim fibrarum sustentandam, nervorum aliquam esse potentiam. Alia tamen potentior cordi est causa motrix, quae absque nervis

*u**) *Esp.* II. p. 15. Lente se contraxit *esp.* 22. 39. 19. 20.

*u***) *Esp.* 23.

*) Notae ad hunc textum spectantes a noua editione quoque absunt.

c) L. X. S. I. n. 36.

d) *Ibid.* n. 37.

pag. 465. ad verbum *irritabilis in textu lin. 9. adde* not. *r***) MASSIMI II. *esp.* 20. 22.

24. 26.

*r***) ALBIN. *nat. hom.* p. 33. 34.

r†) *De anim. in nephis. inreritru*, pag. 134. 135. 137. 139. 143. 144. 145. 147. 149. 150. 151.

vis omnino excitari nequit. Is, qui integro libro me refutare suscepit, fateretur tamen vim voluntatis et neruorum in cordis motum comparatam cum vi stimuli pene nullam esse r††).

Supereſt aliud dignum ingenio F. FONTANAE experimentum. Vidimus in experimento r†††) ventriculū dextrum ante ſiniſtrum quieſcere, ſi prior vacuetur; ſiniſtrum ante dextrum, ſi, vt vulgo fit, prior inanis fuerit. Sed iidem nerui vtrumque ventriculū adeunt. Quieſcit ergo alter ſubtracto ſtimulo, eſſi nerui vis praefſto eſt, dum alter pergit operari; ergo iidem et motum producunt, et nullum producunt r††††).

Eodem pertinet, quod irritatis neruis recurrentibus etiam ſolus ventriculus dexter ad motum incitatus fuerit, abſque ſiniſtro r†*†.

EX FONTANAE porro experimentis ſequitur irritationem admotam neceſſariam eſſe, neque ea ſi abſit, etiam integros neruos operari. In altero experimento MASSIMI apparet, poſſe partem muſculi ad motum inidoneam eſſe, dum altera integram facultatem motricem conſeruat.

§. II*. Cl. D. A. WILSONI obiectiones.

Qui nuperrime ad vim cordis refutandam acceſſit, Andreas WILSON, non ille quidem per experimenta ad hanc litem praeparatus, ingenio tamen non vulgari vir, alias vires eſſe obiecit, quae omnino ad cor referri nequeant, qualis vis eſt reſorbens vaſorum lacteorum aut lymphaticorum, vis etiam ſanguinis venoſi, qui portarum venam perfluit. Cordis motui nihil a corde accedere, neque enim plus in ſanguine arteriarum motus eſſe, quam in venarum cauarum ſanguine, cuius momentum potius maius ſit. Neque ſanguinem fetus venoſum a corde fetus ſuum motum accipere. Non debere vires cordis ita aeſtimari, vt ſint vicina eius muſculi exſerta poteſtas, quam nullus muſculus diu ferre poſſit. Principia motus in ſanguine multa eſſe, quae cordi non tribuas, vt euaporabilis elementi ad auolandum agilitatem, vt fermentationem certe inchoatam, vt conatum ad extricandum aërem fixum. Accedere praecipuam ſyſtematis neruoſi potentiam, quae tam violenta cum ſit in animi paſſionibus, non poſſit in homine tranquilli animi nulla eſſe. In iſpis fluidis habitare vitam et aëtiuitatem propriam. Irritabilitatem Idem aggreſſitur, quod per irritationem muſculi aliqui, et potiſſimum ſphincteres relaxentur. Videri cordis effectum potius eſſe depletionem primo venarum,

vt

r††) *Obſeru.* p. 140.

r†††) *In propr. diſſ. Comm. Götting.* T. I.

r††††) *Ricerche* p. 94.

r†*†) MASSIMI *exper.* 15.

vt sanguini redeunti vacuum spatium praeparetur, quo tendere possit: tunc sanguinis in partes solidas impulsus, quo stimulentur, et earum robur au-geatur: sed etiam vitam partium fluidarum a cordis impulsu suscitari, et chy-lum cum sanguine, cum eodem aëre in pulmone resorptum misceri: efflu-via dissipari, ne in massas coalescant.

Hinc RÖDERERVS in fi tu quidem non a corde, sed a calore, aut a vi at-tractili motum sanguini deriuabat (†††).

pag. 466. l. 4. *post* continuat *adde* in anguilla ad quadragesimam.

ibid. l. 12. *dele* qui in corde a frigore coactus motum cordis sufflaminat,

ibid. l. 14. *post* habeat *adde* Fere semper superare CIGNA d*), vt in experimen-tis van den BOS d**)

ibid. l. 23. *adde* Adde nunc multo violentiorem, quam vllius alterius muscoli, cordis motum esse.

In his experimentis consentiunt nobiscum alienissimi alias a rebus nostris scriptores, vt Cl. van den BOS. Seseu hora aliorum musculorum irritabilitati naturam cordis irritabilem superfuisset vidit vir Cl.

Pauca equidem experimenta passim lego, in quibus cor irritabilitatem ami-sisse dicitur, dum ea potestas in musculis f*), in oesophago, in ventriculo, in lingua supererat. Nihil equidem vnquam simile vidi. Si alii Cl. viri vide-runt, putem pectus ante abdomen apertum fuisse, et aëri expositum adipem eius coiuisset: frigidum autem cor, et coacto adipe tectum vtique ad motum ineptum fit, dum interim muscoli, oesophagus et ventriculus, suis tecti vela-mentis, calorem et necessariam mollietiem conseruarunt. Manifesto Ill. FON-TANA, quo cor pinguius est, eo citius desinere moueri, et eo diutius eius motum

†††) *Comment. Gotting. T. IV.*

pag. 465. not. z) *adde* *Sermon second* p. 32. exp. 420. 421. 438. 372. 364. CARMINA-TI lib. cit.

pag. 466. not. y*) *lege* *Oper. min.* p. 263.

ibid. not. z) *adde* CARMINATI p. 9. a fumo sulphuris incensi, tum p. 18. 19.

ibid. not. a) *adde* CARMINATI p. 121. 124. 116. 118. 183. 62. 63. 64. 171. 169. 151.

150. 149. 144. 139. 137.

ibid. *ad verbum* secum in *textu* lin. 14. *adde* not. c*) p. 4.

d*) *Vir. corp. solid. exper.* 12.

d**) *Philos. Trans. Vol. II. P. II. p. 404.* Non ideo neges, vehementiorem fumi carbo-num efficaciam demum animal occidere, et cordis irritabilitatem destruere, FONTANA *recherche*, p. 131.

ibid. *ad verbum* pulsare in *textu* lin. 21. *adde* not. e*) A tabaci fumo CARMINATI p. 169.

175. A camphora p. 181. 183. ab aëre non renouato p. 90. 105. 106. a puluere pyrio p. 30.

a vapore ferri in spiritu nitri soluti p. 43. 44. ab arsenici vapore p. 62. a putrido aëre p. 116.

118. a carbonum fumo PRESSAVIN *rechercher*.

f*) MASSIMI II. *esp.* XI. ad quadraginta minuta. FONTANA p. 153. de bobus. CAR-MINATI a tabaci fumo, p. 115. et sulphuris p. 8. 9. 18. 19. 14. 15.

motum supe esse, quo magis in calido feruatur *f***). Demum etiam ideo fatetur cordis irritabilitatem superare, quod interna facies cordis ab aëre turtior sit *f****). Nos in solo experimento nos continemus.

pag. 466. l. ult. *post* aliam *adde* praeter neruos,

p. 467. l. 1. *post* subiunxisse *adde* Ab omni utique stimulo cor irritatum motum concipit. Pericardio solo tacto motum cordis acceleratum fuisse, nondum tangente musculum instrumento *f†*). Id mihi nimium videtur, qui cor, ut irritetur, contingi debere expertus sim. Minimum stimulum sufficere Cl. viris credo et mihi, ut ab aquae guttula, a contactu capilli ad motum reuocetur *f††*).

ibid. l. 5. *adde* In animalibus simplicissimis, quorum summa est irritabilitas, sola aqua sufficit, ut in rotifero animale, quod in aridum pollinem dilapsum, humectatum ad motum, vitamque redit.

ibid. l. 6. *lege* et solo digito calido, aut adpersa calida etc.

ibid. l. 7. *post* anguilla *adde* in mure demum marmota, aliisque animalibus per totam hiemem sopitis et frigentibus, quibus solus veris gratus tepor pulsus, vitamque reddit. Subito etiam latentem vitam affusa feruida suscitatur;

ibid. l. 16. *post* contemplari *adde* Cuniculi languidi a calore feruida refocillantur, etiam paralysis in musculis superest *n***)

ibid. l. ead. A feruida occiditur *lege* A feruida idem vehementer palpitatur, ut breui quiescat *o*), et *adde* Audiendi vero hic potissimum sunt Cl. MARTIN et POITEVIN, qui annotarunt, quot pulsibus quisque gradus caloris aucti, aut diminuti pulsus priorem augeat vel minuat.

Ita in experimentis D. POITEVIN *o***), cum medius calor esset 29 gr. REAUMURI, duos pulsus legas accessisse ad gradum 30, sex ad 31½, triginta duos ad gr. 35, quadraginta et unum cum palpitationibus ad gr. 36. Vicissim detracti duo gradus demserunt pulsus duos; ad gradus 26 fuerunt diminuti senis, gradibus ad gr. 25. reductis defecerunt pulsus 12, ad gr. 22 pulsus 17, ad gr. 16 caloris pulsus 25.

Cl. MARTIN *o***) demtis gradibus caloris 15 reduxit pulsus a 78 ad 64½.

K 2

Auxil

*f***) *Ricerche* p. 151. 152. etiam euulsus p. 154.

*f****) p. 155.

f†) MASSIMI II. *esp.* 30.

f††) FONTANA *ricerc.* p. 93. pag. 467. not. 1) *adde* CALDAN.

*n***) CAVERHILL *heat.*

*o***) In *propr. lit.*

*o***) *Sve. Vet. Acad. Handlingar* 1773.

pag. 467. l. 18. *ad verbum* instrumento in *textu* *adde* not. *o****) Punctura acus auriculam ad vehementem contractionem incitat CALDAN. *risteioni* p. 245.

Auxit $33\frac{1}{2}$ gradu ad 94 cum sudore, tum gradu 35 ad 107 cum vehemente sudore, et gradu 36 ad 117 pulsus cum palpitatione.

Rationem aucti a calore pulsus, aut a pulsu caloris non constantem esse alias ostendemus, cuius anomaliae multae causae sunt.

pag. 468. l. 4. *adde* et moribunda animalia suscitatur *b*)*, certa tamen cum medietate, violentior enim necat.

ibid. l. 7. *post* fueris *adde* Si una in sede cor irritaueris, ea sedes post contractionem irritabilitatem amittit; cum alia particula cordis irritata motum recuperet *c*)*

ibid. l. ead. *lege* Multum

p. 469. l. 8. *post* tentavi *adde* Demum accurate apparet, aërem in cor quiescens impulsus, ex ordine venam cavam, auriculam, ventriculum ad motum revocasse. Sic pueros a partu pene inanimes obstetrices suscitare norunt fricto funiculo umbilicali, ut aliqua sanguinis penus in cor quiescens repellatur. Evidentius etiam in corde longo, quod diximus, erucæ, naidis, aliorumque vermium, humor vitalis primum nodulum replet et distendit; tunc idem euacuatur, et alterum nodulum sanguine inundat. Is nodulus, uti sanguinem accepit, ita irritatus se contrahit et euacuat. Ita sanguis ad tertium et sequentes nodulos venit, et dilatationi contractio in quoque nodulo succedit.

Video contra ista Cl. MEZGERVM obicere, has successiones in cordis motu antagonismo regi, non stimulo. Auriculam enim extractam de corpore, ventriculum extractum, vicibus alternis laxari et contrahi, licet eodem tempore stimulus adueniat *q*)*. Mihi, si haec recte intelligo, haec contraria videntur experimentis dudum productis *q**)*, quibus uterque simul ventriculus, utraque simul auris, uno tempore, sed quaeque auris ante ventriculum contrahitur.

ibid. l. 12. *adde* Quare cum natura irritabilis cordi propria sit, poterat expectari, quod etiam experimento confirmatur, cor primum inter omnia corporis humani organa irritabilem vim conspicuam demonstrare. Ita in pullo incubato

b)* BOSCH febr. epid. p. 366 in ranis

pag. 468. not. *c)* *adde* MASSIMI esp. 28. P. II.

c)* MASSIMI ib.

pag. 468. not. *i)* lin. 3. *adde* CALDAN. rifl. p. 253.

pag. 469. not. *k)* *adde* Huc referas experimentum, quo aër in asperam arteriam impulsus cordis silentem motum revocavit, PORTAL apud COLOMB p. 15.

q)* Aduers. p. 134.

*q**)* vid. Sect. IV. §§. XX. XXI.

pag. 469. not. *s)* *adde* Ob aëris contactum hanc esse diuturnam irritabilitatem, FONTANA ricerche, p. 155.

bato cor altero die viuidissime micat, et stimuli impatientissimum est, quo tempore serum pro cerebro est, pro musculis iners gelatina, pro intestinis surdae ad stimulos chordulae. Ita vt primum irritabilitatem expedit, ita vltimum eam deponit.

pag. 470. l. 2. *adde* Diutius *a*^{*)} pulsat cor cati, quam canis, sed minus diu, quam ranae.

§. IV*. *Causae, quae irritabilitatem destruant: in corde potissimum.*

In vniuersum, quae necant, ea putes cordis irritabilitatem aut ipsam destruere, aut certe ita statum huius musculi vitari, vt motum producere ineptus sit.

Ita agit sulphuris vapor et nux vomica *a*²⁾; ita morsus viperæ *a*³⁾; ita electrica vis auctior, qualis est in fulgure, et quae facit, vt cor irritatum non nisi tremores aliquos cieat.

Ita frigus irritabilitatem aufert, etiam adipis circumpositi *a*⁴⁾. Sic nimius feruor, qui post breues tremores quietem facit irreuocabilem *a*⁵⁾. Sic, vt multa omittam, nimia plenitudo; ad certum enim gradum distenta auris, aut ventriculus cordis, vim irritabilem amittit *a*⁶⁾. Porro rigor tonicus, vt in vniuersum musculos aliquamdiu ad nouas contractiones ineptos reddit, ita et cor ipsum *a*⁷⁾. Hunc in pullis vltimum cordis statum esse CALDANVS annotauit *a*⁸⁾.

Sed potissimum ipsa contractio vim irritabilem exhaurit. Accuratius propria experimenta contemplati Cl. viri inuenerunt, in frigidis etiam potissimum animalibus, vnā irritationem *a*⁹⁾ vnā contractionem ciere: mallem ego *a*¹⁰⁾, ad mea pericula, aliquot contractiones. Verum Ill. viri docent, succedere, etiam praesente stimulo, quietem *a*¹¹⁾, et videri irritabilem vim reparari debere, et sensum quasi accumulari *a*¹²⁾, quoad in nouam contractionem

K 3

perfici

a^{*)} CARMINATI p. 9. etc. et pene a foetore putrido.

*a*²⁾ *Svralh. Magaz.* I.

*a*³⁾ *Ricerche* sub finem.

*a*⁴⁾ p. 397.

*a*⁵⁾ p. 400.

*a*⁶⁾ *Sw. Vet. Acad.* 1764. *Trimestr.* 4.

*a*⁷⁾ In experimentis CALDAN. *rissl.* p. 241. 243. 249. FONTANA *leg. irritab.* diss. II.

*a*⁸⁾ *Rissl.* p. 283.

*a*⁹⁾ CALDAN. *rissl.* p. 249. FONTANA *leg.* p. 13.

*a*¹⁰⁾ Id. p. 14. CALDAN. ib. subinde

*a*¹¹⁾ FONTANA ib.

*a*¹²⁾ Idem *ricerch.* p. 129.

perfici possit; ita ex quiete cor sponte videri ad motum redire, quod in ranis frequenter vidi ^{a¹³}). Iunioribus animalibus eam vim celerius reparari ^{a¹⁴}).

pag. 470. l. 5. *post* habere *adde* Reicit vndique FONTANA, vt in neruis non solum non sit efficax causa motus cordis, quod ostensum est ^{a¹⁵}), sed ne excitans quietem. Neque enim in ratione vis irritabilis esse effectum, leuemque stimulum, qualis est in aëre afflato, cor melius ad motum excitare, quam graues acrimonias; pressamque vehementissime cutim vix sensum sui facere, cum titillatio animam pene ad desperationem agat ^{a¹⁶}).

ibid. l. 13. *adde* efficacem eius motus causam. Neque hic vllum in obiectione robur est; in experimentis paucis quidem, tamen certis, cor irritabilem naturam deposuisse, quo tempore musculi, et oesophagus et ventriculus vim insitam, et impatientiam stimuli demonstrabant. Id enim phaenomenon, quod ego quidem nunquam vidi, frigido aëri tribuo, qui cor in aperto pectore nudatum percussit, dum clauso in abdomine, velatisque per cutem et adipem musculis, calor aliquis superfuit; frigidum enim cor, et adipe coactum tectum, vtique ad motum ineptum est.

p. 471. l. 3. *adde* sturione ^{p^{*}})

ibid. l. 8. *post* viri *adde* quadragenis CALDANVS ^{2^{*}})

ibid. l. 9. *post* duodecim *adde* et lucii ^{a^{*}}), tum

ibid. l. 13. *post* redeat *adde* Salamandrae aquaticae ad octo et nouem horas cor micat.

ibid. l. 14. *post* residet *adde* Solebat in nostris experimentis mane factis multam in noctem cordis micatio superesse, vt altero demum mane siccum iam cor irritabilem naturam deposuisset

p. 472. l. 6. *lege* alii viderunt,

ibid. l. 11. *post* reperiuntur *adde* et in isto quidem tenero animalculo multarum horarum constantiam saepe sum admiratus, quam olim Angli philosophi quatuor horis superuisse viderunt.

pag.

^{a¹¹}) FONTANA p. 10.

^{a¹⁴}) FONTAN.

^{a¹⁵}) Lib. IV. S. V. §. 2.

^{a¹⁶}) *Ricerche* p. 88. 89. de spiritu animali, sed de neruis perinde verum est.

^{p^{*}}) ANDRIOLI *febr.* p. 72.

^{2^{*}}) *Risless.* p. 70.

^{a^{*}}) VALERIOI. loc. com. I. c. 15.

pag. 471. not. m) *adde* CHIRAC *aduers.* p. 122.

- pag. 472. l. 15. *adde* Non recusabo euulsum citius quiescere, quam suo loco relictum c*).
- ibid. l. 19. *adde* cane rana g*)
- ibid. l. 20. *lege* similia vidi et *adde* Inter coquorum manus de sartagine, in qua frigebatur, cor salmonis exiliit HOVTTVYN.
- p. 473. l. 16. *post* extinguitur *adde* Olim ARISTOTELES pulsus cordis fieri scripsit a calore, qui sanguinem eleuet, et alternis vicibus subsideat. Deinde CARTESIVS ab eo igne aiebat, sanguinis etc.
- ibid. l. 17. *lege* ad modum
- ibid. l. 21. *lege* limitibus
- ibid. l. 24. *adde* Fermentatione aliqua cordis motum continuari equidem NEWTONI fuit coniectura, quam omittimus.
- p. 474. l. 18. *lege* et cerebelli vulnera laesiones cerebri periculo superare;
- ibid. l. 20. eius particulae *lege* eius cerebelli
- ibid. lin. ead. *post* repetemus *adde* Verum rationes Cl. viri, et affectus eius late patentis opinionionis, et nostras, quae fecerunt, ne in ea parte manerem, dicam libro X. *Haec in noua editione ultima octauae paragraphi verba sunt; cuncta enim reliqua, prout et nonam paragraphum Auctor deleuit.*
- p. 481. l. 14. *post* confirmare *adde* Cochleam citant, et mytulum et gannum, in quibus cor modo moueatur, modo quiescat, vt ex arbitrio animalis eius motus pendere videatur. Rotiferum animal t*) cor habere voluntati obnoxium Cl. viri coniectura fuit, quod tamdiu ageret, quamdiu rota animalculi in gyrum circumiret. Sed id cor alii accurati viri pro ventriculo habent.
- p. 482. l. 8. *adde* Experimenta quoque in cochlea et in buccino facta non demonstrant, a voluntate motum cordis pendere, qui ex defectu stimuli cessare, et cum stimulo reparato renasci queat.
- ibid. l. 20. *lege* quinquaginta
- p. 483. l. penult. *lege* penitus suppressus nihilo magis voluntati obedit, quando a quiete ad motum reiiit
- ibid. l. ult. *post* recensero *adde* Celeberrimum exemplum est Card. ESPINOZA, qui, cum cadauer balsamo condire aggredierentur, aperto pectore, corde palpi-

c*) MASSIMI II. p. 7.

g*) TRABVCCHI respir. p. 106.

pag. 472. not. r, *adde* MASSIMI II. esp. II.

t*) FONTANA ricerche, p. 98.

palpitante, vitae indicia dedit, quem medici, ut culpam tegerent, taciti extinxerunt *g**). Satis simile exemplum habet Cl. PEV. Cum enim speculum nullum halitum demonstraret, neque in corde motus esset, femina se concussit, cum pectus incidere vellent *g***).

pag. 484. l. 8. *post* fuit *adde* Femina absque pulsu pro mortua habita, multis ab euentu annis vitam *m**) redditam conseruauit.

ibid. l. 12. *post* vitalis *adde* Post septem dierum asphyxiam reconciliata femina *p**).

ibid. l. 13. *lege* cum a frictione excitata *q*) fuisset *et adde* Sepulchro erepta, quae absque pulsu fuerat *q**).

ibid. l. 16. sex integris septimanis *lege* quadraginta sex diebus integris

ibid. l. 18. *post* celebrauit *adde* rediuuiam,

ibid. l. 19. *post* vixisset *adde* In mure montano simplicius est experimentum, quod tamen perinde nostra sententia confirmatur; in eo enim animali, tum in erinaceo, in hirundine, post multorum mensium quietem frigidum animal et exanimi proximum facillime, calore reddito, cum vita reconciliatur.

ibid. l. antepen. *post* producit *adde* Maxime vero memorabile huius rotiferarum bestiolarum exemplum est, et verae resuscitationi proximum. Neque enim flaccescit vnice, et immotum per duos et per quatuor annos manet, sed omnino exarescit.

ibid. l. ult. *adde* Sic anguillae in tectorum impluuiis habitantes, et animalculum ta digradum, quod de rotiferi affinitate est *x**).

p. 485. l. 23. *post* separatum *adde* Testudinis (caput) auulso corde viuere iam ARISTOTELES vidit, et anguillae. Limaces, in experimento saepissime reposito, detruncato capite, et viuunt, et nouum cum oculis caput reparant. Inter calida animalia auiculae, capite celeriter defecto, currunt et pene semihoriorum superuiuant.

p. 486. l. 6. *adde* A cordis quiete experimenta expellere *n**).

pag.

*g**) CABRERA apud BRVHIER, II. p. 459.

*g***) PEV p. 334.

*m**) HAMILTON de febre miliar.

*p**) VALISNERI raccolt. p. 64.

*q**) TIMONI bains des orient. p. 32.

pag. 484 not. *x*) *adde* Rhachitici SPALANZANI Opuscoli II, ROFREDI ap. ROZIER, Journ. de physiqu. 1775, Ianvier, Avril.

*x**) SPALANZANI, ib.

pag. 485. not. *c*) *lege* XII.

*n**) STAHL theor. morr.

pag. 486. not. *s*) *lege* de locust. I. p. 26. lin. 2. *lege* capite et dele solum.

pag. 487. l. 10. *post animam dele* haecenus

p. 488. l. 25. *adde* Nuper vir Ill. hanc cordis praerogatiuam reiecit, cum et diaphragma et intestina perpetuo motu exerceantur (*). Verum directe ostendemus, irritabilitatem cordis in frigidis animalibus maiorem, constantiorem esse, praecociorem denique, ut immensum musculorum priuilegium superet. Sed et in calido pullo manifesto cor ante musculos mouetur, et omnibus denique carnibus constantius. Intestina enim non perpetuo, sed per interualla peristaltico motu agitantur, quem adeo longa quietis interualla interrumpunt, ut Cl. viri negauerint, omnino eo motu gaudere. Diaphragmatis priuilegium ad cordis priuilegium proxime accedit, multo tamen lentius, et quadruplo longioribus interuallis agit, et certis in occasionibus quiescit, ut in grauiditate, et vniuersum in feminis, quae pectore magis respirant. Denique diaphragma soli classi animalium quadrupedi datum, non potest cum corde comparari, quod in animalibus vegetum adfit, quibus nullum, aut immotum membranaceum septum sit, quale in auibus est, et in piscibus.

p. 489. l. 14. *post obtusum esse adde* Insensile reppererunt in experimentis Anna Car. LORRY, et CARRERE, et HAENIVS, et stimulum certe sanguinis sensu non percipi, verissima est CALDANI annotatio.

Alia coniectura est, ideo cor magis irritabile esse, quod etc.

ibid. l. 22. *adde* Hanc pro hypothese affero, pro ea nolens contendere. Reiecit Cl. FONTANA (*), reiecit Cl. YPEY (**). Loco huius coniecturae aliam affert Cl. FONTANA. Sufficere putat, quod cor diu moueatur, ut porro facilius motum continuat (***). Mihi contra, musculus, qui diu operatur, enormiter fatigari, et ad motum prae dolore ineptum fieri videtur, quod in rectis et vastis expertus sum, cum biduo continuo in cuniculos subterraneos descendissem.

pag.

pag. 485. not. r) *adde* CALDAN epist. ad nos.

l*) FONTANA *ricerche*, p. 151. 161.

pag. 489. not. s) *liu. 2. adde* FONTANA *ricerche*, p. 158. 159. — *lin. 4. adde* Ego, qui palpitationibus cordis et pulsui intermittenti obnoxius fui, saepe in cordis sede dolorem percepi, quem tamen, accuratius sensationem meam scrutatus, in musculis pectoris residere reperi.

r*) *Ricerche*, p. 151.

r**) *Obscrv. physiol.*

r***) *ib.* p. 161.

pag. 489. l. penult. *lege* eo enim in moribundo animali ex vena in aurem expresso.

p. 490. l. 16. *post ferre adde* Perit equus, cuius sanguis non supra duo pedes salit, teste *Stephano HALES k*)*. Pulli, carotidibus apertis, continuo extinguuntur.

ibid. l. 20. *lege* Hinc in viuo animali, in nostris et *Cl. BOHNII* experimentis, cor atrociter laborat, cet.

p. 491. l. 6. *post aërem adde* In experimento *Cl. PORTALII*, cum aër per venam iugularem impelleretur, vt exinde in venam cauam superiorem, auriculam dextram, et ventriculum dextrum aduenit, ita eae caueae se contraxerunt.

ibid. l. 18. *lege* in meis *y)*, inque clarissimorum *CALDANI*, *FONTANAE*, *SICHI y*)* et aduersariorum pariter *z)* experimentis: et ventriculos, dum auriculae integrae pergunt moueri, atque omni sanguine, aërisque parte maiori subtrac̃ta, continuo de motu desistere, siue in ventriculo cordis experimentum feceris, in aure perinde successurum.

p. 492. l. 8. *adde* Est etiam, vbi ventriculus sinister non inanitus dextrum in focietatem sui motus traxit, et vicissim.

Denique aër in corde relictus mobilissimum musculum in motum ciere potuit. Eum si extraxeris, in *III. CALDANI* experimentis, cor porro perpetuum quietem agit.

p. 493. l. 5. *lege* vt cor integre euacuaretur *n)*.

ibid. l. 21. *lege* vel fortiozem et celeriozem efficiat, vel certe ad animi motus contemperet.

ibid. l. 22. *adde* Obiectum est, saepe in cadaueribus cor non inane, inque eo sanguinem reperiri, plerumque in thrombos coactum. Non perpetuum est. Ipse *III. HAENIVS* cor inane vidit; vidit, qui plurima cadauera incidit, *Cl.*

GRE-

pag. 490. *ad verba* certum est in *textu* lin. 10. *adde* not. e*) Contrarium, vt videtur, experimentum *MASSIMI esp. 10. 11*, qui sanguinem in cor venire, et de corde per vulnus exire vidit, nullo cum eius musculi motu. Verum stimulus excitat vires, non generat. Si cor ad motum ineptum fuit, si irritabilitatem amisit, qui temporis effectus est, omnino sanguis illapsus motum ciere non potuit, vt nec in cadauere humano potest.

k*) *Haemast.* p. 16

y*) *FONTANA ricerc.* p. 97. *JOHNSTON gangl.* p. 31.

GREDDING r*). Ceterum intelligitur, in moriente animali vires cordis exhaufas denique, ante quietem perpetuam, eo redire debilitatis, vt ftimulum quidem fentiat, tamen fe contrahere, aque ftimulo fe liberare minime valeat. Perinde obiectum eft, in corde calculos, et offea concrementa re-
perta effe, neque tamen minus cordis alternas contractiones locum ha-
buiſſe r**).

pag. 494. l. 5. *adde Felicis FONTANAE, Cl. IOHNSTON h*)*,
ibid. l. 6. *adde* Accuratus viri praestantissimi F. FONTANA et M. Ant. L. CAL-
DANVS viderunt, cor relaxatum, irritatum ſemel, et in frigidis etiam ali-
quoties contrahi, non tamen continuo, ſed poſt tempuſculum, in quo
ſtimulus in fibrā potuit vim ſuam exerere, celerius tamen in iuniori
animali.

ibid. l. 13. *dele* totus

p. 495. l. 9. *poſt* adeo *adde* cauae ſiniſtrae

p. 496. l. 12. *adde* Hanc ſucceſſionem quietis ſaepe obſeruauī, annotauit etiam
Ill. CALDANVS. Ventriculus ſiniſter primus quieſcit, tunc auricula eius
lateris, porro ventriculus dexter, dum auricula dextra pergit micare, ultimo
vena caua quieſcit.

p. 497. l. 25. *adde* De puero nuper nato diximus, quem ſanguine de funiculo
in cor impulſo ad vitam reuocamus. Haec repetentur Libro IX.

p. 498. l. 3. *poſt* motus *adde* ſerius

p. 502. l. 12. *adde* Deinde ex ſapiente NEWTONI lege, cum cauſam habea-
mus ſufficientem, qua e cor per ſtimuli ipſius alternam abſentiam et reſtitu-
tionem alterne quieſcat, et ad motum redeat, non attinet pro eodem phae-
nomeno exponendo alias cauſas conquirere.

ibid. l. 22. *poſt* neruo *adde* plerumque

p. 503. l. 10. *adde* Cauſam, cur ſupra valvulas ponantur, Ill. FONTANA ſu-
ſpicatur eam eſſe, vt ſanguis ex aorta retrogradus in eas effugium inue-
niat i*).

ibid. l. 18. *retro lege* pone

L 2

pag.

r*) In *Aduerſar.* LVDWIGII.

r**) *Ricerch.* p. 121.

h*) *Of ganglions* p. 18.

pag. 503. not. h) *lin.* 1. *adde* *Aduerſ.* p. 121.

i*) *Ricerche* p. 119.

pag. 503. l. 19. *lege* arterias

ibid. l. 20. *post* excauatis *adde* nerui

p. 504. l. 13. *adde* Sed etiam longe vehementiorem compressionem nerui musculum non reddere paralyticum FONTANA expertus est a*).

p. 506. l. vlt. *adde* Ceterum de motu siue simultaneo, siue peristaltico per arterias non potest res oculi, aut vllius sensus testimonio definiri; id enim in tanta celeritate tempusculum nec alternam cordis efficaciam demonstrat p), neque in duobus distantium partium pulsibus successionem percipit.

a *) *Ricerche* p. 85.

p) SPALANZANVS p. 23.

Corrigenda.

Pag. 2. lin. 1. *lege* conuincimur.

pag. 9. lin. 22. *lege* intestinorum.

pag. 22. not. *) *Verba*: GABLER videtur in textu legendum esse cet. *spectant* ad notam l* *).

pag. 48. lin. 14. *lege* PORTALIVS.

pag. 53. lin. 4. *lege* pericardium.

pag. 58. lin. 1. *lege* cui

pag. 60. lin. 20. *lege* coronariis

pag. 61. lin. 21. *lege* maligne

pag. 64. lin. 13. *lege* quiescens

AVCTARIVM
AD
ALBERTI HALLERI
ELEMENTA
PHYSIOLOGIAE
CORPORIS HVMANI

EXCERPTVM

EX NOVA EDITIONE

ET ADAPTATVM VETERI

FASCICVLVS SECVNDVS.

SANGVIS. EIVS MOTVS. HVMORVM SEPARATIO.

LIPSIAE ET FRANCOFVRTI,

MDCCCLXXX.

3973 (2)

1871-1875, 1878-1884

1885-1889, 1890-1894

ELEMENTORVM
PHYSIOLOGIAE CORPORIS HVMANI
TOMVS SECVNDVS *).

PRAEFATIO.

Pag. II. lin. 8. *dele* Repetitiones exosum mihi vitium - - - dum facilia ea sint.
p. III. l. 3. *post* inuentione *adde* me
ibid. l. 5. *dele* deque valvula coli.
ibid. l. 24. *lege* alienoue
ibid. l. 27. *dele* De valvula coli ignoscat - - - excusat deteriora.
p. IV. l. 19. *dele* Ceterum in his ipsis - - - ad verum accedere possim.

EXCERPTVM EX PRAEFATIONE AD NOVAM EDITIONEM.

In noua editione plufcula mutata fuerunt, maxime in fectione fecunda, in qua de fanguinis elementis agitur. Non potui de electrica materie, non potui de phlogifto filere, quam vtramque materiem inter fanguinis elementa praecipua, eaque numerant, quorum efficacia mortuas alias humorum particulas incitat, vitaeque caufa eft.

Breuitur equidem; neque enim aufus fum in re noua, mihi per propria experimenta non perfefta, in minuta quaeque me diffundere, neque fatis confirmata funt, quae de vtriusque elementi phaenomenis prodierunt, et fufperfunt, qui de ipfo etiam nouorum experimentorum euentu dubitent. De calore, et eo potiffimum, quem in aëre circumpofito corpus humanum cum vita fuperfite, ferre poteft, noua experimenta extant, quae noftris prioribus fubueniunt, et coëgerunt me, vt ordinem fermonis mutarem, ne omnino fimilium testimoniorum nimia turba fieret. De globulorum etiam colore, figura, fabrica,

A 2

extant

*) Primam huius tomi partem Auctor FELICI FONTANAE, fecundam LAZARO SPALANZANO et tertiam IOHANNI VIVENZO dicauit.

pag. III. *ad verbum* praeuideram *in textu* lin. 4. *adde* not. a) Ea epiftola inter amicorum epiftolas nunc prodit.

pag. IV. *ad numerum* 1742 *in textu* lin. 11. *adde* not. b) COMES THOMSVS, cuius epiftola propediem inter alias amicorum epiftolas edetur.

extant egregia nupera Cl. virorum experimenta, tantum vt aliqua a meis vndique aliena sint, quae cum meis audiisse oportuit. Nihil autem inueni causae, cur a prioribus meis effatis recederem. De duplici coagulabili lymphæ Anglo- rum noua est hypothesi; neque enim mihi etiam in eorum descriptionibus causae videtur esse satis, cur duo elementa, vndique sibi similia, et nullo alio discrimine separata distinguerem, praeter facilitatem paulo maiorem ad coagulationem, quam serum ab igne patitur, et cuius coagulabilis indolis limites putredinis initia, et calor externus, et cibi ratio, et mille aliae causae mutant. Ceterum in his elementis multa non dubie parum plena, multa hiulca: incerta tamen, et de quibus iustis dubiis sit locus, non puto superesse, agniturus si videretur.

Analyses sanguinis nimis fere fusas deprecor: laborem exhauseram ponendorum calculorum, vt pondera elementorum sanguinis ad drachmas, librasque reducerem; eum forte laborem neque totum, in noua editione desiderari mihi non vile visum est, neque in aliquod compendium reduci posse speraui. Minus etiam ceterum haec mihi placent, quod nihil sit mei, nunquam enim ea mea fuit felicitas, vt inter tot alterna vitae officia in chemicis laboribus proficerem.

Bernae, d. III. Iul. c1616ccLXXVII.

LIBER QVINTVS.

SANGVIS.

SECTIO I.

AD SANGVINIS HISTORIAM IN VNIVERSVM CONSIDERATI.

- P^{ag.} 1. l. 18. aut *lege* tunc.
 p. 2. l. 19. *post* adeo *adde* vniuersi corporis
 p. 3. l. 16. *post* maximam *adde* vim
 p. 4. l. 12. *post* euasit *adde* Haemorrhagia 20 et ultra librarum, cum placenta
 supra os vteri adnata secessisset, HENKEL l^{*)}).
 ibid. l. 15. *post* nares *adde* et quadraginta intra quatrimum SARTORIVS p^{*)})
 ibid. l. 18. *adde* Intra quatrimum lesuita 40 libras amisit q^{*)}).
 p. 5. l. 9. *post* passa est *adde* Librae 412 sanguinis intra annum amissae, teste III.
 TISSOT u^{*)}).
 p. 6. l. 24. *adde* In diuturnis morbis sanguinis penus saepe ita exhausta, vt pene
 nullus supersit p^{*)}). GVILIELMI III cadauer totum exsangue fuit p^{**)}).
 p. 9. l. 13. *adde* Calidiorem nuper DAVID fecit o^{**)}). Magis animalisatum D.
 WILSON o^{***}), cum sanguis arteriosus minus de animali natura haberet,
 ibid. l. 18. *post* auctor est *adde* hinc citius cogi, firmiusque dare coagulum.
 p. 10. l. 6. *dele* et rubicundiorum *et adde* bere lymphae coagulabilis et colore
 differre Cl. BUTT x^{*)}). Frigidiorum esse STEPHENSON x^{**)}) x^{***}).

A 3

pag.

- l^{*)}) HENKEL. *neue Sammlung*.
 p^{*)}) *Admirand. Haemorrhag.*
 q^{*)}) *Journal des Savans*, 1663. T. XI.
 u^{*)}) *Opusc. var.* p. 299.
 pag. 6. not. l) *adde* In leone marino BYRON voy. p. 296.
 p^{*)}) *Journ. de medec.* 1770. Ianvier. In viuo vix duas vncias fuisse HEVERMANN *Vn-*
versuch. p. 362. SCHELHAMMER *de puls.* p. 67. Incidisse se corpora, quibus non supra
 duas sanguinis vncias superauerunt I. de GORTER *perspir. insensib.* p. 385.
 p^{*)}) *Bibl. anat.* Tom. II. p. 394. ex RONGEATI testimonio.
 o^{*)}) *de respir.* o^{***}) *Antum. disorders*, p. 44.
 pag. 10. not. x) *dele* Nunc demum inuenio - P. II. p. 813.
 x^{*)}) *Spontan. sangu. separ.* p. 26. 46. 47.
 x^{**)}) *Ess. of a Societ. at Edinburg.* II. p. 813.
 x^{***}) Intellectu profecto difficile non est, hunc locum typographi potissimum incuria ad-
 modum corruptum redditum esse, eumque proinde medela quadam egere. Equidem hac
 ipfi

pag. 10. l. ult. *lege* in altera

p. 12. l. 4. *adde* Nobiscum Cl. SPALANZANVS, qui pariter, vt ego, plurimum laborem in contemplando per vitreas lentes sanguine posuit.

ibid. l. 21. *lege* vti 169. ad 132.

p. 13. l. 3. *adde* De carotidis sanguine dicemus g*). Negat de eo ipso sanguine ALBINVS g**).

ibid. l. 5. *post* repugnat *adde* Nuper Ill. SPIELMANNVS sanguinem venae cauae cum sanguine venae portarum comparauit. In venae portarum sanguine debilis liquoris, paulum alcalini, partes 13 fuerunt, 16 alcalini, 6 fortiter vrinosi et saturate alcalini; olei pars $\frac{2}{3}$, salis volatilis $\frac{1}{7}$, qui demum cum tartari sale tritus vrinosum odorem spargebat; carbonis denique partes $\frac{2}{3}$, in eo ferrum et sal lixiuiosus.

Contra in sanguine venae cauae liquoris alcalini partes erant $\frac{16}{29}$, paulo plures omnibus computatis, quam in sanguine venae portarum; olei empyreumatici $\frac{1}{17}$, siue pene $\frac{1}{10}$, duplo adeo plus; salis contra volatilis minima portio, non supra $\frac{1}{30}$, quam putes compensari per vberiore spiritum alcalinum; carbonis tantum $\frac{1}{4}$, et dimidio minus. In eo perinde ferrum et sal lixiuiosus fuit.

Quaerit vir Cl. an adeo plus sit salis, plus etiam acoris, in sanguine venae portarum, minus olei: de eo negat, vt potius plus habeat olei.

ibid. l. 6. *post* peculiari *adde* sanguinis in portarum venae

ibid. l. 11. *post* superante *adde* De Europaeo homine, alboque loquor; nam aethiopicus ab HELMONTIO h*) nigricans tribuitur. Nuper annotatum est, aethiopis sanguinem emissum primum fuscum fuisse, cum admixtis exiguis particulis nigris, deinde floridum et in centro placentae nigrum in ambitu fuscum. Non ergo niger est, nisi ob crassitiem laminae sanguineae h**).

In diuersis animalibus aliquam in colore sanguinis diuersitatem esse non repugnat, vt vitae genus aliud fuerit, et victus; non quod ipse testem me dare queam, nam et in frigidis animalibus rubrum sanguinem et concrecibilem vidi, vt in rana, inque bufone, et in calidis, et in pullo incubato. Legi tamen in piscibus, anguillarum ad modum teretibus, sanguinem in corde nigrum

ipfi ratione succurrendum putauerim, vt, quae ad MICHELOTTVM spectant, ita legantur, prout in veteri editione prostant; quae vero in noua editione Auctor addidit, ea huc videntur redire, vt et coagulabilis lymphae copia, et colore arteriosum sanguinem a venoso differre BUTTIJ sententia fuerit, frigidiorum autem eum STEPHENSON existimauerit. Nor. *edit.* hui. *aut.*

g*) L. X. g**) Nat. hom. p. 117.

h*) Schol. *pass.* decept. MECKEL mêm. de l'acad. de Berlin 1757.

h**) ROYME de St. LAURENT ap. ROZIER 1775.

grum esse et coactum, in cartilagineis rubrum et splendens (h***); equo saepe piceum et nigrum de vena incisa manare (h****); et in vniuersum vti- que in maioribus quadrupedibus viscidior est et densior, vt in equo vidi. In cane mihi magis glutinosus, et ad coeundum pronior visus est, in ouibus potissimum iunioribus fluidior. Globulorum etiam magnitudo dicitur dif- ferre, quod discrimen in tabula HEWSONVS ex variis animalibus expressit.

pag. 13. l. 17. *post* denique *adde* primis vitae horis

ibid. l. 18. *post* pellucet *adde* Immatureo fetui humano pro sanguine flauum hu- morem in aorta vidit Ill. vir C. I. BÜTTNER.

ibid. l. antepen. *post* languent *adde* Non ignoro haec nuper infirmari, aque vi- ris, quos magni facio. Verum ea certe scribo, quae vidi. In minimis ra- mulis figurae venosae, tertio die, sanguinis purpura laeta est in magnis truncis; idem die secundo rubiginosus fuit, vt appareat, hunc rubiginosum colorem non esse a pellucente flauedine vitelli; ea enim multo magis minorum vasorum ruborem a paucis globulis natum obruisset, quam maiorum. Nobiscum Cl. WOLF.

p. 14. l. 3. *post* flauent *adde* Sola ex aëris insigni mutatione Europaei in ferui- dis Americae insulis continuo flauescunt, et a multa venaefectione pallor diu saepe ipsis adhaeret, aque febribus intermittentibus.

ibid. l. 4. *post* rubore *adde* per caeruleum et viridem colorem

ibid. l. 7. *adde* Non ignoro Cl. virum, et quem plurimi facio, SPALANZA- NVM u*) flauum colorem globulorum sanguineorum non admisisse, et flaued- inem a me visam luci refractae tribuisse, qua ego vsus sum. Verum lentis vitreae vsus in colore certe mutando nihil potuit. Nam in robusto animali solitarii globuli, vnica serie mesenterii vasa percurrentes, ruberrimi mihi visi sunt, aut certe albi fulgidi cum laeto rubore, nunquam flauui; languidi con- tra animalis glomerati globuli constanter flauui apparuerunt, cum eadem luce vterer.

p. 15. l. 4. *adde* quae interim, vt legi, ita refero. Nam Cl. HUNTERVS chy- lum auium et piscium pellucidum facit, crocodilo excepto, cui albus sit.

ibid. l. 11. *post* fuit *adde* Lacteus albus humor de venaeductus CABBALLI o).

ibid. l. 14. *adde* et a lacte retento r*),

pag.

h***) VICQ D' AZYR Mem. prés. VII. p. 239.

h****) Naturforsch. Gesellsch. p. 592.

n*) Fenomeni della circolazione.

e) Phacnom. med. p. 64.

r*) Journal de medec. 1770. supplem. n. 4. Si enim id lac per vrinam et per diarrhoeam depositum fuit, vtiq; in sanguinem redierat.

pag. 15. not. n) l. 4. *adde* BARTHOLIN. p. 192. 193.

pag. 16 l. 1. *post* negent *adde* et ad serum quoddam referant. Quod ego v'di, id evidentissime chylus erat, vt etiam ex ductu thoracico in venam subclauiam infundi viderim;

ibid. l. 2. *post* elabitor *adde* In Suecia equidem $x^*)$ experimenta feri chylosi aliquam feri a lacte diuersitatem demonstrant, a sero nempe lac verum exigua differre copia olei et solidarum partium, quibus in magna ratione superetur vt 1 ad 6. Constare aqua, gelatina et corpore gelatinoso mucoso, quarum illa = $\frac{2}{235}$, hoc sit = $\frac{13}{245}$ Haec videntur omnia de chylo vera esse posse cum lymphâ animali coniuncto, quae in lacte decedit. Sed etiam Cl. HEWSON $x^{**})$ album illud, quod sanguini innatat, serum esse, globulos habere flauos $x^{**})$, neque aut chylum $x^+)$ esse, aut vnice a pastu reperiri $x^{++})$, cum sero vero candorem ab adipe $x^{+++})$ communicari. Album etiam liquorem hydropicum I. L. TARGIONVS vidit, cui nulli essent globuli $x^{++++})$.

ibid. l. 4. *adde* Tempus ergo aliquod est, in quo chylus conspicuus cum sanguine circumiuit. Humorem autem alium mucosum nonnunquam in sanguine contineri non repugno. Chylum esse nobiscum Cl. BRAMBILLA $x^{++++})$

ibid. l. 7. *post* loco *adde* Niger et foetidus atque serofus de naribus puellae decennis manabat $z^*)$.

ibid. l. 12. *post* tingat *adde* tum in polypo, qui pulicem aquaticum deuorauit.

ibid. l. 14. *post* exhauritur *adde* qui carnes tingeat.

ibid. l. 16. *post* commune est *adde*, et ni fallor in omnibus animalium classibus constanter accidit, vt vitalis humor spissescat, et sanguis in sano homine continuo etc.

ibid. l. penult. *post* delet *adde* A minutis septem ad 11 cl. viri numerarunt, quibus sanguis egeat, vt in placentam consistat.

pag.

pag. 16. not. $x^*)$ spectat ad verbum elabitor in textu lin. 2.

$x^*)$ Sie. Werenf. acad. Handl. 1770. n. 3.

$x^{**})$ Inquiries p. 115.

$x^{***)}$ p. 116.

$x^+)$ p. 118.

$x^{++})$ p. 122. etiam diu a cibo.

$x^{+++})$ p. 127.

$x^{++++})$ Raccolta T. I.

$x^{++++})$ De inflamm. p. 43.

$z^*)$ WERLHOF variol. morbill. p. 540. edit. quam Ill. WICHMANNVS curauit.

pag. 16. not. $h)$ adde Contra sanguis in gradu 125 coactus fuit in vena ligata canis, HEWSON phil. Trans. Vol. LX.

ibid. ad verbum toti in textu lin. 16. adde not. $f^*)$ Diuersa est descriptio a phaenomenis grami sanguinis.

pag. 17. l. 1. *post* magis *adde* tum in calore, qui 90 gradus superat, ad 108 gr. vsque.

ibid. l. 7. *post* turgerent *adde* Non repugno frige factum solidius coire, calentem tenerius *n*^{*)}); tamen non eo processurus, vt calori amisso coagulationem tribuam *n*^{**)}), cum frigidorum animalium sanguis cogatur, de quo nullus calor decedit. Possis negare, a sola quiete in coagulum abire *n*^{***)}), cum concussus coëat, suilli exemplo, et in viuo homine coiuisse visus sit. Plurimum tamen quies ad coagulationem confert, siquidem sanissimi hominis sanguis, qui rapide per venas circumibat, et idem per aërem fluidus saliebat, continuo cogitur, quamprimum in patinam receptus quiescit.

p. 18. l. 2. *post* subest *adde* Demum in febribus malignis sub initia facpius fere cogitur, etsi in posterioribus mali stadiis idem resoluitur; quam quidem legem plurimorum et peritissimorum medicorum consensu confirmari video, et ab ipso etiam potissimum HUNTERO.

ibid. l. 3. *post* coactum vidi *adde* Vasa sanguinea coacto cruore plena in febre maligna fuerunt, quam ROEDERERVS morbum mucosum vocabat *e*^{*)}).

ibid. l. ead. Sed etiam in variolis - - - quod alias fusius repetem *lege* Nempe in vniuersum magis magisque nunc confirmamur, febres acutas fere cum crasso sanguine incipere, ipsas etiam variolas *f*) et Siamesem febrem flavam *g*), aliasque maligniores febres *h*), vt sanguis in peste *i*) prae tenacitate venae inhaereat, et vix possit educi, tum in contagiosa lue armentorum *k*). Cum ipso vero morbi progressu, vt putredo in humoribus inualefcit, ita sanguis dissoluitur, vt demum mihi ipsi in febre tertiana pulli sanguine vix crassior de vena secta fluxerit, et in febribus malignis totus dissolutus per omnes corporis poros excludat *k*^{*)}). Quare ipsa in curatione ad hanc theoriam accida sub initia damus, et cremorem tartari, aliaque tum putredini, tum spissitudini sanguinis contraria: in progressu fere cardiaca, cum sanguinem dissolutum debilitas perpetua sequatur. Neque enim de dissoluto sanguine desperari debet, quem certum sit, cum vita superstitie natiam densitatem recuperare. Et meo sanguini, cum aquosus et pallidus fluxisset, solida densitas rediit; et olim annotauit *Fac. ANGELINVS l*^{*)}).

pag.

n^{*)}) BVT T *separ. sangu. spont.* p. 10. 11.

n^{**)}) p. 12.

n^{***)}) HEWSON *Philosophical Transactions*, vol. LX.

e^{*)}) *Morb. mucos.* p. 162.

Notae *f*^{*)}) *i*) et *k*^{*)}) p. 18. mutandae non sunt, notae *g*^{*)}) autem litt. *h*) et huic litt. *g*) praeferenda est.

k^{*)}) Lib. I.

l^{*)}) *Elect. ven.* p. 23.

- pag. 19. l. 16. *post* concretus erat *adde* Olim POSTELLVS in peripneumonia glutin. medullae simile extraxit, quod ad corallii modum consistentem arbusculam imitaretur *z**) . In magnis arteriis a frigore sanguinem coagulari SPIGELIVS *z**) .
- ibid. l. antepenult. *post* esset *adde* III. HAENIVS vniuersas arterias, venasque chorda polyposa fartas vidit, et olim BECKERVS *a**) , et MORGAGNVS et WALTHERVS *a**) .
- p. 20. l. 1. *lege* Sed etiam in aneurysmatibus sanguis in grumos coactus reperitur, inque carnis speciem *b**) inter duo vincula immotus coit *c*) etc.
- ibid. l. 17. *post* superesset *adde* Et in alio exemplo, cum abscessus cor pene totum exedisset, polypus ea ipsa sede annatus foramen obturauit, vitamque aegri produxit.
- p. 21. l. 9. *post* reperio *adde* Haec est glandulosa in corde caro VESALIO dicta
- p. 23. l. 1. *post* relegatos *adde* etfi raro appareant.
- p. 25. l. 7. *post* follicitare *adde* Cordis etiam extensa est amplitudo.

S E C T I O II.

E L E M E N T A S A N G V I N I S .

- Pag. 29. l. 16. *adde* Sanguinem ex vena secta de viuo homine emissum frigidum fuisse, insignes testes adsunt, et ipse MORGAGNVS. Eum sanguinem credas alicubi quieuisse, vt nonnunquam in grauibus deliquiis quiescit, et cum motu calorem amittit. Sed totum hominem dysenteria peritum friguisse vidi. In mure tamen citello, hyeme effuso, sanguis insigniter caluit.
- ibid. l. 20. *post* testudinis *adde* caluit.
- ibid. l. ead. Sed etiam vipera - - dum vixit frigebat *lege* Aliquando maiorem calorem I. HUNTER in rana generari testis est, vt hydrargyrus tubi in os animalis dati per quatuor gradus ascendat, in ventriculum detrusi etiam vigenis *s*).

pag.

*z**) In descr. peripneumoniae.*z**) p. 174.*a**) De morte submersorum sine pota aqua.*a**) De atra bile.*b**) BOERHAAVE prax. med. I. p. 394.pag. 28. not. *c*) *adde* Nullus calor piscium et ranarum BRAVN Comm. nou. Petropol. XIII.*s*) *lege* Philos. Transact. T. LXV. p. 2.

pag. 30. l. 1. *post* toleretur *adde* Numero apum tribuas, quod calorem generant, quem neque vespae generant, neque crabrones.

ibid. l. 3. *adde* An vero calor ab animalibus generatus fecerit, vt eorum aliqua, quibus sanguis sponte frigere videtur, a frigore non occidantur? Vidit idem 1. HUNTER cyprinos caloris tantum generalle, vt non possent rigescere, et tum demum murem occisum, cum humectatis pilis, calor ab eo generatus diminutus esset x*).

§. II. *An constanter maior atmosphaerae calore* *).

Quando de calore agitur regionis, non attinet eum narrare, qui perpetuus sit, idemque mediocris, et qui passim in calidis regionibus non maximus est, neque ad 86 gr. ascendit, vt Iamaicae, Curassauiae, Cuduluri, in Antillis insulis, Bataviae nouae, in Capite Bonae Spei, in ipsa aestuosa Arabia, in qua aestus per aestatem 85 et 90, et paucis locis 95 graduum Fahr. fuit. Eae regiones nobis feruidae videntur, non quod adeo enormes earum ardores sint, sed quod ii toto anno parum diminuantur, et noctu etiam parum decrescant, vti Cuduluri totum discrimen fere a 74 ad 77 gr. fuit. In tropica regione Berbice calor non infra 70 descendit, neque vltra 96 ascendit.

Qui vulgo recensetur calor, is in vmbra mensuratur, et multo, quam ad solem, minor est. Haec diuersitas insignis est momenti; nam in vmbra 75 gradus in sole 101 fuerunt, et ego Rupe, cum in vmbra calor infra 100 esset, alias 117, alias 140 gradibus hydrargyrum secundum album murum solem reflectentem ascendisse. Maiorem etiam vidit Ill. du HAMEL, vt in sole ad murum fuerit 167 graduum. Monspelii, cum in vmbra esset gr. 30, in sole fuit 60 gr. Reaumur, omnino vt in priori annotatione 9. In cubiculo 80½, in sole 106 gr. fuit apud GIRARDI h). Conduluri constanter per 15 dies gr. fuit 97. 98. et in sole 109 i). Sed etiam Monspelii, si fidum est experimentum Cl. le BON k), cum in vmbra calor esset graduum 31 Reaum. in sole fuit 80. In insulis Antillis in vmbra ad 94, in sole ad 112 m). Sed etiam in Carolina calor solis fuit 120 n),

B 2

et

x*) *Philos. Transact. T. LXV. p. 2.*

*) Cum secunda et tertia paragraphus, notaeque ad eas spectantes in noua editione admodum mutatae sint, ita, vt vix vlla periodus alicui veteris editionis periodo exacte respondeat, vtramque paragraphum simul cum notis verbotenus, vt vocant, describendam censui, veritus, ne, si fecus facerem, eademque, qua in aliis paragraphis vsus sum, ratione et hic vellem vti, taedium Lectoribus imponerem laborem. *Not. edit. hui. auct.*

h) *Vua Vers. p. 41.*

i) FREYLINGSHAUSEN in *Missionsberichten.*

k) *Mém. de l'Acad. de Montpellier. Mém. de l'Acad. des sciences 1706.*

m) MOVLTRIE Febr. *flan.* In Martinique 100 ad 114. THIEVLYT.

n) *Philos. Trans. n. 487. 496.*

et 126 o) gr. calculisque recte positis 140. Ad fluuium Senega calor ad 152, et in fabulo ad 191 ascendit.

De eo nunc ergo calore quaeritur, qui sit summus, quem homo tolerare possit. Eum vtique non oportet in Septentrione quaerere, vbi non solum breuiori tempore aër calet, sed etiam minori gradu, vt omnino non intelligam, quomodo sint, qui scripserint, calorem in vniuerso terrarum orbe, omnibus computatis, summa totius anni inita, fere eundem esse. Et si enim nonnunquam aestiui calores in borealibus ad solem 100, et paulo vltra, graduum fuerunt, in Islandia, Petropoli, in sinu Hudsoni: in tabulis tamen nuperorum itinerum marinorum p*) sub gradu 69 calor summus fuit 72 gr. Fahr. Borgefundi in Norvegia non superauit 70 gr. q*). Et qui balaenas in summo Septentrione persequuti sunt, media aestate gr. fere 32 Fahr. reperiunt.

Mosambicensen aut Suaquentem calorem nimium credas, in quo figilla liquecant r*), plumbaeque glandes et calcei torreantur, et cutis decedat s). Neque tamen penitus fabulosas vel istas historias dixerim, quoties eas cum venti Samiel, aut Harmattan violentia comparauero, qui in desertis circa Euphraten fluuium, Iamaicae et alibi, subito mortales occidit t), etiam vna die ad 4000, et pecora, quae deprehendit, necat, faciemque amburit u), vt rubra tumeat, quasi ab ebulliente aqua percussa, et aquae calorem eundem imprimat, qui sanguinis est x). Ipse iam sirocco ventus Italis molestus a 72 gr. thermometrum coëgit ad 112 ascendere, et denique languorem facit, aegre tolerabilem futurum, si diuturnus esset y). In Carolina calor 88 gr. somnum aufert et gradu iam 97 vel 98 aegre fertur.

Deinde in ipsa mea patria non rarum est, ictus solis subito aut graues capitis morbos facere, aut ipsam mortem. Pekingi intra vnicum diem, cum calore tantum 103 graduum, plurimos mortales interiisse lego.

Demum

o) CHALMERS *diseases of South Carolina* p. 19. 22. 81. 26. 27. 130. 131. 133.

p*) K. Svenska Vet. Handl. 1759.

q*) *Act. Societ. Drontheim.*

r*) BOYLE *nat. hist. of the air* p. 165. KAEMPFER p. 322.

s) LVDOLPH *hist. Acad.* l. c.

t) Quatuor millia hominum occidit THEVENOT T. II. l. 2. c. 10. 16. vide KAEMPFER p. 671. BALBY *itin.* p. 33. Est Alfesman AVICENNAE L. I. D. II. doct. 2. c. 8.

u) CHARDIN T. IX. p. 223. 224. 225. qui in Caramania ipse expertus est, et T. IV. p. 22. THEVENOT *voyag.* T. III. l. 1. c. 10. 11. 12. DAMBIER *of winds* p. 50. In arenosis Barbariae BOYLE *hist. of the air* p. 150, in Agypto MALLET T. II. p. 366. ed. belg. Habet etiam PERRY p. 256. et KAEMPFER.

x) THEVENOTVS, nisi fallor, T. II. c. 34. 80. nec enim nunc ad manus est.

y) BRVDONE Aponenses calent 52½ gradu: si Reaumuriani sunt, erunt gradus Fahr. 134. VANDELLI *dissert.* p. 7.

Demum peculiaris ille calor, quem in balneis experimur, plerosque in orbe terrarum liberi aëris aestus aut aequat, aut superat. Aquae equidem minerales ad 114. 116, demum ad 150 ad 187 Fahr. vt in *acqua di S. Angelo et delle Colate* 2) ad 189½ gr. Pisciatellae ad 190, vt in Philippinis insulis, ad 190, vt in thermis *Aix en Foix*, ad 192, vt Cascianenses thermae. Non tamen ideo eo gradu summum calorem continuerim, quem homo tolerat. Fert enim certa per exempla dudum nota 97. 98. 99. a), 100 b), 100 c) et 116 gradus d), licet Cl. le MONNIER calorem 40 graduum Reaumurianorum, siue 120 fere gr. Fahr. tolerare non potuerit e). Sunt porro aegri, qui etiam 42½ et demum 47 graduum Reaum. per 7 vel 8 minuta in thermis ferant f), qui est 138 gr. Fahr. diutius toleraturi, si consuetudo g) accefferit, multum enim ea potest. GELSIUS in hypocaustis Finnicis tolerauit gr. 50 suos, inde d. dicit 60 ferre, et sunt, qui ferant 75, qui aequales sunt gradibus Fahrenh. 167. Facilius vero tolerari siccum calorem, quam humidum, ibidem lego h). Quare etiam puella illa du HAMELIO dicta calorem fornacis per 15 minuta ferre potuit, qui erat 135 gr. Reaumur. et aequabat gradus caloris Fahrenh. 336, calorem ideo multo maiorem eo calore, quo aqua ebullit. Demum in illo aestu Caroliniano, vt aliqui mortales perierunt i), ita alii et plerique vitales edurarunt k); calor vero Senegallensis et Carolinienfis etiam a laborantibus in sole aethiopibus toleratur, et calorem 115 graduum iidem aethiopes l) amant. Ita canes in vaporatis inclusi, gradu demum 113 m), 115 n), 122 o) et 146 p) perierunt, et tolera-

B 3

runt

2) Nic. ANDRIA.

a) Libere in eo calore respiratur, SENAC in HEISTER T. III. p. 250.

b) MARTINE *anim. simil.* p. 144c) In aquis Bathonianis per horas tolerari GLASS *of Bath*, p. 27. Gradum 39. Reaum. perisque conuenire, *Mem. de l'Acad.* 1752. p. 637. sed is est Fahr. 113.d) In Rufforum vaporariis 108 et 116. gradu calentibus per integram horam durant GME-LIN *Flor. Sibiric.* praefat. p. LXXI. Pene ardentem calorem ferre WEBER *verändert. Russ-land*, T. I. p. 22.e) *Mem. de l'Acad.* 1747. Multos non vltra gradus 36 ferre *Memoir.* 1752. p. 637. aut 113 grad. Fabr. PLANCUS *agu. Pisan.*f) *Mem. de l'Acad.* 1757. p. 636.g) In balneo vaporis prima die vix 6 minutis durant et pene diffluunt, inde ad 15 minuta edurant SPRINGSFELD *in. Carlsbad.* p. 262.h) K. Svoensk. *Wer. Handl.* 1765.i) Etiam in Europae aestibus nonnunquam homines et animalia subito perierunt MA-S-SA *de febr. pestilent.* p. 146. DERHAM *phys. theol.* p. 17. die 8 Iul. 1707. Gamroni et homines pereunt, et canes KAEMPFER, p. 721.k) *Phil. Transf.* v. 478.l) CHALMERS *l. c.* p. 18.m) DVNZE *exp.* 1.n) *Exp.* 2. 5 et 119 gradus.o) *Exp.* 3. p) *Exp.* 4.

runt gradus 106 *q*), 109 *r*), 120 *s*), 126 *t*) et demum 146 *u*) in nostri DVNZII experimentis. Sed etiam in du HAMELII et TILLETI experimentis, cuculculos in calore 57 ad 59 Reaum. f. gradu 158. et 161. Fahr. vixisse videas. Idem Ill. Collega nuda animalia citius perire annotavit, quam operta vestibus, ut calor cutem penetrare, febremque excitare minus posset. Porro RICHMANNVM calorem 125 graduum tulisse testis est I. A. BRAVN.

Demum etiam hunc aestum nupera experimenta superare posse euicerunt. Canis *x*) quem 146 gradus dicebatur occidisse, sanus toleravit 220 gr. Deinde academici Angli gradus 198. 202. 210. 224 tolerarunt *y*), maiores, quam est aestus ebullientis aquae. Verum etiam istos aestus superavit ille, de quo CAROLI BLAGDEN testimonium extat, calor nempe 244 et 260 graduum, ut anxietas post octo minuta accederet *z*).

Maiorem ardoris excessum animalia frigida ferunt, si cum innato calore sui sanguinis comparaueris, et constantem atmosphaerici caloris tolerantiam. Primum in aquis calorem humani sanguinis aequantibus cyprini perpetim viuunt *a*); qui tamen calor totis, ad minimum, 92 gradibus *b*) calorem, sanguini eorum piscium familiarem, superat, ut excessus inde idem sit, qui foret, si homo in calore fere 200 graduum viveret. Haec vero omnino multo maiora sunt, postquam nuper didicimus, in Philippinis insulis aquas esse 189 *c*) Fahr. calentes, in quibus pisces viuunt. Haec animalia cum ipsa ponas gradu 54 Fahrenheit. calere, nunc elemento 189 gr. calente viuunt, quod totis 120 gr. eorum nativum calorem superet, eiusque plus sit, quam triplum, fere gr. 288. Ranas in Budensi bulliente aqua superuivere olim BVSBEQVIVS. Arbores calorem ferunt 69 gr. Reaumur. et buccinum Ill. STRANGE teste vivit in thermis 88 graduum, cui calor nativus sit paucissimorum graduum supra 20.

In

q) Exp. 6. per quatuor horas cum dimidia.

r) Exp. 6. Venae sectione reuocatus est, qui eum calorem tolerauerat, p. 21.

s) Exp. 3.

t) Post sesquihoram demum in eo ardore periit canis *Experimenti* 5.

u) Demum post 57 min. periit canis *experimenti* 4. in calore 146 gr.

x) *Phil. Transf.* T. LXV. p. 1. cum ad 110 gr. animalis calor descenderet.

y) *Math. DOBSON Phil. Tr.* LXV. p. 2.

z) *Ibid.*

a) IVCAS l. c. p. 205. 206. In calore gr. 72. viuunt MVSSCHENBROECK *instit. physic.* p. 122. inque tepidis oris thermarum ebullientium VALISNERI *oper.* T. III. p. 471. 472. T. V. p. 112. Ad gr. R. 27. 29. 38. viuunt cantharides et buccina VANDELLI p. 52. tepet autem aqua 27mo. In thermis pisces et ranae viuunt CONRING *calid. innar.* p. 42. 43. inque thermis Islandiae calentibus ANDERSON p. 17.

b) PLANCVS in *therm. Pisan. descr.* p. 40.

c) *Philos. Transf.* p. 1.

In summo vero aestu calor corporis humani non sequitur calorem aëris. Dudum *Beni. FRANKLIN d)* annotavit, se in aëre 100 gradu calente omnibus ambientibus corporibus frigidiorē fuisse, et hydrargyrum ex aëre exemptum sub alis descendere vidit L. CHALMERS: deinde in calidis thermis 124 gradu humanus calor non superavit 112 *e)*. In experimentis Cl. BANKS et socio-rum calor humanus neque supra 108 ascendit, neque aëris calorem fuit in eo summo gradu aquae feruentis persistere, sed a 211 gradu decessit vsque ad 198 *f)*. In calore aëris 120 et 130 gr. calor hominis sub lingua est 108 gr. *g)*. Aër 220 gr. calet, canis non supra 110 *h)*.

Non ideo nimii calor in aëre ambiente nulli sunt effectus. Pulsuum numerum vehementer crescere diximus; spiritus etiam laeditur et anxietas supervenit, et intolerabilis demum sensus est aestus, neque absque periculo experimentum foret, nisi homo fuga se letho eriperet. Quare neque mirum est, denique in maiori caloris gradu animal perire. Avicula in calore 65 gr. Reaumur. s. 178 Fahr. periisse dicitur, ex febre, ut credit Cl. TILLET, putrida *i)*, neque tamen etiam post eam sanguinis violentiam putredo apparebat. Ex calore cubiculi lipothymia et pene suffocatio HAGEDORN. Sed etiam in aquis hoc ipso gradu calidioribus, quarum aestus ad gradus Fahr. fere 113. ascendit, etsi pisces pereunt *k)*, ranae tamen vivunt *l)*, quarum sanguis 40 gradibus minus calet: quae iterum memorabilis est caloris tolerantia.

§. III. Calor Humanus varius.

In thermometro sub alas hominis dato argentum vivum ad 32 Reaumurii *m)*, 94 *n)*, 95, 96 *o)*, 98 *p)*, 99 *q)* Fahr. gradus in temperato aëre ascendit,

d) Ap. BROWN de viribus atmosphaerae, Edinburg. 1770. et FRANKLIN *lettres on diversens sujets* p. 101.

e) HAYGARTH ap. FALCONER II. p. 182.

f) LVCAS ibid. de aquis etiam Porcetanis.

g) Phil. Transf. T. LXVI. *h)* Phil. Transf. T. LXV. p. 2.

i) Mem. de l'Acad. 1769.

k) Pereunt in gradu 96 MVSSCHENBROEK. In calidissimis aquis ranae pereunt TARGIONI viaggi I. II. p. 419 De Porcetanis LVCAS of waters T. III.

l) COCCHI delle bagne di Pisa p. 59.

m) In thermis Aponensibus plantae vivunt MAPPVS de potu calido, p. 27. Mem. de l'Acad. 1734. p. 562. 563. 1738. p. 492.

n) BOERHAAVE Elem. Chem. T. I. 415.

o) SCHWENKE p. 44. 46. RVTTY *synopsis of miner. waters* p. 594. FAHRENHEIT apud MARTINE, A. de HAEN I. c. p. 153.

p) MARTINE anim. simil. p. 142. de suo calore *Essays* p. 335. In Minorca inf. 98, et semel 100 RVTTY I. c.

q) MATTY *Journal. Bibl.* 1750. p. 447. Nimis frigidum sanguinem fecerat BOERHAAVIVS, qui calorem humanum ad 92. gr. Fahr. calculis positus putat. *Veget. stat.* c. I. p. 59. et

dit, vt alius homo alio feruidiorem temperiem nactus est, et diutius mensura adhibetur r). Sanguinis ipsius, aut viscerum abdominis viui animalis aliquanto maior s) calor est, vt vno, duobusue gradibus Fahr. superet. Accuratus Cl. Ant. Martin ROLANDI fil. reperit calorem humanum esse fere 36, 37 gradus Celsii, qui fere essent 96 gr. Fahr. Vrinae et lactis fere 93½ calorem aëstivo aequales et paulo maiorem; calorem in ala et inguine fere 93½, in pectore 90 t).

Calorem hunc paulo maiorem facit Cl. HOME, vt infante nuper nato sit a 94 ad 100; anno 4½ a 94 ad 99; aetate media a 95 ad 98, in senibus a 98 ad 100.

Iterum calor vno, alteroue gradu vesperi, quam matutinis horis, maior est, et per noctem decrescit. Nuper Cl. BRAVN u) reperit calorem in ore hominis esse 97½ gr. calorem vrinae vno gradu, vel 1½ maiorem. In febre hominem caluisse ad vsque 108 gr.

Inde Cl. Antonius Martin ROLANDI fil. variis experimentis reperit, in variolis calorem pectoris fuisse 37 gr. Celsii; eundem calorem in manibus 36, pedum 34. Deinde tertio die calorem in pectore et in manu 38. Iterum alarum calorem 35, pectoris 34, manus 36, pedum 31.

Inter animalia multa sunt, quae aliquanto magis calent, vt ex quadrupedibus carniuoris canes x), felesque y), et cuniculi, quorum calor est fere 103 z) graduum, tum porci, phocae, sanguinei animalis, quibus 102 in cute, et 103 graduum in abdomine calor est a). Deinde aues etiam istas bestias superant. Inter femora enim gallinarum, et columbarum, et monedularum liquor thermometri ad 103, 104, 106, 107, 107½ et 108 gr. ascendit b); in anserem ad 107½, in rubicilla ad 111½ c). In corde monedulae d) 109 gradus WHYT-TIVS reperit, in recto intestino 107½.

Sed

et Cl. SAVVAGES, qui 30 Reaumurianos gr. admisit *effets de l'air* et magis adhuc PITCAIRNIVS apud MARTINE, qui 90 Fahr. Nimis calidus potius sit, si dimidium calorem aquae ebullientis ipsi tribueris, *l'Ph. Tr.* n. 27.

r) HAEN l. c. p. 157. ad sex demum gradus liquor per moram ascendit.

s) MARTINE *anim. simul.* p. 174. *Essays* p. 336. 337. 338. WHYT *Physiol. essays* p. 16. non adeo 12 gradibus, vt Theophilus LOBB de febrib. n. 239. Vrinam quatuor gradibus calidiorum facit HALES l. c.

t) In K. Svenska Acad. *Vet. Handl.* 1764. 4. 1768. trimestr. 2. 1773. trim. 3.

u) N. Comm. Acad. Perrop. XIII

x) MARTINE *anim. simul.* l. c. *essays* p. 336.

y) Sanguinis calor duobus gradibus maior est.

z) BRAVN.

a) MARTINE *ibid.* p. 337.

b) MARTINE *anim. simul.* p. 142. *essays* l. c. WHYT l. c.

c) BRAVN. d) WHYT.

Sed etiam in hominibus per febres calor maior nascitur e). In febre rubra tantum fuisse aestum legimus, qui de faucibus aegri exibat, vt medicus caput a vapore detorqueret f). In morbo bouum sanguis calidissimus g) etiam ad tactum fuit, inque malignis febribus aestus acerrimus h). Fuit, quae balnei aquam suo vehemente aestu calefaceret; calida vero aestimatur aqua, quae 100 gradum attingit. In pleuritide inf. Minorcae i) aegrotantium aestus fuit grad. 102 et 104, idemque 102 grad. in flaua febre k), in febre vero intermittente 104 l) gr. et alias 106 et 108 m), in continua ad 109 n). Vltimum gradum caloris MARTINVS et NAESMAN ad 110 grad. Fahr. fixerunt. Certe, qui summus caloris animalis gradus est, is in cane fuit, quem *Arnoldus* DVNZE vaporario 146 gr. calenti inluserat. Is tamen in abdomine 110 grad. non excessit o), in homine 112 p). Vnicum enim experimentum nondum recipio, hominis, qui manus suae calore thermometer Fahrenheitianum fregerit, qualia spiritu vini repleta 112 gradu terminantur q). Neque Surinami, in calidissima regione, sanguis magis incalescit, quam nostratibus. In ore enim ipso thermometer gradum 94 ad 97½ indicauit r), et calorem humanum cum calore aëris non pariter intendi, neque sub aequinoctiali linea, quam in Europa, maiorem esse, annotauit Ill. SENACVS, s) neque in maxima febre vltra 8, vel 10 gradus calorem animale superare t). In nuperis Britannorum periculis vidimus calorem humanum non supra 108 grad. ascendisse, etsi calor atmosphaerae ad 200 et 260 grad. auctus fuerat. Quare putarunt Cl. viri gaudere hominem vi, quae calorem in atmosphaera minuat. Id repugnat experimentis alias repetendis, quae ostendunt, hominem aërem ambientem per respirationem phlogisto saturare. Quare non plus inde deduxeris, quam eam esse legem, vt nulla violentia caloris exteri in viuo animale calorem supra 112 possit augere.

§. III*.

e) NAVIER sur plusieurs maladies populaires.

f) *Fraenkische Anmerkungen* T. II. p. 105.

g) *HUXHAM* fore throat, p. 58.

h) CL. CHOMEL in theti Ergo nimidis haemorrhoidibus hirudines.

i) CLEGHORNE of Minorca, p. 245. 246.

j) *Essays Medical and literary of a Society at Edinburgh*, T. II. art. 29.

l) SCHWENKE p. 57.

m) MARTINE *Essays*, p. 342. SCHWENKE p. 77. Tantum 100 in quartana SCHWENKE.

n) *Ann. de HAEN*, p. 168.

o) DVNZE exp. 4. p. 26.

p) SAVVAGES *inflam.* p. 238.

q) WOLF *vernünftige Absichten* n. 208.

r) *Allgemeines Magazin*, T. V.

s) I. C. T. II. p. 247.

t) Idem ibid. p. 246.

§. III*. *Electrica Materies.*

Sequitur, vt de elemento agam duplici, pariter, vt halitus, volati i, quod nuper in sanguine Cl. viri ceperunt admittere, et cuius leuem quandam hic gustum offero, cum rem nouam, nondum satis constitutam, nullo meo proprio experimento illustratam, omnino indicare potius possim, quam plene exponere.

Primum *electrica materies* in sanguine nostro perinde, vt in omni alio fere corpore, reperitur, ignea ea, cum phlogisto comparata proxime affinis u), odore certe proprio phlogisti x) subgrauī, potentissimarum eadem virium. Ea in solito corporis humani statu nullum sui indicium edit, aequabiliter, vt videtur, per vniuersum corpus distributa.

Eadem quando in torrentem per frictionem incitata, vel in corpus humanum congesta, se in vicinum corpus exonerat, minus vbertim ea dotatum, vel vicissim ex corpore electri pleno in nostrum, minus eo elemento diues, recipitur, insignes utrobique effectus edit. Scintilla nempe ex quacunque corporis parteeducta ignis vim habet, vaporem pulueris pyrii et spiritus vini accendit, in corpore nostro, qua scintilla recipitur, dolorem facit insignem et concussionem, quae late propagatur, vti maior eius vis est, demum si scintilla potentior, et ictus validior fuerit, animalia minora occidit, laceratis eorum vasīs, et effuso sanguine: potentior etiam magna animalia denique necat, qualis ex ferreo cylindro exiens, cum scintilla atmosphaerico electro tonitruali onerata esset, RICHMANNUM subito exanimauit. Singulare vero est, ictum in caput electricum animal fere occidisse, vt tamen ictus in sternum datus idem y) fuscitaret.

Idem elementum in torrentem incitatum pulsū duplo accelerat z), et humorum motum duplo auger, respirationem incitat, ouorumque exclusionem praecipitat.

In sanguine habitat, et de sanguine ex vasīs effuso scintillae specie exsilit, et conspicuum etiam de vena incisa cum sanguine exsilit, vt de musculo, tendine, neruo.

Negatiua electricitas contraria facit, et liquorum motum retardat. Cum perspirante materia Sanctorianana potissimum de pilis a) et plumis psittaci emicat.

In

u) WINKLER qua ratione ignis et mater. electric. cet. p. 167.

x) GERHARD Mem. de l'Acad. de Berlin, 1732.

y) Coll. Hafnens. II. p. 60.

z) GERHARD Mem. de l'Acad. de Berlin, 1772. KÖSTLIN de effectibus electricit. in corp. organ. Tubing. 1775. 4.

a) CASTILLON in se ipso Berlin. Magaf. II, p. 485. 486.

In dorso felium notissimum, etiam in nonnullis hominibus abundat, vt electricas scintillas de linteis excutiant, quibus amiciuntur b). Limbus electricus de corpore humano vndique exhalat b*).

Per communicationem electrici b**) sunt nervi, cula *), fibra lignea. Non recipiunt electricam naturam pars serosa sanguinis, feri, muscoli siccī, intestina sicca, gelatina sicca. Perfert et communicat oleum animale, medulla, lymphæ, vngues, capilli. Conductores sunt globuli rubri, sal vrinae fusilis, intestina, ossa recentia, cutis humida, nec sicca; et vno verbo videtur per experimenta confici, corpora animalium sicca non esse electri conductores, et quæ videantur conductores esse, ea in ratione aquae, quam continent, eo officio fungi.

Potentissimus stimulus idem electrum est, qui musculos et cor ipsum ad motum suscitât, quo tempore ad omnes alios stimulos obsurduerunt. Vidi in gallinis aquis mersis tactum electrica virgula musculum caudam animalis, et crus erexisse, vitam tamen non rediisse. Eadem est scintilla, quæ nunc demum de anguilla suppurifera conspicue emicuisse visa est, vt concussionis electricæ torpedinis non alia causa sit.

Idem electrum corrigit aërem b***) clausum nec renouatum, et animal resocillat, quod in eiusmodi aëre perituum anhelat.

pag. 37. l. 16. et in animalibus carniuoris g), herbiuoris mitior lege grauissimus in variolis f*) aliisque acutis morbis f**). Cum feri odore comparatus est f†).

Sed etiam vrtica marina, quæ ab vrendo nomen habet, vaporem, dum se constringit et dilatat, emittit, qui oculos acrimonia inflamat f††). In animalibus carniuoris fastidiosior est g), herbiuoris mitior. De eo odore, qui epidemia Neapolitana g*) infecti fuerant, ipsi querebantur, et a miliari febre mori vidi, qui mortem suam se olfacere clamabat.

ibid. l. ult. adde Lochiorum sanguis foetet h*), sed id loco tribuas, ex quo fluit, et stagnanti in calore cruori.

C 2

Vtique

b) ROYX *Journ. de medec.* Sept. 1773. Nov. 1776.

b*) PONCELET.

b**) ROZIER, 1776.

*) Caro forte legendum est. *Nor. Edit. lui. auct.*

b***) SCHINZ de electric. p. 28.

f*) Barthol. MESNY ap. TARGIONI *raccolta*, III.

f**) P. G. WERLHOF *oper.* p. 140.

f†) BVTT *spont. separ.* p. 56.

f††) BERTHOLET de l'air.

g*) FASAN. p. 204.

h*) BÜTTNER *Kindermord.* p. 12.

Vtique magis exhalat in calore maiori, et plus feri etiam de grumo fecedit *h***).

Paragraphum quartam excipit in noua editione.

§. IV*. *Phlogiston.*

Phlogiston, s. id quod ignem capit, purum, aliud est a pinguedine, quae praeter id inflammabile plurimo acore constat. Huius elementi incipimus doses aliquas deterere.

Phlogisti odor cum acore in electrica est materiei *p***). In alimentis habitat, et a natura animali in electrum perficitur *p***).

Eius certa portio in sanguinis parte rubra salubriter inest. Pars superflua *p****) de pulmone exhalat, nisi exhalaret magnorum morborum causa futura. In sanguinem ex aëre transiens eum reddit inflammabilem. In adipe etiam abundat *p†*). A phlogisto calorem esse, et a ferro ruborem pute hunc a ferro phlogiston accipit *).

Eidem phlogisto motum muscularem tribuit CL PRIESTLEY. Per vniuersum autem etiam continuo exhalat, et aequilibrium requiritur ad hominis integritatem, inter id phlogiston, quod ab alimentis accedit, et id, quod exhalat *p††*).

Longius progressus I. HUNTERVS *p†††*) sanguinem viuere docet, et in vasa coagulatum se fingere. De ista quidem hypothese dicemus, quando de formatione partium corporis animalis dicetur. Vitam nostram in humore esse, cui pene toti amisso superuiuimus, omnino non videtur probabile.

pag. 38. l. 18. *post* moram *adde* in vase ampliter aperto, lentius in clauso *q**)

ibid. l. 19. *post* ascendunt *adde* qualis etiam aquula de puncta placenta per foramina stillat. Eadem aqua super cruorem natat, magna cet.

p. 39. l. 7. *post* rubet *adde* Partem colorantem sanguinis perexiguam esse ¹⁾) nominamus, et magnam vim aquae tingere, etiam millecuplam ²⁾), et globulum ipsum

*h***)* EVTT *spont. sangu. separ.*

p)* GERHARD l. c.

*p**)* PRIESTLEY *sur différentes sortes d'air.*

*p***)* MOSCATI

p†) Id

^{*)} Nescio profecto, quae conueniat his verbis medela; quanquam enim ruborem a pute commate separandum, et *puro* loco pute legendum esse opinari aliquis possit, tamen non video, qua ratione phlogiston ruborem a ferro accipere queat; etenim inflammabilem equidem materiem omnis potius coloris expertem existimauerim. *Not. editor. huius auctar.*

p††) Idem.

p†††) *Comment. Med. XI.*

q)* EVTT p. 6.

¹⁾ EVTT l. p. 40. ²⁾ lb. p. 41.

ipsum rubrum subviridem esse ³⁾, atque a phlogisto ⁴⁾ demum ruborem concipere, et demum nigrum fieri, si repletus phlogisto, in aëre phlogiston recusante detentus, se suo phlogisto per exhalationem non possit liberare ⁵⁾). Ea omnia cum meis experimentis comparata eo redeunt, ut totius quidem globulus ruber sit; in centro vero iste rubor congestus intensior appareat.

ibid. l. 14. *lege* permittum.

ibid. l. 22. *Petrus van MVSSCHENBROEK* rationes ---- tum 1084 et 1027 c) *lege* Sollicita cura *Petr. van MVSSCHENBROEK* c) haec pondera definierat. In homine sanguinem totum reperit ad aquam se habere uti 1046 ad 1000, cruorem solum ut 1084, serum solum ut 1027 ad 1030. In cane sanguis arteriosus erat 1082, venosus 1062. In agno sanguis pendet 1060, serum 1019. In vaccis sanguis 1058, serum 1042.

p. 42. l. 9. *post* circumfluit *adde* Eluta placenta quasi in cellulosum reticulum abit, in quo laminae sunt.

ibid. l. 11. *post* ruforum *adde* hominum

ibid. l. 13. *post* Europa *adde* aucto calore etiam magis ut ad 125 grad. Fahr. g).

Maximo in aestu omnia fluida corpora dissipantur.

ibid. l. 19. dum *lege* in qua

p. 43. l. 7. *post* indurescit *adde* et similia in fila, cortique speciem in aneurysmatibus coit.

ibid. l. 12. *adde* Id quidem non recusauero, secedere sensim globulos ipsos, fundumque petere, per Cl. DAVIES experimenta.

ibid. l. 14. *post* circa *adde* 125,

p. 44. l. 7. *post* minori *adde* in maiore tamen celerius

p. 45. l. 10. Sanguis in petechiis sub initia morbi --- si fluidus de vena prodierit *lege* In morbis acutis deterioris generis sanguis in principio saepe sani simillimus; alias et fluidus est, et coccinei coloris, ut tamen placenta cruoris tenerior sit a). Alias omnino crustam habet, ut in febre inflammatoria innatantem, aliquando densam, tenuem alias, sub qua nonnunquam sanguis dissolutus et tenuis sit b). Alias omnino nihil peculiare ostendit.

C 3

Verum

³⁾ MOSCATI. ⁴⁾ Id. ib. ⁵⁾ Ibid.

pag. 39. not. u) *adde* BVTT p. 49.

pag. 42. not. l) *adde* etiam Cl. BVTT p. 6.

a) HUXHAM of fevers T. II. p. 83. of sore throat, p. 31. 39. In principio anginae malignae densus, post aliquoties sectam venam merus nunc ichor est, MOVILTRIE febr. flav.

b) WARREN of the yellow fever, p. II. LININGS Ess. med. and philos. T. II. art. 29. HUGHES nar. hist. of Barbadoes, p. 38. Nouveau voyage de Guinée, p. 311. Floridus absque ferro cogitur, post triduum vero flauus est, et naturam coagulabilem exuit. In variolis dissolutus educitur, sic in petechiis, HUXHAM of sore throat, p. 37. of fevers p. 52. 53. 58. 59. 62.

SCHWENKE

Verum paucos intra dies haec ita mutantur, vt nulla nunc crusta coriacea coëat, et vniuersus sanguis tenuis, niger aut decolor, glutinosa natura destitutus appareat; demum in peculiari illa maligna insularum Antillarum et regionum tropico subiectarum febre tota corporis vniuersitas, ipse demum adeps, flauo colore suffundatur, et serum sanguinis potissimum flauum sit. Ita variolae sanguinem disponunt, vt cruor ruber facillime dissoluatur b*).

pag. 46. l. antepen. neque malum auxilia fere admittit *lege* neque vulgo putetur, id malum auxilia fere admittere,

ibid. l. penult. *post* nequit *adde* Neque tamen hoc triste praesagium adeo fidum est u*), quin subinde in variolis, petechiis, aliisque febribus putridis, post haec funesta sanguinis dissoluti indicia, homo mortis periculo eripi potuerit, et sanguini prior densitas restitui, cortice peruiano, et acore potissimum minerali adhibito. Cl. Prosper d'EMPORTES, qui in Dominici insula medicinam fecit, eiusmodi haemorrhagias minime reformidabat, neque infelix Jamaicensis medicus WILLIAMS.

Ceterum horum omnium testimonia adeo numerosa coram habeo, vt omisisse maluerim, ne lectori taedio sim.

ibid. l. ult. *adde* et ipsum vnguen articulorum, et adeps, et lac.

p. 47. l. 10. *lege* eam aestimauit

ibid. l. 17. *post* HOFFMANN *adde* et nuper Cl. DAVIES

p. 48. l. 10. *adde* Multa vero sunt, quae hanc portionem turbant. Si ex amplo vulnere sanguis saluerit, plus fere in ratione 3. 2. feri secedet, quam quidem secederet, si vulnus exiguum fuisset, idem etiam maiori parte feri liberatum crassamentum solidius erit u*), et sanguis, qui pleno flumine exundauerit, plus feri amittit; minus, qui lente secundum brachium labitur u**).

p. 49. l. 3. *lege* Porro

ibid. l. 13 *lege* Contra aetius sanguinem in Carolina meridionali ita dissoluit, vt exigua de grumo portio supersit k**). Contra in morbis, quo quisque cet.

pag.

SCHWENKE p. 129. LISTER de variol. p. 98. BIANCHINI *lettere* p. 135. In parisiensi morbo, celeriter ad mortem tendente, sanguis tenuis fuit, vt pulli cruor *Mém. de l'Acad. des sc.* 1749. p. 119. In angina maligna similia habet HUXHAM *ess. fore throat*, p. 52. et in febre nosodochiali iam prouecta PRINGLE de morb. *castr.* p. 296. Sanguis in malignis amittit mucosum elementorum vinculum BORDEU du pouls, p. 303. In peste sanguis floridus et ruber est *Obs. sur la peste* p. 343. In vaccarum lue dissolutus est, HANNAEVS in libello de ea lue proprio, p. 19. Hannöuer. Viehscheuche p. 27. Ipse adeps motus est ENS morbo. *osterod.* p. 81.

b*) SARCONE vacuolo, p. 136.

u*) p. 33.

u*) BVTT l. c. p. 12. u**) p. 13.

k**) CHALMERS *diseases* P. I. p. 114.

pag. 50. l. 11. *post animalibus adde et in pullo, qui ovo continetur, calido animali s*)*

ibid. l. 13. neque microscopii *lege* ne microscopii quidem

ibid. l. ead. Non absque ratione frigida animalia - - - quae meos veri cupidos oculos fugerunt *lege* tum enim tenuem liquorem continuatus motus demonstrat, quando vno globulo ex quiete in motum actō, alius longe distans globulus, et demum plures globuli in motum reuocantur, quae continuitas communicati motus locum habere non possēt, nisi primus globulus cum secundo per inuisibilem liquorem coniungeretur. Mecum sentit Cl. SPALANZANVS.

Hos globulos in propriis oculis meis saepe vidi, quando ciliis lumen candelae excludebam. Tunc enim in opposito linteo, vel in charta, et cylindrica vasa, et globuli per ea vasa celeriter moti nudo oculo conspiciuntur. Eosdem etiam globulos vidi, cum per exiguum foramen inspicerem. Haec experimenta fusc et ornate Cl. MEISTERVS descripsit.

Sed sanguinem de vase eximere, aqua diluere, inter duas talci laminas recipere non placet: his enim artificii natua globulorum figura mutari potest. p. 51. *Decima paragraphus in noua editione ita orditur:* In horum globulorum historia oportet sollicitis et lentis passibus progredi. Cum enim nuper plures insignes viri in cruoris globulis microscopio contemplandis versati fuerint I. Maria a TURRE, F. FONTANA, Guil. HEWSON, Lazarus SPALANZANVS et alii, mirum est, quam diuersa sint, quae quisque horum clar. virorum vidisse se putat, vt neque inter se eos conciliare possim, neque cum meis numerosissimis certe contemplationibus. Commune nouiter repertorum cet.

p. 52. l. 12. *lege* et attractione mutua non egent, vt in globulos figurentur.

p. 53. l. 6. *adde* In chylo et lacte globuli etiam sunt, affinis cum sanguineis naturae.

ibid. l. 18. *lege* Ego quidem et in frigidis bestiolis, et in calidis has particulas sum contemplatus, et quidem plus ducenties; eas vero semper cet.

p. 54. l. 1. *post* expallescant *adde* quod idem et Cl. MEISTERVS vidit, et HEWSONVS

ibid. l. 9. *post* percipiatur *adde* Cl. demum viri, et quibus plurimum tribuo, Lazarus SPALANZANVS, et Felix FONTANA, et Cl. MEISTERVS pariter sphaericas viderunt et Caes. POZZI

pag.

pag. 54. l. 19. *adde* Cl. vero vir I. Maria a TURRE, microscopiis insignissime augmentibus vsus, vulgaribus quidem vitris, pariter vt nos, sphaericos vidit acrioribus vero et diametrum 256es et demum 1960es augmentibus omnia alia reperit.

Esse nempe sacculos membranofos quos globulos vocant, complanatos, lymphae plenos, qui ipsi fiant ex tribus ad sex vsque particulis oblongis; quae particulae et ipsae vesiculae sint, quae in maiorem annularem sacculum abeunt, et vicissim discedunt et separantur. Integra vero vesicula, quam globulum vocant, plana est et ouata.

Quae causa sit huius a nobis, et fere ab omnibus aliis incisoribus disensus, nondum intelligo, nisi illa ipsa nimis acris vis microscopii mutatis umbris Cl. viro fraudi fuit, qui interim, dum mediocribus vsus est vitris, similia vidit nostrorum.

Inde *Guilielmus HEYSON* simplices quidem particulas dixit, tamen vt planae sint, et vesiculae liquore plенаe. Memorabile vero est, quod in aqua sphaericam figuram recuperare fateatur.

Nunc globuli sanguinei perpetuo in aqua natant, parum ab aqua vulgari diuersa, et is status iis naturalis est, quem Cl. viro teste in aqua induunt. In nonnullis etiam animalibus sphaericos vidit, et eandem crassitiem in medio sphaerae, perinde vt nos. Vt omnino de solis conclusionibus, non vero de re visa, inter nos discrimen esse putem.

Legi et cum ea fide, quam Claris viris debemus. Neque tamen possum de mea sententia discedere, qui numerosissima eiusdem semper euentus experimenta fecerim, et consentientes viros peritissimos habeam FONTANAM, SPALANZANVM, *Caesareum POZZI*.

ibid. l. 23. *lege* iisque fere frigidis.

p. 55. l. 11. *post* affirmat *adde* Cl. SPALANZANVS in salamandra duorum generum globulos facit, oblongos alios, minores alios et sphaericos, ceterum in omni animali aequales. Cl. HEYSON aliam, aliamque in diuersis animalibus molem facit, minorem in cete, quam in piscibus frigidis, in raia skate maximam, in pullo maiorem, quam in gallina.

ibid. l. ead. *post* experimenta *adde* discutienda

ibid. l. 13. *adde* nihil tamen vidi, quod suadeat, inaequali esse magnitudine.

ibid. l. 15. *post* habeat *adde* Noningentesimae parti pollicis aequalem diametrum Cl. a TURRE facit.

p. 56. l. 5. exponendo *lege* experiendo

ibid. l. antepen. iidem *lege* caedem.

pag. 56. l. ult. *post* rubescant *adde* vt plusculis cl. viris visum est, vt rari flauī vīsi sint Cl. a TURRE et REICHELIO.

p. 57. l. 3. *post* insidere *adde* vt mecum vidit Ill. Felix FONTANA, et SPALANZANVS,

ibid. l. 8. *post* inhaeret *adde* verus tamen rubor inest.

ibid. l. 12. *adde* non decet dissimulasse, Cl. SPALANZANVM, cui merito plurimum tribuo, flauum quidem globulorum colorem vidisse, sed ad refractam lucem reiecisse. Verum mihi quidem, si vlla oculo fides haberi potest, de flavidine globulorum certissime constat. Vide quae dixi a*).

ibid. l. ult. *adde* Non vero vnquam vasa animalis viui fere inania esse, facile dedere, et pelluciditatem liquoris, quo permeantur, eum inconspicuum reddere. Nam in eiusmodi vasis, quae vacua videntur, solitarii et longe a se inuicem remoti globuli tamen celeriter mouentur, et nouas a corde acceptas siccationes sentiunt, quod quidem fieri non posset, nisi cordis impetum liquor aliquis ad anteriorem globulum perferret.

p. 58. l. 13. *adde* Sic in pullo, qui ovo continetur.

ibid. §. XV. *lege* *Figura num mutabilis?*

p. 59. l. 3. *adde* et I. M. a TURRE,

ibid. l. 5. *post* addidit *adde* porro Cl. REICHELIVM, et L. SPALANZANVM vnico fere in exemplo, et Felicem FONTANAM.

ibid. l. 14. *lege* alterna.

ibid. l. 18. *post* Sed *adde* neque G. HEWSON figuram mutari vidit, neque CALDANVS:

ibid. l. ult. *adde* Denique Cl. MEISTERVS globulos in proprio oculo saepissime reperito experimento cum conspexisset, neque figuram variabilem reperit, neque magnitudinem.

p. 60. l. 18. *post* distinximus *adde* multo, quam globuli rubri, maiores, quos etiam L. SPALANZANVS vidit.

p. 61. *Paragraphum decimam sextam excipit*

§. XVI*. Num ex filis?

Noua est sententia Cl. viri I. Henrici LANGE, qui globulos sanguinis pro glomeribus filorum habet, in figuram globosam ita compactis, vt altero sine in centro coniungantur, altero se per ambitum diffundant r*). Eam sanguinis fabricam putat in morbis acutis mutari, vt globulus in suas fibras dissolvatur

a*) Vid. Lib. V. Sect. I. §. VII. et auctar. ad hunc locum p. 7.

r*) Remed. domest. p. 155. 165. Nou. verit. p. 46.

- vatur r**). Verum ea fila neque ego vnquam vidi, neque quisquam Cl. virorum, qui in globulorum natura indaganda laborauerunt.
- pag. 63. l. 20. *lege* sanguineum
- p. 64. l. 8. *post* HALES *adde* Seri flauos globulos vidit etiam Cl. LEDERMÜLLER et A. C. LORRY.
- ibid. l. 15. *adde* Huc reuoces I. Mariae a TURRE experimentum, qui annulares suas vesiculas in particulas illas minores oblongas, quibus constant, quoties motus sanguinis acrior vrgeret, dissiluisse vidit.
- p. 65. l. ult. *lege* et voluminis aucti, globulorum maiorum vera sit, quales LEEVWENHOEKIUS habet.
- p. 66. l. 12. *adde* Nuper demum Cl. SPALANZANVS et Felix FONTANA et coaslitum particularum vnius globuli reiecerunt, et dissilitionem, tum Cl. DAVIES.
- ibid. l. 21. *dele* aut quod solitarii apparerent, aut, quod magis probabile videtur,
- p. 67. l. 21. quae *lege* ob quam
- p. 68. l. 22. *adde* I. Maria a TURRE idem se vidisse existimat, quod vidit LEEVWENHOEKIUS, nempe vnum globulum, qui dissipatus fuerit.

§. XX*. *Aliqua cum globulis facta experimenta.*

Cl. HEWSON globulos cum variis liquoribus et aquis composuit. Ab aqua diximus intumescere, et in sphaerulas turgescere, et demum dissolui, quod pene incredibile videtur, qui natiui aquosi feri hospites sint; ab acore non acerimo pariter dissolui: non ab alcali: ab alumine, spiritu vini et vitrioli corrugari, a putrefactione asperos reddi, et demum diuidi. Nihil ego huiusmodi vidi, neque figuram aut ab aceto, aut a spiritu nitri etiam fumante mutata, tantum vt terreum, luridumque colorem ab his acidis liquoribus contrahant.

p. 69. l. 22. *lege* ab elutis

ibid. l. 23. *adde* et Cl. KRONAVER

ibid. l. ult. *adde* Demum Cl. BUTT de sanguine rubram portionem eluit, ita massam albam superesse reperit firmam et tenacem, quae sit pars fibrosa sanguinis.

p. 70. l. 14. *adde* Cl. DAVIES sanguinem in aquam emissum fieri docet in reticulum fibrarum albarum, et similes fibras obtineri, sanguine in phiala concusso, albas eas, glutinosas et elasticas.

pag.

pag. 71. l. 6. grauitatem *lege* gracilitatem

ibid. l. 9. quemque *lege* quamque

ibid. l. 11. viuo *lege* viui

ibid. l. 24. aliqua *lege* pleraque

p. 72. l. 10. quam *lege* quem

ibid. l. 14. *lege* neque eos vnus generis

ibid. l. 15. rubrumque *lege* cubicumque

p. 73. l. 10. *adde* Nihil nos, dum valemus, a sanguine vasa nostra percurrente patimur, quum continuo incommoda percipiamus, quamprimum puri sales cum sanguine circumfluunt. Cum salem polychrestum sumsissem, bis for-
micationem in pedum plantis, manuumque volis per aliquot horas, inque
lingua titillationem percepi, cum interim vrina acris manaret.

p. 74. l. antepen. *adde* Putredini potenter resistit *g**).

Sal febrifugus SYLVII, et in vniuersum sales neutri ex alcali minerali, et
acore compositi putredinem adiuuant *g***).

p. 76. l. 4. *adde* in cane etiam magis

ibid. l. 14. *adde* Non facile explices, vt CAELIVS AVRELIANVS scripsisse
potuerit, gelatum ab aceto solui.

ibid. l. 19. *post* Alumen *adde* aliter et aliter egisse videtur. In CL. STORMII
experimentis sanguini liuorem impertit, atrumque colorem: secundum alios
solutum sanguinem cet.

p. 77. l. 12. *post* aluminis *adde* et sulphuris

p. 78. l. 6. venas *lege* membranas

ibid. l. antepen. *adde* in *Caesarei* POZZI experimento etiam subito et sangui-
nem coëgit

p. 79. l. 1. *post* missus *adde* canem

p. 80. l. ult. *adde* Alias in BOVRGELATI experimento in floriditate nihil
mutauit.

D 2

pag.

pag. 71. not. c) *adde* MOSCATI nuove esperienze, EVTT *separ. spont.* p. 30. qui serum
coire ponit, filis inter se connatis.

*g**) MESNY ap. TARGIONI III. p. 38.

*g***) YPEY *Verhandeligen der Maatschappij te Haerlem*, XVI, 2.

pag. 77. *ad verbum* nigrumque in *textu* l. 17. *adde* not. u*) Subuirides globulos, EVTT
l. c. p. 52.

pag. 78. not. e) *adde* Subuirides globulos reddere EVTT p. 52.

ibid. not. l) *adde* Globulos nigros reddere EVTT l. c.

pag. 79. not. b) *adde* EVTT p. 52.

ibid. not. d) *adde* EVTT p. 52.

pag. 81. l. 4. *lege* Putredinem a sale sodae augeri *v p e y e **), et porro a volatilibus cet.

p. 82. l. 3. *dele* neque grumum sponte sua factum *et adde* Ceterum sales ex lixivio enati non quidem semper, vt scriptum est, aliquando tamen, et in febris potissimum, vrinofum spiritum affusi de sanguine coegerunt ascendere.

p. 83. l. 4. *post reddit adde* Venena ex plantis sumta, in venas viui animalis injecta, fere sanguinem fluidiorem reddiderunt, gummi guttae, cocculi, nux vomica, aqua laurocerasi. De sale viperae *i **) legi, cogere sanguinem, apud scriptorem non satis certum. Hydrargyrum vtiq; confirmato euentu, sanguinem dissoluit. Visus est sanguis, cui crusta inerat, serumque nullum adfuerat, post vsum vesicatorii confestim serum habuisse absque crusta *i **).

ibid. l. 23. Neque enim certo experimento *lege* Neque enim frequenter

ibid. l. ult. *adde* In equo tamen asthmatico reperio vtiq; sanguinem violarum syrupum colore viridi tinxisse apud Cl. BOVRGELAT. In morbo mucoso (*morue*) equorum sanguis cum spiritu vitrioli fumat, et odorem edit vrinofum. In febre maligna vrina alcalinam naturam induxit, cum non plures tribus horis stetisset. Plura alias.

p. 84. l. 7. *post* ferueat *adde* Vt praeterea et sanguis *r **) et vniuersum corpus ad citam putredinem, promptam alcalinae naturae euolutionem, exponatur. In febre acuta aliquot sunt exempla, de manibus cineribus clauellatis elutis *r †*) spiritum vrinofum ascendisse. Qui vero sanguinem in morbo acuto negant putrescere, ii in verbo ludunt, et id solum negare volunt, esse perfectam, dum viuimus, qualis in cadauere est, putredinem. Bilem ROEDERERVS solam negat alcalescere.

ibid. l. 17. *dele* Haec ideo paulo curiosius moneo - - - et alcalinum.

ibid. *Inferenda est*

§. XXVIII*. *Sanguis putrescendo alcalescit.*

Verum haec omnia sollicite debent exponi, cum nuper alii Cl. viri putredinem ab alcalina natura separauerint. In eo quidem consentiunt omnes, et in febre acuta statum putredini et naturae alcalinae similem nasci, et a morte. Neque alcali a putredine destrui, quod dictum est, constat: et omnino placentam sanguinis die 10, 20, 30 spiritum perinde alcalinum dedisse, et fortius

*e *)* *Verhandel. der Haarlem. Maatschapp.* XV. 2.

*i *)* *SALMON chirurg.* p. 858.

*i **)* *LYSON essays, GLOSSIVS variol.* p. 29.

pag. 84. not. *r *)* *adde de bile* ROEDERER.

*r *)* *COLLIN de Arnica, exp.* 3.

r †) *Apud* MODEL.

fortius die 16 et 24, quam primis diebus 2*); et debile alcali nasci, quando sanguis in principiis est putredinis, multo vero fortius, quando putredo longius progressa est. Mature tamen in tabescentibus partibus animalibus putredo nascitur, etiam quando neque cum acore feruent, neque coeruleos succos viridi tingunt 2**). Auget adeo naturam alcalinam putredo 2†), quam primis diebus fermentatio acida morabatur. Qui negarunt alcali nasci, aut certe nasci in libero aëre, ii nimis pauca experimenta contemplati sunt 2††).

pag. 84. l. 22. *lege* oleutem

p. 85. l. 8. *adde* Huc possis referre ob frequentiores pulsus, quod iuniora animalia celerius putrescant d*).

Sanguis et vniuersum corpus animale sibi permixtum in aëre atmosphaerico non frigido putrescit eo celerius, quo maior calor est, ad gradus fere 100, cuius certa experimenta habeo d**); maiori enim calore serum dissipatur, neque cruor nunc putredinem concipit. Sunt, qui sanguinem minus celeriter, quam carnes, aiant putrescere, vt et mihi in dissectionibus quandoque visum est; sunt, qui celerius, vt prius foeteat, tunc caro, inde serius bilis et vrina d***).

Cum foetore ergo serum sanguinis, sanguis, humores vniuersi eam naturam induunt, vt cum acore compositi ferueant, vt syrupum violarum viridi tingant, vt igni subiecti ante ipsam aquam salern volatilem edant, vt alcalini sint.

§. XXIX*. *Putredinis phaenomena.*

Accuratius vero speculanti progressus putredinis apparuit, foetidum vaporem exhalare, validissime si in vase angusti colli putredo sedem habuerit.

Post eum vaporem putridum foetorem, naturamque alcalinam minui et euanescere, et, quod reliquum est de putrescente animali, in terram fatuam, insipidamque abire. Vna, resoluta omnium partium nexu, membranae primae et viscera in tabum soluuntur, et denique terreum pollinem sui reliquum faciunt.

Putes adeo putredinem cum alcalina natura coniungi.

D 3

Negant

2*) COLLIN de arnica. 2**) Idem.

2†) Id. exp. 16. 2††) PEARSON.

d*) PEARSON de putredine.

d**) MESNY apud TARGIONI *raccolta* T. I. p. 451.

d***) RÖDERER de bile.

pag. 85. not. 2) *adde* Sanguis foetidus MESNY apud TARGIONI T. III. *NERVSCI lettere*, p. 64.

Negant alii, tunc maximam alcalinam vim in putrescentibus esse, quando putredo summa est. Non nasci, addunt, alcali in aqua marina putrescente, etiam si foetor nascitur, et vapor inflammabilis. Videri ad alcali generandum pertinere, ut multum sit in putrescente corpore phlogisti, ut eo in statu minus olei picci supersit. Ceterum ita intelligo putredinis progressum, ut incipiat natura alcalina gigni in sanguine, inque putrescente materia animalis; ita expediri primo alcalinos vapores: una magis et magis adipem resolui, et putridum eum vaporem praeualere; dissipato adeo et alcali volatili et phlogisto consumpto, inertem materiam superesse; sic cum pauciori phlogisto mistum acidum salem alcalinum odorem spargere; phlogisto vero vberius resoluto foetorem putrem ascendere, qui proximae alcalinae materiae destructio-nem praecedit.

In animalibus cursu nimio ad mortem cet.

pag. 85. l. 18. *post* erumpit *adde* In malignis febribus frequenter foetet (*).

ibid. l. 21. *post* laborant *adde* Sudor cadauerosi foetoris in febribus exitialibus halat n*).

p. 86. l. 2. dedisse *adde* et Cl. FASANO teste Neapoli in exitiali febre olfaciebant p*). In febre inficiente miseri se contagium recepisse sentiebant, cum ingratum terrae odorem in ventriculum descendentem perciperent p**).

ibid. l. 15. *post* puris *adde* igne subiecto halans

ibid. l. 6. *post* prostravit *adde* Sanguis foetidus, niger et fluidus per nares, gingivas, asperam arteriam, aluum, aliasque per vias erumpens in febre variolosa s*).

ibid. l. 7. *post* est *adde* Undique gangraenae, sanguis dissolutus, faeces foetidissimae t*).

ibid. l. 8. *adde* Haec confirman- tur ex acidis sudoribus, quos, morbo iam remittente, in petechiis obseruauerunt Cl. STRAK, ROSEN, GRAINGER, alique, signa fracti domini-ii alcalini. Huc etiam referas, quando satis repetito ea experimenta confirmata erunt, Cl. TICHY memorabilem annotationem; in vrina nempe febricitantis, sed ad crisin dispositi, hominis sales angulosos mediae naturae se offerre, qui nulli generantur, quando putredo dominatur, et effectus funestus est futurus. Inde enim, non certe improbabili- ter arguitur,

l*) KIRBY febr. mal.

n*) Zeeuiseh. Gesellsch. I. p. 646.

p*) p. 207. Sic BAGLIVI opera, p. 251.

p**) LIND fevers and insect. p. 244.

s*) WERLHOF variol. morbill. p. 240. STORCH IV. Inaug. p. 636.

t*) *adde* et cito desinagrat ENS morb. osterod. p. 87.

u*) In febre maligna LEPECQUE, p. 415.

arguitur, alcalinae naturae in sanguine victoriam id omne acidum delere, quod vinosam naturam temperabat, salesque sanguinis ammoniacis similes reddebant. Apparere vero sales medios, quando victa putredine natius acor rediit, et cum alcalino elemento in medium salem restituitur. Ob auolans putridum foeditissimi sudores in febribus salutare sunt, vt vulgo notum est *), et in peste †).

pag. 86. l. 15. *dele* Putredo aliunde nata - - - putredinem generauit a).

ibid. l. antepenult. *post* corrumpantur *adde* vt vicissim glacies putredinem moratur; et cadauera occisorum, quos niues obruerant, totis sex mensibus incorrupta supersunt, quoad aestatis rediuius tepor putredinem accersat c*).

ibid. l. penult. *dele* neque multo blandius aer - - - febres nascuntur e).

p. 87. l. 9. *adde* Nihil autem potentius humores nostros corrumpit, quam ipsa putrilago †), vtcunque in corpus recepta, cibis putridis, animalium lue peremtorum efus.

Vapores cadauerum foetidi et coemeteriorum, et acerui putrescentis brassicae, et muscorum margaritiferorum tabescentes cumuli pestiferas febres excitant.

Similia patrat aer praegrans exhalationibus hominum copiosioribus, qua sola ex causa aliquoties in Anglia, et non ita dudum, iudicum, aliorumque adstantium frequentes mortes acciderunt. In ergastulo, in quod crudelitas principis Indici numerosos Anglos stipauerat, plerique intra paucas horas perierunt. Vapor carcerum ex tubo propius receptus ac haustus perniciosissimas febres ciuit; et par est veneni potestas, quod vapores spirant ††) aquae in sentina corruptae. Chirurgi, qui carbunculos, bubonesque pestilentes curant, medici, qui perspirationem morientium inspirant, frequentissimas patiuntur ex simili morbo mortes. Nili aqua, cadaueribus repleti, pestilentem morbum genuit, qui LUDOVICI IX exercitum destruxit. Iniecta in animalis venas aqua putrida cito funesta fit. Putrida auis carne *Tungusi* et *Baratti* sagittas suas inficiunt; iis leuiter laesa animalia pereunt, et celerime et ipsa putrescunt.

Effectus

**) RAZOVX *Nosol.* p. 220.

†) HUDGES.

c*) MESNY l. c.

pag. 87. *ad verbum* viniae in *textu* *adde* not. f*) Ammoniaco odore in calida Carolina CHALMERS l. p. 112.

ibid. *ad verbum* fundit in *textu* *lin.* 12. *adde* not. k*) *Medical Transactions* II.

k†) HOFMANN *Pocken l. Einleitung.*

k††) RUTTY, p. 148. PRINGLE *of the jail fever.* Ab aere nosocomiorum BELLOSTE *Chir. de l'Hôpital.* p. 67. Ab aere ventilatoris, qui carcerem repurgabat PRINGLE *Phil. Transf.* n. 48.

Effectus putredinis variis modis admissæ potissimum sunt summa virium et irritabilis naturæ destructio, cum simili suæ causæ in humoribus nostris putredine coniuncta.

Sola cadauerum nimia consuetudo multos incisores ante diem abstulit. Memini ALBINUM, grauissima febre erysipelacea infectum, a BOERHAAVIO fato fuisse ereptum: Memini proprii morbi miliaris, et innumerabilium fere febrium continuarum, quas Gottingæ passus sum, cum inter cadauera sex fere in annum mensibus viuerem.

pag. 88. l. 11. *adde* et sudor cum aceto efferbuit a †)

ibid. *Tricesima paragraplus in noua editione inscripta est: Aër expeditur et incipit:*

Vna cum foetore putredo se demonstrat. Nemo putredinem accuratius cet.

ibid. l. ult. factorem lege foctorem

p. 89. l. 10. *adde* Haec eo tempore vera erant, nam postea CL. CIGNA, NAVIER, CRELLIVS, alique magis chemice de putredine scripserunt i*).

ibid. l. 12. *post aërem adde* qui de animalibus inflammabilis prodit i**), idemque iterum resorbetur i***). Is aër, cum auolante phlogisto inebriatus sit, flammam concipit i †), et cum ardeat, aufert alcali volatile i † †), quoad perfectio stadio vltimo putredinis nullum superfit. Vt enim a putredine generatur, ita ardendo minuitur, et denique, postquam ad acmen peruenit, consumtum inertem massam relinquit. Haec causa est, cur in amplis vasis apertis alcali minus generetur, in vasis angusti colli magis, hic enim vapor foetidus lentius auolat.

ibid. l. 13. *post aqua adde* merfos

ibid. l. 19. *post refert adde* et in morbis putridis eam euolutionem locum habere, etiam intra ipsa vasi, nuper ostensum est n*). Quare et in cadauere prius secedit, quam signa aliqua putredinis se efferant.

p. 90. l. 2. *adde* et cerebrum intra cranium in putrilaginem abiisse.

§. XXX*.

pag. 88. not. v) *adde* HOFMANN Pocken I.

ibid. not. u) *adde* Prax. Med. VI. p. 140.

ibid. not. a**) *adde* Manuel antisept. p. 705. Similia habet CL. HOFMANN Pocken,

p. 269.

a †) BARTHOL. Cent. IV. hist. 59.

pag. 59. not. g) *adde* PRIESTLEY sur différentes especes d'air, p. 106. 107. WIEGLEB Gæhrung p. 130.

i*) BOISIEUX egregia semina de T.

i**) PRIESTLEY ibid.

i***) Idem.

i †) PRIESTLEY, PEARSON.

i † †) WIEGLEB l. c. p. 128.

n*) Obs. and Enquir. T. III.

§. XXX*. *Adiumenta putredinis.*

Porro sanguis, dum putrescit, et ipse foetet detestabili odore, potissimum si per angustum tubulum exspirauerit, et alcalescit, ut omnino cum acore ferueat t*).

Plerumque tamen aëris atmosphaerici cet.

pag. 90. l. 8. *post* admiserit *adde* Sed humor modicus putredinem adiuvat, multa et saepe renouata aqua retardat.

ibid. l. 10. *lege* Cancrorum oculi y), et magnesia, et bolus y*), et selenites, et demum ipsi sales medii, in quibus alcali minerale cum acore coniungitur, ut sal mirabile GLAUBERI y**), et sal sodae z) sanguinis et carnis putredinem promouent.

ibid. l. 13. *lege* Sal fixus putredinem adiuvat b*) et tartari cet.

ibid. l. penult. Volatiles alcalini sales - - - relinquit et tenerrimam terram *lege* Haec nostro aevo labefactantur, ut passim legas, et experimenta producantur, quae fidem faciant, aquam calcis putredinem tardare, sed etiam sales lixiuiosos fixos eadem esse potestate, quae utique cum prioribus conciliare nescio. Volatiles alcalinos sales equidem lego putredinem potius morari i) et impedire: Sic sales vegetabiles i*), mites etiam, ut saccharum, succus limonum, et magis adhuc acidi k) de fossilibus k*) parati liquores, ipsum demum vitrioli oleum. Id enim in aeternum omnem putredinem a carne et auertit, et, si incepta fuerit, abigit, redditque carni suam integritatem. Aër factitius, qui fere acidum subtile est, de solutis corporibus exhalans, putredinem inhibet et emendat l). Hoc etiam potissimum argumento ductus in noxia putredine febrium malignarum summo cum fructu aëoris vitriolici vires expertus sum. Porro plantae nonnullae, aromaticae potissimum, putredini obstitunt, ut chamaemelum, valerianae radix l*), potenter, et, quam cortex peruuanus, fortius, et arnicae pariter l**) potens radix, et camphora: sed etiam cortex peruuanus, qui adstringens sit, est inter meliora antiseptica, tamen

t*) ROEDERER de bile.

y) *adde* YPEY l. c.

y*) YPEY. y**) Idem.

z) Idem.

b*) Huc spectat not. z) pag. 90.

pag. 90. not. d). *adde* et in *edit. oper. gall.* II. p. 226.

i*) MESNY cet.

k*) MESNY cet.

l) Idem.

l*) DRESKY de valeriana.

l**) COLLIN de arnica.

tamen vt acori minerali cedat (***). Princeps etiam inflammabilium alcohol putredinem auertit, minus tamen, quam vitrioli acor. Aqua mineralis (****) Neyholtenſis putredinem penitus impediuit. Debiles ſales medii (*****), muria marina, ſal ammoniacalis multa aqua diſſolutus, corruptionem potius augent. Maiori copia impedit, et melius nitrum.

pag. 91. l. 16. *poſt* percellit *adde* ad pyrethri modum

ibid. l. 17. *poſt* producit *adde* In ſepia, gelatiſo animali, ſuccus acris et igneus.

ibid. l. antepen. *adde* Scorpii venenum acre eſt. Muſcae ichneumones ſuo liquore fabulum in paſtam reſoluunt.

p. 92. l. 3. *poſt* gignit *adde* Liquor veſicularum bombycis cum acore viuide ferret x^{*)}).

ibid. l. 10. *poſt* tinctum eſſe *adde* et linguam inflammare.

ibid. l. 12. *poſt* ſit *adde* et denique huius ſucci natura venenata multo ſubtilior eſt, cum in lingua inſpidus videatur; vt omnino non acrimonia ſua nocere videatur, ſed vi ſtupefaciente, quae irritabilem vim partium corporis humani deſtruit a^{*)}).

ibid. l. 17. *adde* Faeces columbinae odore ſuo oculos humectant, et ſale albo penetrabilis odoris d^{*)} teguntur.

p. 93. l. 15. *poſt* pertinet *adde* Aqua cum muſcis vulgaribus digeſta manifeſto acida eſt.

ibid. l. 18. *adde* Nullum in progreſſu putredinis acorem generari Georgius PEARSON^{n*)}).

Vtunque iſta ſint, in humoribus nonnullis, iuniorum cet.

ibid. l. penult. *poſt* ſolet *adde* Succus folliculi dentium, et ſuccus viſcidus ex nervis boum chartam caeruleam rubro colore tingit p^{*)}). Caro vitulina cum pane et ſaliua contrita incipit vinoſum ſpargere odorem, neque putreſcit, niſi quarto die p^{*)}).

p. 94. l. 6. *poſt* indolis *adde* Denique non ſemper, ſaepe tamen, inque omnibus Cl. COLLINI experimentis in principiis putredinis aliqua, non duratura, ſigna

l^{*)}) DARCONVILLE ſur la putrefaction, COLLIN.

l^{*)}*) RUTTY.

l^{*)}*) huc ſpectat not. l) pag. 91. Ceterum notae i) et k) mutandae non ſunt, l^{*)}) vero et l^{*)}) delendae.

x^{*)}) *Comm. Acad. Bon. T. V. P. I. p. 44.*

a^{*)}) FONTANA de viper.

pag. 92. not. u) *adde* et nuper a. PIMPIOLO.

d^{*)}) MASSAC engrais p. 14.

n^{*)}) de putredine, Edinburg. 1774.

pag. 94. ad verba ex adipe ſit lin. i. in textu *adde* not. r^{*)}) *Hiſt. de l'Acad. 1759.*

p^{*)}) IOVRDAIN p. 112.

p^{*)}) MESNY apud TARGIONI p. 115.

signa acidæ degenerationis se offerunt, vt præcedat acor, aliquamdiu cum putredine partitas vices teneat, et ab ea denique superetur *y**). Memini Leidae, cum paucis cadaueribus auare vteremur, musculos viscorem concepisse cum acido manifesto odore. Solet autem acor, qui putredinem præcedit, ingratus esse, et id habere a vero acore diuersum, qui grato est odore et sapore; videtur enim in animali putrescente rancor corrupti olei se cum euoluto acido coniungere.

Denique fortissimi acoris exemplum Cl. CADET habet, cum liquor putrescentis in plumbeo sarcophago cadaueris plumbum eroserit, et cum eo in saccharum abierit *y**). Ea observatio posset forte efficere, vt CEZANIO crederem *y****), qui venereum tabum acidum facit, vt violaceos succos rubefaciat.

pag. 94. l. vlt. adde Acorem autem adulta putredo destruit, sanguis putridus ossa non soluit *f****).

p. 95. l. 2. Vnico verbo liceat monuisse, odorem lege THEOPHRASTVS negauerat, vllum boni odoris animal dari, et certum est, odores

ibid. l. 9. post acquirunt adde et foetidum didelphidis vnguentum. Vulgo etiam bubulum sterus in agros laetaminis loco sparsum sub brumam, mense decembri, sereno sub coelo, gratum moschi odorem spargit. Vrina siccata cum odore grato vehementer igne salem dat ammoniacum, et paulo post phosphorum *h*†). Huc etiam vpupae moschatum odorem refero, quae ex stercore humano infecta quaeritat, et cuius caro inedulis est ob moschi fortem odorem *h*††).

ibid. l. 12. Infecta paucula exstant, quorum odor placet lege Frigida animalia aliqua moschi sunt odore *); sic crocodilus, qui suo moschi odore late aquas imprægnat **). Infecta etiam aliqua grato sunt odore, vt capricornus *i*),

E 2

alia

*y**) COLLIN de arnica.

*y***) In N. E. N. C. vol. IV.

*y****) Manuel anisopphil. p. 205.

*f*****) PRINGLE Essays phys. and literar. III. p. 253.

h†) de MACHY Inst. Chem. T. I. *h*††) SALERNE ad RAT ornitholog. p. 121.

Not. *h**) et *i**) deleantur, cum ipsi textui insertae observationes, libri vero ad notas *) et **) relati in noua editione sint.

Ad verbum aues in textu lin. 10. adde not. *h*†*) Gallinae tamen species moschi odore OVIEDO summar. c. II. Insecto-theol. II. p. 110. CARDAN. variet. p. 169.

*h***) adde de leonis proprio succo, qui in aliis quadrupedibus foeteat TYSON ap. LEWTHERS abridg. II. p. 283. Simia moschum olens CARLI relat. d'un voyage. Fuerit simia Mandril BUFFON vol. XIV.

*) ROCHEFORT anrill. p. 224. CHARLÉVOIX S. Domingue I. p. 27.

**) ROCHEFORT ib.

*i**) Car. de GEER V. p. 64. huius odor digitis adhaeret.

alia (scarabaei species *i**) meloë violae odore *i***), formicae aliquae *i*†), insectum in hyofcyano habitans *i*††).

pag. 95. l. 13. *adde* Liceat interim de nonnullis peculiaribus et efficacibus odoribus aliqua praelibare, qui de animalibus spirant, deque homine. Bufones, serpentesque, quando irascuntur, alliaceum alii, alii ambrosiacum odorem spargunt; neque forte alia vis est, qua vipera caudifona bestiolas incantat, quae propius ad eam accesserunt.

Deinde etiam in homine moschatus odor nonnunquam percipitur; non raro in me ipso, cum mediocri et grato sudore leuiter maderem, eum percepi, tum in febribus ad crisin compositis.

p. 96. l. antepenult. *post* globulus *adde* suae naturae.

p. 98. l. 16. *post* exhalant *adde* In 24 semunciis aquae semunces 21 HEVERMANN.

p. 9. l. 2. *lege* Infra

ibid. l. 16. *lege* cum ad 118 sanguinis drachmas alii 117 drachmas aquae, alii non supra 8c habeant *).

p. 100. l. 9. *lege* supra 107 partes in 120 x).

p. 101. l. 9. *lege* ascendisse

ibid. l. 21. *lege* coëgeris

p. 103. l. 18. *lege* fere

p. 104. l. 17. *adde* Cl. SPIELMANNVS ab aqua non separatim reperit duplicem spiritum, debiliorem et fortiorem, effecisse in sanguine venae portarum fere $\frac{1}{18}$, in sanguine venae cauae $\frac{1}{34}$.

Tantam subtilitatem huius spiritus fuisse, ut de clauso vase totus evanuerit, VIEVSSENIVS in opere posthumo. Quod Cl. ROBERTI experimento paulum fidei addit, qui eandem adipi humano ad euaporandum facilitatem fecit.

p. 105. l. antepen. *post* aberrat *adde* SPIELMANNVS salis volatilis ammoniacalis in sanguine venae cauae reperit fere $\frac{1}{33}$, in sanguine venae portarum omnino $\frac{2}{33}$, sed haec ab alia portione salis fluidi fere compensantur.

p. 107. l. 11. *post* manifesta est *adde* ut mirer, potuisse negari *k**), cum serum inter,

*i**) FABRICIVS in *entomolog.* p. 72. et KOELREVTER p. 9. CASTELL.

*i**) KOELREVTER *inf. coleopt.* p. 42.

i†) LISTER.

i††) Aromatico odore BIRCH II. p. 483.

pag. 95 not. k) *adde* in opere *des maladies internes*, T. I.

*) Typographi error haud dubie hic subest, ego eos, qui in veteri editione prostant, numeros retinendos censeo. *Nor. edit. lui. auct.*

k*) Non magis, quam lympham, inflammabilem esse partem colorantem, BYTT, p. 51.

inter, et globulos repulsio locum habeat k**). Si globuli aegre cum oleo miscentur k***), figura eorum constantior ab oleo destrui noluerit, neque globuli se in tenacem liquorem perinde facile diffuderint, vt in aquam.

pag. 107. l. 18. *adde* Eiusmodi etiam ruber puluis in arteria viui animalis ex affecto sanguine nascitur.

p. 108. l. 10. *lege* septuplam

ibid. l. antepen. *dele* Partem $\frac{1}{2}$ sanguinis effecit in VERDV CII experimento d).

p. 110. l. 4. *lege* cohobetur *et adde* siue demum, vt nunc simplicius fit, bonum habeatur, cauendo vnice, vt primum, quod accendit, limpidum seorsim feruetur, id certe oleum, deposito cet.

p. 111. l. 17. *post* siue $\frac{1}{2}$ *adde* Ex sanguine venae cauae carbonis habuit $\frac{1}{14}$ idem, et ex sanguine venae portarum $\frac{20}{137}$ siue plus $\frac{1}{5}$

p. 112. l. antep. *post* eluunt *adde* Cl. ROUELLE natrum facit, siue minerale alcali, quod cum acido vitriolico salem mirabilem GLAUBERI constituit z*)

ibid. l. ult. *post* vestigia acido non in hominis verum folius sanguine, sed etiam in animalium succis, quae nunquam marino vtuntur sale.

p. 113. l. 12. *post* varietas fit *adde* STORMIVS $\frac{1}{60}$ reperit.

p. 116. l. 5. *adde* Cl. NAVIER spiritum etiam putrescentium partium animalis acida natura imbutum reperit.

ibid. l. 8. *lege* vitriolici aut proprii ingenii

p. 117. l. 9. *adde* Non dissimulari debet, Ill. SPIELMANNVM nullam acoris mentionem facere, quem in sanguine viderit

ibid. l. 12. *post* effervescit *adde* et cum spiritu nitri fumante.

p. 118. l. antepenult. *post* lumbricis *adde* in bombycum acri liquore

p. 119. l. 5. *post* WIDMER *adde* In carbone calcinati sanguinis ferri aliquantum SPIELMANNVS vidit.

p. 120. l. 3. *post* restituit *adde* De vitriolo cupreo dissoluto sanguis cuprum praecipitat quod non potuit, nisi ab admisto ferro, fieri.

ibid. l. 11. *lege* parcius

ibid. l. 12. *post* pitibus *adde* in oui vitello nulla (vti neque fixum alcali) e*).

ibid. l. antepenult. *lege* terrae ferreae

p. 121. l. 15. de aëre *lege* aër de sanguine

ibid. l. ult. *adde* In aliis etiam humoribus reperitur. Valde spumat in spatio inani

k**) Idem p. 50.

k***), Ibid.

z*) *Journal de Medecine, Chirurgie, Pharmacie* etc. 1773. Juillet.

e*) *De MACHY Instit.* T. I.

inani vrina et succus amnii; in albumine multus est; ex sanguine difficulter prodit MVSSCHENBROEKIO teste s*)

pag. 122. *Paragraphus quadagesima quinta in noua editione* Alia experimenta *inscripta est, et sic orditur*: Nuper postquam chemia nostro aeuo in Gallia propius ad perfectionem accessit, Cl. ROVELLE s**) iunior aliqua de vario sanguine docuit. Distinxit in carbone sanguinis natrum, siue alcali minerale, salem marinum, salem febrifugo SYLVII similem, terram animale, terram ferri, carbonem, alcali fixum, ea ratione, vt partes eius alcali essent 28. 29. ad salis neutrius 16 et 17.

Ex lixiuio obtinetur sal marinus, sal febrifugus, natrum, quod basis est salis marini. Post has lotiones in cineribus terra animalis est, carbo et multum puri ferri a reliquis elementis, et a terra animali separatum a magnete attrahitur, aut si renueret, attrahitur addito phlogisto.

Sanguis bubulus dat natrum, salem marinum, perpaucum febrifugum, terram animale, paulum carbonis, et ferrum. Portio alcali fixi aequalis portioni salis neutrius.

Sanguis equinus similia dat, verum salem febrifugum; alcali vero fixum, quam neutri sales copiosius, aequa cum marino copia, vt et 19. 20. ad 11. 12. fixi salis ad neutrum.

Sanguis vitulinus idem, sed sal febrifugus paucior; alcali fixi partes 14. 5, neutrius salis 11. 12.

Deinde peculiariter in ouillo sanguine sales reperit eosdem, paucissimum febrifugum, neutros sales aequales alcali fixo.

In sanguine porcino plus febrifugi salis, quam marini, et neutri sales aequales alcali fixo. Sanguis porcinus et asinus plurimum salem dant.

Sanguis caprillus carbonem habet difficulter calcinabilem.

Apparet animalia nullo vtentia marino sale, tamen eum in sanguine alere, cum nullum salem vegetabilem idem sanguis suppeditet. Neesse est ergo, vt vita animalis naturam vegetabilem totam mutet.

Apparet etiam, satis insigniter sanguinem diuerforum animalium differre, quorum tamen idem fere alimentum est.

Ex lacte equino verum inflammabilem cet.

ibid. l. 6. *dele* Elementum electricum in sanguine - - - pluuia inde lucida exit.

s*) *Introduit.* p. 88.

s**) *Journ. de medec.* etc. 1776. Iuillet.

SECTIO III.

SERVM SANGVINIS.

- Pag. 122. l. 12. *flauum lege subflauum*
 p. 123. l. 10. *post 551. adde* In Hibernia, humida insula, id pondus per febrem minus augeri auctor est Cl. R V T T Y, vt serum in febre sit partium in Hibernia 10369, in Anglia 10408.
 p. 124. l. 2. *lege* In sanguine cruorem, lympham coagulabilem et aquam non coagulabilem distinguimus o*)
 In sero aquam perpetuo etc.
 ibid. l. 22. *post 150. adde 160 y*)*
 p. 125. l. 7. *adde* Accuratus Cl. B V T T cogi filis exortis, et vna plurimum exhalare.

Angli nuperi duas in sero partes distinguunt, quae alio et alio calore coquantur, lympham, quae 114mo, 120, et 140 c*) gradu Fahr. coëat, et serum, quod 150, aut demum 160 c**).

Cum vero nullum aliud signum discriminis addant, videtur alia pars feri sanguinis plenior fuisse aqua et difficilior coagulabilis c***), alia vero gelatina magis abundasse, vt minori calore coierit c****).

Iam Cl. B V T T in eo sero partem aquosam, salinam et acrem distinxerat, a coagulo diuersam, quod insipidum sit c****), serum in fila concrefcere, non ita lympham c†), laxiori esse compage c††), et plurimum exhalare, a drachmis 25 ad duas cum semisse c†††).

Quae omnia videntur eo redire, vt serum pro lymphā habeat, aut potius feri partem c††††), a qua fibrae sunt, cum parte lymphae coagulabilis misceatur. Ita Cl. HEWSON. Serum suum idem cum lymphā facit Cl. B V T T c††††).
 pag.

not. r) et u) pag. 124. deleantur.

o*) B V T T p. 22

pag. 124. ad BOHNII nomen in textu lin. 9. adde not. p*) Materies albumini analoga

B V T T p. 96.

y*) Ita HOVLSTON, qui negat prius cogi aut gradu 150 inflam. p. 12. In feruida

LASSVS lymph. p. 8.

c*) HOVLSTON inflam. p. 12.

c**) Idem ibid.

c***) l. c. p. 53.

c****) lb. p. 87.

c*****) p. 26.

c†) Ibid. c††) p. 30. c†††) lb.

c††††) Ibid. c†††††) p. 33.

- pag. 125. l. 20. *lege* vt per solida vasa ruber cruor sibi vias aperiat *k*).
 ibid. l. 21. *lege* operculi,
 ibid. l. penult. *post* claudit *adde* In ligato ductu thoracico lymphæ viuo in animali in gelu consistit.
 p. 126. l. 10. in variolis *lege* in hæmoptoë *u***), in spasmō maxillæ,
 ibid. l. 11. in maligna febre *a*) *lege* in malignæ febris *a*), et variolosæ primis diebus, in ipsa etiam flaua febre, in phthisi, non alias pertinacior, vt etiam in quinquagesima venæ sectione crusta sanguini innatauerit, demum in hydrophobia *b*), in hominibus ab hydrargyri vsu saluationem patientibus *b**), in ipso scorbuto *b***) passim reperitur cet.
 ibid. l. ult. *post* abest *adde* et demum in sano homine *c**) non raro apparet.
 p. 127. l. 5. *post* crustam *adde* Sanguinem subito in locum valde frigidum missum crustam negat habere idem Cl. de HAEN. Sic etiam Cl. HAGVENOT in eadem venæ sectione sanguinem primum fluidum, alterum, tertiumque corio tectum vidit, inde denuo fluidum; et longe traiectum per ærem fluidum fieri. WEBERVS nullam nasci crustam, si paruum venæ vulnus fuerit *f**), aut sanguis lentemoueatur *f***), aut sanguis bacillo agitur *f****).
 ibid. l. 11. *lege* manifestis
 ibid. l. 12. *lege* partem
 ibid. l. 15. *adde* recte cum reticulata lymphatica placenta, in qua globuli stant, Cl. HEWSON.
 ibid. l. 16. *lege* Deinde valde probabile est, a vehemente cet.
 ibid. l. ult. *post* pulsus est *adde* tantum ne febris de genere sit putrido maligno, a qua *u**) crusta absit, et sanguis dissoluatur *u***).
 p. 128. l. 11. *adde* Manifesto demum mihi videtur, crustam pleuriticam serum esse, cuius vis attractilis ita aucta sit, vt serum ad serum vehementius adhaereat, a cruore minus trahatur *d***), quoad solum serum secedendo grumum deferat, et ex natura sua coagulabili in crustam consistat.

pag.

pag. 126 ad verbum idem in textu lin. 6. *adde* not. *e**) LIND *fever infect.* p. 283.*u****) *adde* WEBER *Auszüge aus Disputat.* I.*b**) LETTSOM *Dispens.* p. 215. WEBER *Auszüge aus Disputationen* I.*b***) *Medical Transactions*, Vol. II.*c**) BVTT p. 35.*f**) *Auszüge aus Disp.* I. CARRERE *inflam.* p. 61.*f****) CARRERE *ib.**f*****) p. 62pag. 127. not. *n*) a noua editione abest.*u**) KIRBY *febr. malign.* 1774. 4.*u***) *ibid.* p. 82. 83.*d***) LIND *fever infect.* p. 283.

pag. 128. l. 17. *adde* Verum paucis ab annis alia omnino sententia Anglorum Cl. DAVIES, HEWSONI, et aliorum e diametro priori contraria. Crustam nempe pleuriticam fieri a dissolutione sanguinis, quae ipsa sit inflammationis effectus. Attenuatam lympham globulos nunc male sustinere, ut secedant, fundumque petant. In homine debili cum ipsa debilitate corium pleuriticum augeri. Eo mollius esse sanguinis coagulum, quo plus corii secessit, quod eo referas, duriora lymphae, quam sanguinis, coagula esse *h**).

Ita cruor, qui sponte sua molliter cogitur *h**), nunc etiam mollior apparet, dum corium lymphaticum purum in tenacius coagulum abit.

ibid. l. penult. *post* cruore *adde* sed ex albuminoso liquore exhalante et membranae aquarum hydropicarum, et ligamenta vitiosa formantur, et MERRETI membrana oritur. Primus enim Vir Cl. partem sanguinis cet.

p. 129. l. 4. *adde* Liquor de cute exhalans, atque sub epidermide per vim emplastrorum veficas centium educus, in crustam saepe etiam coit, pleuriticae similem *h**).

ibid. l. 8. *adde* et ipse PETITVS.

ibid. l. 11. *post* crusta *adde* siccata in elasticam tenacem membranam *n**), et

ibid. l. 14. *adde* Eadem crusta, ne res coniunctas separemus, in aqua, et in aqua nitrata vix dissolvitur, utique vero in spiritu alcalino volatili, et in sale lixivioso fixo. Sponte etiam sua deliquescit in foetidum oleosum liquamen, quod tamen naturam ab igne, et ab acore meraco coagulabilem retinet *q**).

Puris a sero originem ita nuper deduxerunt Cl. viri, ut ex eo per putredinem generaretur, et sedimentum a sero puris simile subsideret. Contra ea Cl. HENDY a pure lympham suis notis distinguit; et mihi natura inflammabilis in pure nimis manifesta est, quae a sero et a pleuritica crusta abist.

p. 130. l. 1. *post* cogi *adde* in ligato ductu thoracico collectam sponte in gelu coivisse; susceptam de vasculo lymphatico

ibid. l. 5. *post* peritonaei *adde* etiam ventriculorum cerebri *b**).

ibid. l. 9. *post* sapor *adde* falsus, et natura ab acore densabilis et cum vini spiritu *b***).

ibid. l. ead. *post* sunt *adde* Albumen oui plurima etiam similia habet, minus tamen salsum

*h**) p. 71.

*h***) p. 77.

*k**) HEWSON inquir. T. II.

*n**) LIND fever infect. p. 283.

*q**) GABER misc. Taur. II. p. 92.

*b**) LASSVS p. 21.

*b***) Idem ibid.

falsum est, minus, dum cogitur, de suo pondere amittit; cum acidis eadem patitur *b****), neque a lymphâ coagulabili differt, nisi membranâ admixtis et mitiori natura. Siccatum in friabilem succini speciem mutatur *b*****), et crustae pleuriticae simillimum est *b******).

pag. 130. l. 11. *post* est *adde* et sponte in membranas praeter naturam coalescentes abit,

ibid. l. 13. *post* corrumpitur *adde* ut vel totum renuat cogi, vel certe eius pars aliqua ad ignem exhalet.

ibid. l. ead. *post* natura est *adde* Quin et ipse mucus cogitur, et asseruatus per putredinem naturam coagulabilem totam exsistit, aut minorem retinet. Plasticam tamen *d*)* indolem non continuo deponit, tunc etiam, quando foetet.

Video Cl. virum, quem plurimi facio, et merito, contraria omnino docere, ut pericardii humor in cancrum, et pectoralis vapor, et abdominis, ut recentissimus fuerit, totus exhalet *d***), iam demum cum tempore coagulabilis fiat, et per quandam degenerationem *d****). Verum nimis certum, et ab omnibus receptum, lympham, serum, sanguinem, adipem, humores omnes animales, nullo excepto, per putredinem naturam coagulabilem exsistere, inque fluidam aquae indolem transire; nimis manifesta est analogia liquorum exhalantium cum lymphâ; nimis certo ipse acore et vini spiritu eiusmodi liquores, et ipsum oui colliquamentum, in quo fetus natat, in caseum coivisse vidi.

p. 131. l. 4. Sed eadem est porro lymphâ *lege* Non omnino eadem est porro lymphâ,

ibid. l. 7. contra a frigore *lege* superueniente frigore,

ibid. l. 9. *adde* Hanc gelatinam ex carnibus, et ossibus extractam Cl. LASSVS experimentis subiecit. In frigore flexilis fit, et tremula, inodora, insipida, elastica, quae, exhalante aqua, in durum corium abit. In feruida soluta a solo spiritu vini cogitur; ab acido minerali soluitur, non ita ab oleo tartari. Multis adeo dotibus a lymphâ differt, admixto, ut puto, in ossibus oleo *m*)*. Et a sanguine gelatinam abesse, et a solidis, mireris Cl. BVTT *m***) excidisse, cum

*b****) BVTT p. 37.

*b*****) Bresl. Sammlung 1724. p. 27.

*b******) BVTT l. c. p. 29.

pag. 130. l. 11. *ad verbum* liquoribus *adde* not. *c***) LASSVS p. 21.

d)* De HAEN.

*d***) COTVNN. *ischias nervos*. p. 23. 24. 25.

*d****) p. 23.

pag. 131. l. 5. *ad verbum* impertit *adde* not. *k*)* Conf. BVTT p. 54.

m)* p. 17. *m***) p. 51.

cum ex solidis quidem partibus manifesto educatur, manifesto pariter lymphæ et sanguinis, et magnorum cautorum, in gelatinam sola ignis vi consistat.
pag. 132. l. 8. *post* accedat *adde* cum. acore ferueat, coeruleos plantarum succos in virides mutet,

ibid. l. 9. *dele* Dum putrescit - - - simile deponit *e*).

ibid. l. 11. totam exsui *lege* non continuo, etiam quando foetet *e**), sed tamen tandem totam exsui,

ibid. l. 12. *post* cogatur *adde* Per febres alcalinae naturae propius accedit, deinde foetet, et cum acore feruet, demum in corium abit insolubile. Cum syrupis coeruleis eo in statu virorem facit, et cum spiritu vitrioli feruet, equidem inter acidos liquores solo *e***).

p. 133. l. 2. *post* falsum fit *adde* inque febre flaua profunde flauum *p**).

ibid. l. 7. *post* recente *adde* cruore serum iam

ibid. l. antepen. Aliquanto minor *b*) in sero copia est diluti muci, qui *lege* Magna pars sanguinis in vniuersum mucus est, qui et cum lymphæ miscetur, et grumi portionem maiorem efficiat *b*), in sero dilutius mucus,

p. 134. l. 1. *post* dixerunt *adde* Sanguine bacillis agitato, absque aqua et frigore, fibrae vasis parietibus adhaeserunt *e***). Quare, si lymphæ coagulabili fibrae tribuantur *e****), de muco, eius lymphæ parte, intelligi debet. In ipsa etiam lymphæ aliqua ad fibrarum formationem adiuuandam, sed minor est aptitudo, si agitaueris; et vicissim ex sero virgulis agitato materies lymphæ similis separatur *e*†).

Hanc feri sanguinei partem suspicor ab Anglis a magis coagulabili lymphæ separari.

ibid. l. 6. *post* funditur *adde* Rete fibrosum, ramosum, cum multis particulis quadratis muriaticis sola exhalatione nasci vidit LEDERMÜLLERS *it*). Tardius putrescit, quam serum integrum *i**); ex cupro colorem coeruleum extrahit;

F 2

pag. 132. not. *b*) *adde* BVTT p. 33. COLLIN *de arnic.* exp. 4. MESNY apud TARGIONI III. Citius putrescere, quod rubore tinctum sit HENDY.

ibid. not. *m*) *adde* HENDY.

ibid. lin. 7. *ad verbum* foeteat *adde* not. *b**) Intra 2. 3. diem BVTT p. 26.

*e**) Nondum die 2. 3. BVTT p. 26.

*e***) LASSVS p. 12.

*p**) LIND *fever infect.* p. 198.

*b**) MOSCATI *nuove sper.*

*e***) MOSCATI, BVTT p. 4.

*e****) BVTT p. 30.

e†) BVTT p. 23.

it) *Mikroskop. Ergöz.* II p. 78.

*i**) BVTT p. 57.

hit; ab alcali fixo contrahit odorem salis volatil*i***), et ab acore vitriolico admixto muriaticum odorem spargit secundum Cl. BVTT de suo sero i***) dicentem, quae, puto, ad mucum pertinent. Verum de muco alias fufius dicetur.

pag. 135. l. 1. nitri oleo lege nitri spiritu

ibid. l. 5. *post* resoluitur *adde* et cum calcis aqua x†), et cum alcali volatili x††), et ab alcali caustico x†††).

ibid. l. 11. *post* meraco *adde* et minerali b†)

p. 136. l. 10. *post* dissolvit *adde* et corium pleuriticum.

Albumen, caseum ab oleo tartari solui LEVRETUS, hinc impedire, ne albumen coctum durefeat; chalazas vero indurare, quod improbabile. Albumen cum acore vitriolico feruere et cogi; etiam cum succo citri nasci filamenta; in alcali volatili difficulter solui LASSVS r†).

p. 137. l. 6. *adde* Lympha de vasīs suis secreta ab acore meraco parum cogitur.

Aquae abdominalis similes omnino sunt dotes, plus tamen creditur habere partium gelatinosarum et in corium transeuntium.

p. 138. l. 18. *adde* Liqueorem flauum, in quo oleum nigrum empyreumaticum, et acor; tunc alcali volatile ascendere; carbonem porosum superesse; eum ex lixiuio dare salem subfoetidum; caput mortuum cum acido non feruere LASSVS.

ibid. l. 22. *adde* Cl. ROVELLE, abacta aqua, de sero sanguinis siccam fragilem massam vidit superesse; in ea natrum reperit, et cum acido vitriolico Glauberianum salem composuit.

ibid. l. 24. *post* repertae *adde* vel concrementa salina feri sanguinis

ibid. l. ult. *adde* Salem marinum exhalando natum diximus r****).

pag.

i**) BVTT p. 57.

i***) p. 55.

x†) LASSVS p. 9.

x††) Id. ibid.

x†††) BVTT p. 27.

pag. 135. not. r) lin. 1. *adde* LASSVS p. 89.

ibid. not. b) *adde* Leuiter cogi cum acido vegetabili LASSVS.

b†) LASSVS p. 8.

c) *adde* BVTT p. 26. et at vitriolo.

g) *adde* Solui partem maiorem a acore vitriolico BVTT p. 26. ab acore salis non cogi

Id. p. 27.

pag. 136. not. n) *adde* TARIN.

r†) p. 14.

z) *adde* Fortius, quam alia BVTT p. 28. et durefcit.

a) *adde* LASSVS p. 9.

r****) LEDERMÜLLER II. T. 78. *Mikrofk. Ergöz.*

pag. 139. l. 21. *adde* Serum putrescens absque intestino motu naturam generat alcalinam, vt die trigesimo spiritum foetidum alcalinum fundat z†), totum ipsū alcalinum z†).

ibid. l. ult. *lege* aut potius maiorem, *et adde* Serum minus putrescere d*), minus dare alcalini liquoris d*.*).

SECTIO IV.

ELEMENTORVM SANGVINIS PROPORTIO ET VTILITAS.

Pag. 140. l. 8. *post* praeterea *adde* phlogiston et
p. 142. l. 2. *post* sublata sunt *adde* Alterum certum plethorae exemplum est in hominibus, quibus magni artus amputati fuerunt. His enim, cum ventriculus et viscera ciborum coctioni destinata nihil passa sint, plus sanguinis generatur, quam in receptaculo sanguinis, siue in vasorum vniuersitate possit contineri. His frequens est necessitas venae sectionis, et dissiliensium vasorum periculum.

ibid. l. ult. *dele* cor magnum

p. 143. l. 11. *post* indoles *adde* et meticulositas, et teneritudo

ibid. l. 12. *post* superuenit *adde* et frequentia exempla febricitantium, scabiosorum, scorbuticorum, etiam hecticorum, victu vegetabili refututorum n*)

ibid. l. 19. *adde* et stupiditatem inoculatum venenum febrile superauit.

Acrimoniam variam, etiam muriaticam, in nostris humoribus BOERHAAVIUS agnouit. Et videtur certe victus falsus in scorbuticis acrem sanguinem generare, putredine equidem admista corruptum. Acris sudor fuit, et retenta vrina, cum falsus humor in sanguine nimium abundaret, qui solebat per renes deponi. Acrimoniam falsi nimii, equidem medicati, me in me ipso percepisse, alias retuli.

ibid. l. antepen. *dele* sudor et aqua, *et lege* vberior vrina

F 3

pag.

z†) COLLIN de arnic. p. 9.

z††) LASSYS p. 12.

d*) COLLIN exp. 15.

d**) Id. exp. 16.

pag. 140. lin. ult. ad verbum fluat *adde* not. p*) Journal de Medecine 1771. Iuin.

n*) Phthisis antiqua. BAEK chron. sjukdom p. 16. pane triticeo et lacte solis scorbutus Med. Trans. T. II. le roi de scorbuto.

pag. 144. not. s) *adde* Journal de Medec. 1770. Iuin.

pag. 145. not. c) *spektat* ad verbum expurgent in textu lin. 18.

pag. 146. l. 17. ad verba auctum est in textu *adde* not. h*) Vide Lib. XXX.

pag. 143. l. ult. *adde* Lympha tenuior in cane sola aqua et pane pasto, experimento a RIVINO facto.

p. 148. l. 12. Sed etiam aegre aliqua - - - cum timidissima oue conueniat *lege* Eodem cum pabulo diuersa animalia, herbiuora omnia sanguinem alium, et alium generant p), csi discrimen vix oculos attingit.

ibid. l. 22. et aut ab opio *lege* aut ab opio enecta s**) nullum in mamma cancrofa, inque carne bubula subiecto igne torta

p. 149. l. 16. *lege* cum plano eam secante

p. 150. l. 1. *post* coniungitur *adde* Etsi enim ante rubri sanguinis ortum cor mouerinon negauerim c*), certum tamen est, multo alacrius idem salire, postquam sanguinis is color est c**); certum etiam, cum ea sanguinis dissolutione, quae a febribus sequitur, magnam virium diminutionem coniungi.

ibid. l. 9. *post* nascitur *adde* Indis carnis victus expertibus, debilibusque in summo coeli aestu manus perpetuo frigent d*)

p. 151. l. 13. *adde* Non oportet hic dissimulasse, dari rubri sanguinis cum robusta febre coniunctionem, quae temperamentum pariat athleticum; dari vero et alium rubrum sanguinem, quem putes a solo oleo attenuato floridum reddi, et cum debili fibrarum vitio coniungi. Hyftericis feminis sanguis floridus, et tamen parum est virium, vt sanguinis missio noceat n*)

p. 152. l. 16. *post* eam *adde* aquam

ibid. l. 22. *adde* Denique satis nunc consentitur, ruborem sanguinis a ferro esse. Plurimum vtique ad calorem confert oleum, siue cet.

p. 155. l. 11. *post* constituunt *adde* et per pulmones, et per cutem,

p. 156. l. 14. *adde* quam naturam alcalinae vicinam, sponteque in putredinem vergentem, nuperorum Cl. viroorum, et principis BECCARI, olim nostri praefidis, industria in farina cereali detexit.

ibid. l. 19. vt tamen in hoc exemplo - - - huic gelatinae accedit o) *lege* mucoso-gelatinosam materiem ex rapa et brassica plurimam haberi Cl. THOVVENEL o), et alioquin a mucō ad lympham gelatinosam non maxima est diuersitas o**).

ibid. l. penult. *adde* in adipe omnium potentissima p*). Oleum tamen empyreumati-

p) ROUELLE p. 212. 213.

c*) R. COCCII *lezion. fis. anatomiche.*

c**) CHIRAC *aduers. anat.* p. 320. Negat prius moueri.

d*) IVES *Reis.* l. p. 86.

n*) FASAN. *fibr. epid.* p. 213.

o) Idem ibid.

o*) BVTT p. 61.

p*) HEWSON *inquiries*, p. 127.

reumaticum animale cum vegetantium empyreumatico oleo non vndique conuenire NEWMANNVS monuit, vt istud quidem ad coeruleum Berolinense parandum ineptum sit *p***). Nam oleum animale vtique paulo minus acidum esse suspiceris, et cum vberiori sale alcalino volatili subactum.

pag. 157. l. 12. *post* suppeditat *adde* Sic succi animales longo vitæ vsu per vasa circumacti, alcalinis eo propiores fiunt, quo in duriores partes coierunt. In succis animalium acoris est vestigium; nullum in ossibus, aliisque firmis partibus. Sic mira metamorphosi e vegetabili victu animalia tamen minérale alcali pro basi salis neutrius in sanguine dominantis parant *t***).

Phlogisti in naturam electricam transmutationem tetigimus *t***).
ibid. l. antepen. *lege* Ea terra ex vegetabilibus recepta,

*p***) T. I. P. 2. p. 350.

*t***) vid. Sect. II. §. XL.

*t***) vid. *Auſtar.* ad Lib. V. Sect. II. §. IV*. p. 20.

ELEMENTORVM PHYSIOLOGIAE

LIBER SEXTVS.

ARTERIARVM ET VENARVM OFFICIA.

PRAEFATIO.

In libro, quem hic offero, plurima ratiocinia sunt, experimentorum aliquantum. Prioribus detrahere maluissim, quam addere quicquam; minus enim illae BELLINIANAE theoriae valent, quibus in Anglia mascula et hypothesebus pene libera consilia ad medendum successerunt, felici certe rerum conuersione facta. Alibi confusa theoria dominatur, in qua exclusis certissimis experimentis occulta potestas substituta est, et euidenti sensuum testimonio semiuerae obseruationes praeferuntur; eodem tempore, quo iidem medici clamant, debere bonam artem omni hypothese liberam tradi.

Quae in hoc libro, et inprimis in hac editione aucta extant, ea hic breuiter recenseo, vt, quid lector sperare possit, facilius perspiciat. Retardationem sanguinis in vasis minoribus minorem esse per experimenta reperi, quam ex calculis positis sequatur; aliquam tamen esse non repugnat. Cur autem experimenta a calculis dissideant, partim in minori efficacia causarum retardantium quaeri debet, partim in noua subnata velocitate. Eo vis contractilis arteriae hactenus pertinet, vt certe compenset motus progressiui iacturam, qui in lateralem abierat; de progressiui enim motus velocitate quaeritur. Vim deriuationis pene nouam, praeter HEYDII experimenta, hic exposui. Deinde atriola mortis ad phaenomena manantis sub microscopio sanguinis descripsi. Ea vir alioquin Ill.; qui pleraque mea pericula suis confirmauit, negat se annotasse. Reperio autem, et ipsum vidisse, et me toties repetiisse, vt dubium omnino nullum mihi de his moris nuntiis superesse possit. Motus in sanguine post mortem animalis, cordisque quietem superstitis causas et phaenomena addidi.

Inde pressionem lateralem, per experimenta euidentia, a WEITBRECHTI, aliorumque dubiis vindicaui. Hic idem pulsus est, cuius phaenomena et mensuras, numerosque inprimis, pro varietate humanae conditionis varios, ad mea aduersaria recensui. Nimias illas pulsus frequentias non potui cum meis experimentis conciliare, deque *Theophili de BORDEV* nuperis pulsibus malui ampliare. Inter effectus motus sanguinis potissimum calorem recensui, quem
cum

cum multi nuperorum ad chemica phaenomena referant, ego quidem potissimum ab eo motu oriri, libratīs vtriusque causae argumentis, persuadeor. Ad ruborem etiam facere non dubito, etsi in ipsis etiam sanguinis elementis eius coloris causa ponitur; neque haecenus video, aëri posse acceptum referri.

Demum venosi sanguinis motum, vndique neglectum, etiam ab latromathematicis, ad experimenta descripsi, et lateralem pressionem a venis non abesse ostendi. In eum motum magnam esse potestatem deriuationis reperi. De ea vero eiusdem perturbatione, quae a respiratione pendeat, iterum experimenta mea retuli, iustoque dolori aliquot paginas dedi, quem non pati non potui, cum viderem, me post tot mea experimenta plagii postulari, aut certe ad repetitores alienorum laborum relegari. Res ipsa considerari meretur, etsi in viuo homine vix vnquam locum habet, cum *Schlichtingiana* illa cerebri turgescencia, et alterna inflatio, duram matrem a cranio solutam, aliasque conditiones poscat, quae a viuo homine absunt. Celeritatem sanguinis venosi ad arteriosi sanguinis velocitatem comparatam me facillima mensura metiri posse speravi, cum sit non dubie in ratione inuersa luminum venarum cauarum ad aortae lumen. Denique cur venae alterno motu non agitentur, conatus sum exponere.

Bernae, d. III. Mens. Sept. clobcccLXXVII.

SECTIO I.

SANGVINIS MOTVS, QVI AXIN SEQVITVR ARTERIAE.

- P**ag. 158. l. 2. *lege* perfici
 ibid. l. 16. *adde* Ita vero velim, dum ista tracto, legi, vt potius studium mihi fuerit non omittere, quae alii clari viri proposuissent, quam quidem ea docere, de quibus aliquid certi ipse statuam.
 p. 159. l. 14. *post* BOISSIER *adde* quarta parte reliqua aorta latiore esse alii clari viri.
 ibid. l. 17. *lege* quem tumorem
 ibid. l. 20. *post* vidi *adde* In pullo, qui ouo continetur, haec amplitudo adeo memorabilis est, vt eam ipsam MALPIGHIVS pro sinistro ventriculo habuerit.
 p. 160. l. 21. *lege* Ea

pag.

pag. 159. not. c) lin. 3. *adde* in spinosis VICQ D'AZVR, *Memoir. prés.* VII. p. 30.

pag. 160. l. 23. *adde* Ita in adulto homine; nam in fetu arcus aortae magis transversus est.

p. 161. l. 1. *post* nacta sit *adde* Imum crus ad originem aortae inclinatur, vt ea sede arcus minor sit latitudo.

ibid. l. 14. *adde* In equo vnus ramus, isque maior et capiti prospicit, et brachiis, alter arcum facit, idem minor x***)

p. 162. l. 4. *post* nascitur *adde* aut subclauia sinistra, pariter vt dextra, communem cum carotide truncum habet; aut vnus duarum carotidum, et vnus pariter duarum subclauiarum truncus est. Alias hoc ordine prodeunt: carotis dextra, sinistra, subclauia sinistra, arcus aortae d*). Sed et arteria thyreoidea, aut thymica d†) ex aortae trunco d††) prodiit; alias aorta, insula facta e), duplicatum cet.

p. 163. l. 13. *adde* Sed lego etiam in plusculis animalibus dextram subclauiam maiorem esse.

ibid. l. penult. *lege* maiorum propaginum vltima t).

p. 164. l. 9. *lege* compositus motus

p. 167. l. 19. *dele* Verum Idem propriam - - - per experimentum constitit t).

ibid. l. 25. *lege* Globulus tamen ruber axin tenebit, et longius etc.

p. 168. l. 12. *dele* Nunc, in exemplo, globulus - - - globosae figurae partes.

p. 169. l. 2. *lege* virorum

p. 171. l. 2. *lege* tympani membrana

p. 172. l. 25. *post* enim *adde* calor humidus.

p. 173. l. 15. *post* mutatur *adde* Haec enim omnia et in viuus animalibus vidi, et iniectione, quam vocant, arterias manifestas reddit, inque serpentinos flexus contrahit.

p. 176. l. vlt. *lege* effluit

p. 177. l. 13. *post* diminui *adde* Vidit eadem Cl. SPALANZANVS.

p. 178. l. 18. *adde* Non debet autem certa mensura recipi portionis celeritatis, quam a frictione liquor quicunque amittit. Haec enim omnia ex leuore,

vel

x***) La FOSSE Hippocratique.

pag. 161. not. z) lin. 5. *adde* HYBER saepe; l. vlt. *adde* Ita et HYBER tantum vt con-

uant p. 73.

pag. 162. not. a) *adde* Bis vidit Ill. HYBER Ast. Heluetic. VIII.

ibid. not. f) *dele* Arteria thyreoidea - - - n. 7. p. 28. — lin. vlt. *adde* Duae carotides ex eodem trunco ERDMANN l. c. p. 5. 16. Nullus arcus aortae FOHL *obs. angiolo. de arr.*

d*) FOHL de arteriis. d†) MECKEL ibid.

d††) ERDMANN *arter. thyreoid.* T. II. f. 2. NICOLAI *diff.* n. 7. MECKEL ad me III. n. 141.

pag. 174. not. p) *adde* SCHREBER et MAK de comparatiua sanguinis in diuersis vasis velocitate.

vel asperitate vasis, ex figura et longitudine, ex rectitudine et flexione eiusdem, ex visciditate, aut limpiditate fluidi, ex celeritate impressa, et ex ponderibus incumbentibus mille modis alia fuit, aliaque.

pag. 179. l. 13. *lege* admireris

ibid. l. 16. *adde* Hinc, ceteris paribus, quo remotior quaeque pars corporis est a corde, eo lentior est motus, eo promptius restinguitur; et ex ipsa ratione distantiarum a corde ostendemus, sanguinem in moribundis in pede primum, inde in femore, porro in abdomine, demum prope cor motum amittere.

p. 181. l. 2. *lege* paulo post dilatationem,

ibid. l. 15. *adde* Additur, minores arterias magis serpentino ductu ferri *m**)

ibid. l. 18. *post* tubis *adde* qui sint minimi,

p. 185. l. 8. *post* esset *adde* Gigantissae *Magrath* pulsus non fuisse supra sexaginta lego.

p. 189. l. 23. *lege* innumerabilibus

p. 190. l. 6. *adde* Fuit, qui eum effectum reiecit, quod globuli sanguinei elastici sint. Verum is elater cum magna duritate coniunctus nondum demonstratus est, neque ab indole pingui globulorum expectari potest.

ibid. l. 13. *post* sanguinis *adde* progressuus

p. 192. l. 4. *lege* adhaereant.

p. 195. l. 12. quae in calidis - - nequeunt *lege* quae in pullis ovo contentis utique institui possunt,

ibid. l. 19. alio *lege* alterne

p. 196. l. 5. *lege* nullique

ibid. l. 17. *adde* Paruum etiam discrimen esse, quo velocitas sanguinis truncos percurrentis sanguinem per ramos fluentem superat, SPALANZANVS repetito experimento docuit; inque ipsis venis alias aequalem celeritatem vidit arteriae suae, alias parum minorem, ut per systolen cordis arteriae superare viderentur, per diastolen venae. Neque dissimulari debet, ut certo plicae videantur sanguinis motum tardare, in venis tamen teneri pulmonis animalium sanguinem expedite fluxisse *n**)

ibid. l. penult. *post* sanguinem *adde* in catellis

p. 197. l. 3. *adde* Carotidis arteriae saltum ad septem pedes Cl. FRAIRIOT aestimat.

ibid. l. 23. vnice *lege* tamen

ibid. l. ult. cuius *lege* qui,

*m**) Ill. SCHREBER de compar. sanguinis in diu. vasc. veloc.

*n**) SPALANZAN. p. 59.

pag. 198. l. 4. trunculorum *lege* trunculum

ibid. l. vlt. *adde* in arteria, quae in venam transit.

p. 199. l. 3. ostendimus *lege* probabile est

ibid. l. ead. *post* superesse *adde* in viuis tamen animalibus microscopium eam potentiam non confirmat; vt neque coaguli efficaciam

ibid. l. 12. *lege* Neque tamen interim dissimulo,

p. 201. l. 10. *adde* Periculose sanguinem in venam cauam inferiorem subito irruere, quando aquarum hydropicarum comprimens pondus per paracente-
sin ablatum est, dudum est ostensum.

ibid. l. 24. *post* retardari *adde* Simillima horum Cl. SPALANZANVS vidit, fa-
vente pondere velocitatem in pullo auctam fuisse, qui ouo continetur; et
vicissim alias celeritatem a ponderis resistencia diminutam. In minimis etiam
vasis discrimen vix percipi posse *Idem*.

p. 204. l. 3. quatuordecim *lege* triginta tres

p. 205. l. 23. *lege* subsultantium

ibid. l. 27. *post* velocior *adde* Et si aliquando conuulsio a laesa, aut resecta spi-
nali medulla paulum sanguinis motum turbauit, quae etiam Cl. SPALAN-
ZANI est annotatio, breuis tamen haec fuit confusio, et continuo in ordi-
nem rediit p**).

p. 206. l. 12. *post* mutantur *adde* debiliter utique, cum pauci nervi plurima
cellulosa tela tegantur.

ibid. l. 24. hic tamen multa --- carere non potest *lege* nempe contractilem vim
in arteria certam inesse; in ea vi aliquas esse partes meri elateris, qui a vita
non pendeat; aliquas videri fibrarum esse muscularium, neque nulla proferri
experimenta, quae etiam irritabilem naturam arteriis inesse suadeant, quam
efficax stimulus scintillae electricae excitat. Inesse denique vis nervosae tan-
tum, quantum a tenuibus fibris, et tenerimis nervis expectari potest, quos
plurima cellulosa tela velat.

Deinde arteriae quaecunque sit vis contractilis, primas tamen cordis esse,
et ad eius contractionem sanguinis motum pertinere. Nunc, quis sit in pro-
mouendo sanguine contractae arteriae effectus, oportet disquirere.

p. 207. l. 2. mere *lege* mire et *post* intumuit *adde* inque varicem abiit, in qua
arteriae pulsatio percipiebatur

ibid. l. antepenult. fit *lege* cogitari debet

p. 208. l. 9. *lege* Sed ea celeritas in sanguine posterius in sequente maiori ra-
tio se decrescit perpetuo, donec cet.

p**) Sed confer lib. IV. p. 465.

pag. 209. l. 11. ad verbum edit *adde* not. i*) FONTANA ricerche, p. 103.

pag. 209. l. 3. quem *lege* quam

p. 210. l. 1. *post* arterias *adde* laesas.

ibid l. 22. *adde* Sed neque Cl. SPALANZANVS in minoribus animalium vasis vllam contractionem vidit, aut dilatationem.

p. 214. l. 9. *post* dominari *adde* dictum est *et dele* vel ex iis exemplis - - - et inde natae maculae e).

p. 215. l. 14. *post* demferis *adde* Haec phaenomena omnia perinde vt ego, ita Cl. vir Laz. SPALANZANVS vidit, causam perinde mecum ignorat.

p. 216. l. 20. *post* excitatur *adde* In frigidis nostris animalibus concussio ab irritata medulla spinali nata, solebat sanguini languenti aliquam velocitatem reddere.

Vasa rupta a yehementi nixu passim reperias apud SMETIVM. Sudor inde sanguineus. CAROLVS XI, cum amico ab vrsio periclitanti subuenire properaret, venam sibi rupit s*).

p. 218. l. 7. aliquis *lege* aliqua pressio

ibid l. 8. quoties *lege* quibus

ibid. l. 19. *post* increfcunt *adde* dum frequentius et validius a sanguine venoso irritatur.

§. XLI*. Tonus.

Hanc causam motus possis addere ex STAHLII potissimum theoria. Humores nempe Cl. vir putabat non a solo corde regi, sed a constrictione spastica liberum commeatum impediende fieri, vt humores in partem ab anima destinatam colligantur. Eum enim motum non posse viribus arterioso sanguini communicatis tribui d**).

Comparari posset effectus balnei frigidi, in quo eiusmodi conuulsio vniuersae cutis, forte et musculorum locum habet. Ab eo enim balneo sanguinem in caput et cerebrum congeri, et apoplexiam non rarissime fieri, notissimum est. Haemoptoë inde et vniuersalis suffillatio d***).

In hypothesi STAHLII veri quid superesse non recuso: si nempe pars cellulosae telae aliqua durior, et ad elaterem et contractionem aptior, alia laxior, ad distentionem pronior fuerit: nihil repugnat, quin lente quidem, sed tamen perpetuo, pars illa prior se sanguine venoso depleat, arterioso a corde aduenienti

G 3

resistat,

pag. 210. not. n) *adde* LISTER *Journ. 10 Paris.*

ibid. lin. 19. *ad verbum* possant *adde* not. r*) Lib. II.

s*) ROBINSON ibid.

pag. 218. l. 18. *ad verbum* ostendemus *adde* not. d*) Lib. XI.

d*) Morb. spasmod. 17. etc.

d***) LIMBOVRG bain de l'eau simple.

resistat, vt deinum ex lege deriuationis, humorum pondus in eam corporis partem ingruat, in qua maior partium solidarum laxitas est.

§. XLI**. *Noua dubia.*

Haec cum scripſissem, morbusque meus aliquas fecisset inducias, vt limpidiori mentis vsu fruerer, denuo visum est, rebus rite expensis, ne in his quidem causis scaturiginem esse nouae celeritatis. Non in deriuatione rara et quae tamen latens videatur esse tonica contractio. Non in contractili vi, mortua, insita aut neruosa. Hae enim vires omnes in subsidia quidem arteriae sanguinem comprimunt, eius motui progressiuo addunt. Verum omnes eae causae in tempusculo paulo priori eandem celeritatem perinde, et eadem portione diminuerunt, vt nunc augent. Contra vim nempe cordis sanguinem agentis, arteriae vis contractilis quaecunque se habet, vt contraria potestas. Eam cordis vis superat, sed vt superet, impendit vim aequalem praesenti vi contractili arteriarum. Erit adeo celeritas superstes sanguinis $c - a$ (cordis celeritas diminuta contractione arteriosa). In proximo tempusculo autem contrahitur aorta ad eandem diametrum, ex qua per vim cordis dilatata fuit. Celeritas ergo sanguinis est $c - a + a$, nempe ipsa celeritas cordis nihil mutata, nisi portiuncula aliqua exigua vix definienda, quam frictio absumsit.

Quod ad musculos pertinet, eorum actio non penitus nihil poterit in celeritate sanguinis augenda. Venosum nempe non dubie sanguinem incitant, et pressionem suam vnice contra cor dirigunt. Ducentibus valvulis sanguis ad cor celerius redux irritat id organum intra idem tempus, et pro ratione molis potentius et frequentius. Noua ergo hic vis subnata est, quae prius nullā adfuit. Aliquam quidem partem huius compressionis valvulae absumunt, non tamen totam, tum experimento teste, et euidente caloris atque pulsus augmento per motum musculorum subnascente; praeterea columnae succedentis sanguinis valvulas sustinent, ipsaque figura cuiusque venae facit, vt pressio sanguinem facilius versus canalem maiorem agat, minus vero contra angustam sedem venae repellat *d*****).

pag. 218. l. 29. *adde* Cum plurima mecum verissime *Lazarus SPALANZANVS* viderit, valde miror, virum clarissimum haec mortis atria reiicere, quae ego adeo manifesto, adeo frequenter vidissem *d†*).

Mirabar merito, ipsum enim Cl. virum omnia, quam ego, pariter vidisse manifesta sunt testimonia *d††*).

Quare

*d*****) Lib. III. *d†*) Negat autem *fenomen.* p. 309. 312.

d††) Lentius moveri vidit *fenom.* p. 104. *Morbus sanguinis* p. 37. Oscillare p. 27. 53. 76. 225. 302. *Mot. sangu.* 25. 33. quiescere et in motum redire *fenom.* p. 27. 163. 221. *Mor. sangu.* p. 22.

Quare nihil in situ vitii fuerit, in quo animal speculatus sum; cur enim aliis in phaenomenis, quae L. SPALANZANVS suo assensu confirmat, similia eorum vidissem, quae vir Ill. vidit?

pag. 219. l. 11. *post* ostensum est *adde* Vidit in canibus Cl. BOISSIER *h**).

ibid. l. 15. *adde* A retrocessione fit, vt in moribundis exteriora frigeant, et absque pulsu sint, dum prope cor calor superest, et pulsatio aliqua.

p. 220. l. 6. motu *lege* sanguine

ibid. l. 10. *post* redditur *adde* Vtiliter Cl. ROUVRET in moribundo vidit, primum pulsum defecisse in poplitis arteria, deinde etiam in radio, dum formicatio in corde supererat; et ea ipsa denique pulsatio morientem, deseruit *p**).

ibid. l. antepenult. In GVILIELMO III. --- sanguis fuit *lege* Vasa ex febris hecticis, ex ciborum defectu, ex diabete, aliisque causis inanita passim legas, et arteriam cuniculi exsanguem, cum ossa facta esset.

ibid. l. ult. *adde* Sed ea dicta sunt *x**).

p. 222. l. 15. *adde* Vidit et SPALANZANVS.

p. 223. l. 6. *post* dissolutus *adde* Die a morte tertio de vena incisa sanguis fluxit *d**).

In febre remittente haemorrhagiae spontaneae, non criticae, vt etiam a morte sanguis efflueret *d**).

Sudoris a morte erumpentis, lymphae de vulnere veficatorii manantis exempla legas.

ibid. l. 14. *adde* Neque alia causa fuerit celebris illius cruentationis cadaueris, quam aui nostri ad contactum homicidae superuenire, et reum hominem accusare persuasi fuerunt.

Idem aer potest etiam in cellulosis telis *g*+), quae vasis circumponuntur, expandi, inque magnis caueis, et viscera, atque vasa vrgeret. Hinc tumor cadauerum a morte, et natura natatilis. Inde forte ab aere abdomen distendente, laxatis nunc fibris vteri, infans post mortem de matre expulsus fuerit *g*+).

*h**) *Nofolog.* IV.

*p**) *Du poudr.* p. 242. 243.

pag. 220. *lin.* 12. *ad verbum* vidi *adde* not. *p**) Fusius dicitur in Sect. II.

*x**) p. 225.

*d**) *Eph. Nat. Cur. Decur.* I. ann. I. *obs.* 50.

*d***) MILLAR *diseases*, p. 72.

g†) *Conf. Journ. de medec.* 1765. Iuin.

g††) *Lib.* IV. p. 467.

S E C T I O II.

P R E S S I O L A T E R A L I S . P U L S V S .

Pag. 225. l. antepenult. *adde* Omitto, aliam quae interpretationem patitur, inanitatem vasorum in cadaueribus non raram, potissimum post longos morbos.

p. 226. l. 7. *post* plenum sit *adde* quae etiam Lazari SPALANZANI est sententia.

p. 228. l. 9. *post* progrediantur *adde* Quae omnia in suis salamandris Lazarus SPALANZANVS, perinde vt ego in ranis, vidit.

p. 230. l. 3. *adde* Haec arteriae in longitudinem productio etiam in iniectione, quam vocant, anatomica evidens est. In viuus animalibus adeo conspicua est, vt nuper Cl. viri eam dilatatione manifestiorem fecerint, Cl. IADELOT, ARTHAUD et LAMVRE, tamen vt eorum primus mecum fateatur, euidentiore esse in arteriis curuis, in rectis obscuriorem, vt destructa curuatura eleuationem carotidis destruxerit.

p. 230. l. ult. *adde* Alibi equidem de hac quaestione egimus. Repetere tamen oportet, vtique arteriam ligatam non tumescere, et ab ea sanguinem fugere, quoties in vicinia rami sunt, per quos sanguis effugium inueniat. Quoties vero arteria absque ramis est sub vinculo editis, toties vtique, et vehementissime arteria ligata tumor, vt apparet, si in quocunque animali aortam supra cor ligaueris. Nunc in nostro exemplo, cum in omnes, eodem tempore, arterias noua sanguinis vnda incumbat, nusquam locus erit inanis, quo se impulsu ea vnda recipiat, et necesse erit, eam spatium sibi parare in aucta arteriae cauea, quam et in longitudinem producit, et in latitudinem. Sed etiam arteria tibialis viui hominis ligata in aneurysma intumuit c*).

p. 233. l. 14. *post* nempe *adde* quoad

ibid. l. 15. *post* aperit *adde* Pressio enim lateralis est aequalis quadrato orificiis arteriae liberae, diminuto quadrato orificiis arteriae obstructae, atque adeo tota pressio in lateralem abit, quando arteriae liberae area nulla est.

pag.

pag. 226. *dele* not. e).

c*) *Med. Mus.* l. n. 4.

pag. 231. not. e) *lin. 10. adde* MOLINETTI, RIVA *Eph. Nat. Cur. Dec. I. ann. I.*

obs. 18. TARGIONI *Raccolta II. p. 122.*

ibid. not. f) *adde* PLEVIER *officior. praeternatural. p. II.*

ibid. not. h) *lin. 2. adde* MORGAGNI *de sedib. et caus. morbor. III. 83. — lin. ult. adde* In

abdominali aorta MORGAGNI l. c. GENGARAR. *chir. p. 92.*

pag. 232. not. k) *lin. 1. adde* MORGAGNI *de sed. et caus. morb. I. p. 276.*

pag. 233. l. 16. *post facta est adde* In spina ventosa arteriae dilatantur *q***), et vulgo in tumoribus cysticis.

p. 234. l. 4. *dele* Mensuram pressionis lateralis - - - pressionis mensura sit.

p. 235. l. 17. *post impediueris adde* per priora.

p. 238. l. penult. *Poteft autem pulsus* - - - aut a coagulatione *lege* Olim ita Cl. viris visum est, et nuper in multis experimentis Cl. IADELOT, ARTHAUD, LAMVRE, in nonnullis etiam Cl. PORTAL.

Verum et ego vidi, in ouium potissimum mesentericis vasis, et vidit Cl. SPALANZANVS utique arterias verissime dilatari, euidentiùs in animali robusto, in vase magno, et in aorta, obscurius in debili, et in paruo vase. Merito monuit Cl. COLOMB in *Antonii PORTAL* experimentis tunc euidentiùs, arteriam loco moueri, quando dilatatio obscurior est. Facile enim apparet, nouae vndae sanguinis spatium esse parandum, id si in longitudine aucta paratum fuerit, eo minus latitudinem iri mutatum.

p. 239. l. 16. *adde* Nuper Cl. SPALANZANVS annulo circumiecto arterias in flexionibus ad tertiam vsque partem dilatari vidit, arteriam pulmonalem salamandrae etiam ad dimidiam; plus equidem in principio, in progressu minus.

ibid. l. 25. *lege* diameter

p. 240. l. 5. *lege* crescat

p. 241. l. 8. *post aliquis adde* fuit. In abdomine nullus *d****).

ibid. l. 12. *lege* percutitur

ibid. l. 24. *post producta adde* Ipse Cl. SPALANZANVS vidit arteriam in principio ad dimidias dilatari, in progressu minus.

p. 243. l. 3. *post VIEVSSENS adde* et nuper Cl. IADELOT,

ibid. l. 7. *post manifestum est adde* sanguinis de corde exitu impedito, a polypis inter valvulas intricatis *y*)*, aut a valvulis aorticis ossis *y***) pulsus pene destitui,

ibid. l. 12. *adde* Sed etiam inter duo vincula arteria plerumque pulsus destituitur *c*)*; si aliquando faliisse visa est, id omnino tribuas arteriae communicanti, quae inter

*q***) FALK vener. p. 250.

pag. 234. not. 2) *lin. 5. adde* Costae fractura BOERHAAVE *Prax. med.* I. p. 394. — *lin. ult. adde* MORGAGNI de sed. et caus. morb. II. p. 148.

ibid. not. a) *adde* Aneurysma ruptum *Medical obs. and inquiries* III.

ibid. ad verba aequalis est in *textu lin. antepen. adde* not. a*) *Lib. II. p. 427.*

pag. 239. not. r) *adde* Similia fere Cl. WINTERL de inflamm. arteriam magis nempe dilatari, quam exigit copia sanguinis in noua vnda in arteriam magis impulsu, p. 98. 117.

*d***) VALISNER III. p. 198. LIEVDAVT *sepulchret.* II. p. 49.

y)* VALISNER III. p. 198. *y***) LIEVDAVT *sepulchret.* II. p. 75.

c)* LAMVRE *Mem. de l'Acad.* 1765. p. 655.

inter duo vincula in truncum reuinctum inserta fuerit, cuiusmodi arteriae necessitatem faciunt duplicis, post aneurysinatis curationem, iniiciendi vinculi. Simplex enim si vinculum foret, arteria communicans a superiori et aperta parte trunci arteria, sanguinem in arteriae partem, a qua sanguinem auertere oportet, ducere pergeret.

pag. 243. l. 14. *adde* aut a tono; neque video, cur dubitem, omnem omnino pulsum, vt omnem sanguinis motum, cordi acceptum referre. Video obiectionem, esse vbi cor aliquoties pulset, neque ideo arteriae dilatentur *d**). Id in moribundis fit animalibus, in quibus cor contrahitur quidem, sed vix quicquam sanguinis eicit, vt arteriae dilatatio conspicua non sequatur.

Video denique esse, qui velint, ante a propria vi arteriam periri, quam sanguinis vnda aduenit *d***).

p. 244. l. 15. *post* auctor *adde* et eius sequaces.

p. 245. l. antepen. *post* reperio *adde* Huc forte referas pulsum in vna manu maximum, qui in altera non percipitur.

p. 246. l. 9. *post* expertus est *adde* In sede inflammata pulsus multo vehementer percipitur, vt etiam exiguarum arteriarum pulsationem percipias, quae in sano nullae tangantur. Credas etiam arteriam coarctatam, et arteriam squamis ossis variam aliter salire, quam sanam.

ibid. l. 14. *adde* Denique exempla reperias, in quibus causa phaenomeni difficulter reperiatur; cuiusmodi homo est dictus Cl. de HAEN, cui in altero carpo 95, in altero 115 pulsus fuerunt. In manu dextra pulsus intermittens, in sinistra bonus apud BADER; sic *n*†) in febre maligna pulsus in carotide vehemens, in carpo tardus et naturali similis fuisse legitur. Carotidis quidem vehementiorem, quam in aliis arteriis, pulsum saepe expertus sum *n*††).

p. 249. l. 2. *post* celerior *adde* ipsius fetus equi immaturi, et

ibid. l. 7. *lege* Boui 36 et 38 *q*) et 40 *q**). Equo 34 *r*) ad 48.

ibid. l. 11. *post* feminis *adde* etiam inter animalia *x**).

ibid. l. 14. *adde* De eo euentu alias quaeretur.

pag.

*d**) COLOMB apud PORTAL p. 38.

*d***) WINTERL. *inflamm.* p. 165. *d****) Lib. IV.

pag. 246. not. *d*) *adde* Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 10. obs. 74.

n†) KIRBY de febr. malign. p. 174.

n††) Svensk. Acad. Handl. 1773. p. 3. Plura vide Auct. Fasc. II. p. 60. 67. seqq.

q†) Du FOT. *malad. epizootiqu.* p. 34.

*x**) Boui 40, vaccae 45. du FOT l. c.

pag. 249. not. *z*) *adde* Sibi a tribus granis laudani intra minutum primum sex pulsus defecisse YPEY, p. 489.

pag. 250. not. *c*) *adde* Quater, quam homini, pauciores CALDAN.

ibid. not. *d*) et *f*) deleantur.

pag. 250. l. 4. *lege* In rana c) ad 26, anguillae ad 24 et 30, cochleae vnicus in octo secundis minutis b*), in vipera in minut. ad 28 g), in testudine etc.

p. 250. l. 16. *post* musculorum est *adde* et nixus, et vomitus, et potentissimus partus.

ibid. l. 17. *post* suppeditat *adde* Hoc experimentum nuper in Anglia auctum est, et consistit, augeri pulsum minori vero pro caloris externi portione. Ita reperio, fuisse pulsus 126 cum calore 130 graduum, et pulsus 139 cum calore aëris 130 graduum m*). Iterum in calore multo maiori 240 et 260 graduum pulsus non supra 144 fuerunt m**). In alio experimento cum calore 202 graduum calor humanus fuit 99½, pulsus 120. In aëre 210 grad. calor humanus 111½, pulsus 114. In alio cum aëre 227 grad. calente pulsus ab 80 ad 145 ascenderunt, calor substitit ad 102 m**).

ibid. l. 18. *post* accelerat *adde* cuius in calore incrementa, inque pulsu, ne opus sit repetere, paucis dicemus. Aquam calentem paulatim pulsum duobus, 6. 12. 15. et 25 et 40 pulsibus, et vno intra minutum primum augere, et vicissim frigus deprimere. In nuperis legas experimentis, in calore 124 grad. pulsus fuerunt centum o*), et in calore 114 pulsus a 73 ad 114 aucti o**), et a 65 ad 110 o***), et in calore 110 grad. pulsus 98 ad 120 o†), Thermae aliquando magis stimulant, et pulsum auxerunt ad 120 o††).

In hypocaustis illis russicis 167 gradib. Fahr. calentibus pulsus in fene ad 120, in viro ad 130, in puero ad 150 acceleratur. In languentibus animalibus calor externus pulsum facit frequentiorem p), quod quidem cet.

p. 251. l. ult. corde *lege* corpore

p. 252. l. 12. *adde* Ad debilitatem etiam pulsus illos celerrimos refero, quos a laesa medulla spinali Cl. CAVERHILL c*) annotauit, vt ad 122. 118. 140. 160. 162. 183. pulsus ascenderent, quae quidem frequentia fidem meam superat.

ibid. l. 22. *post* ascenderunt *adde* cum incidetur.

p. 253. l. 2. *post* sedecim *adde* et triginta

H 2

pag.

b*) HANOW. m*) *Phil. Transf.* LXV. P. I. m***) Vol. LXV. P. II. p. 487.

m***) DOBSON ib. Plura vide p. 253. et Auct. Fasc. II. p. 60. 67. seqq.

o*) HAYGARTH apud FALCONER *Barthelemy's*, II. p. 182.

o**) Id. loc. eod. o***) Id.

o†) Id. p. 182. o††) Id. eod. loc.

c*) *On heart.*

pag. 253. *ad verbum* febres in *textu* lin. 15. *adde* not. u*) Nimius fuerit Cl. WHYT, qui pulsus in febre facit 180. *Nerv. disorders* aut Id. 200.

ibid. not. o) *adde* Semel 140 MARTIN die tertio. Nam alias tantum 107. 103. 91. fuerunt.

ibid. not. q*) *adde* (SENAC).

pag. 253. l. 18. *post* nascuntur *adde* Denique morsus animalium iratorum, in quo venenum est, fere pulsum numerum auget, exiguae etiam bestiolae, araneae. In eximiis *Antonii Martini q***)* ROLANDI f. experimentis in variolis confluentibus ante eruptionem pulsus temporum 97, manus 118, cum calor foret 37 grad. et die tertio pulsus temporum 92, carpi 109, cum calore 34, vt tamen pulsus carpi ad 132 ascenderent. In alia febre pulsus 140 *Donald MONROVS* reperit, qui vix numerari possint, easque ad 160 et 183 augeri posse persuadetur *r**).*

p. 254. l. 10. *adde* Rarior in melancholico homine *c**)*

ibid. l. 17. *lege* ad decem et quindecim

ibid. l. 21. *lege* aliaque

ibid. l. 22. *dele* aut ad hypothefin *et post* crediderim *adde* aut debilitatem summam *o**)*

p. 256. l. 12. *adde* Suspendis pulsus nullus est, et redit a venae sectione, quae facit, vt spatio nato cor se deplere queat; a vapore etiam carbonis, cum vires vna deficerent, pulsus rarus fuit.

ibid. l. 23. *adde* Mihi aliquot per annos obscura de causa pulsus vehementer intermisit, vt integris diebus tertius quisque deficeret. Eum statum aegre ferebam, vt frigori et animi deliquio proximus essem, potissimum cum alter quisque pulsus me destitueret. Id tamen tantum malum sponte euauit, neque nunc aliquot per annos quicquam sensi in pulsu alienum. Cum intermittente pulsu collecti sanguinis sensum cum aliquo dolore percipiebam.

ibid. l. ult. *post* frangentibus *adde* pulsus saepe, et idoneos apud auctores, tardus fuit, teste olim PALFINO, nuper Cl. SARCONIO et le ROI, vt ad 45, ad 40, demum in exemplo Cl. *Iosephi LIEVTAVD* ad 20 pulsum numerus decreuerit.

Ex eadem causa alias pulsus ita penitus cet.

p. 257. l. 9. *post* percipiatur *adde* A diabete pulsus rarissimus, tunc asphyxia *d**).*

ibid. l. 14. *lege* pro legitimo stimulo et efficaci sufficit,

ibid. l. 21. *post* frigis *adde* Saepe in animali vidi quamque arteriam, vt a corde remo-

*q***)* Sw. Acad. Handling. 1773. Trimestre 3.

*r**)* Praelect. p. 103.

*c**)* WHYT disordr. p. 303.

pag. 255. not. l) *adde* ad 70 et 90. D. MONRO l. c.

ibid. lin. 20. ad verbum febrium *adde* not. n*) WERLHOF de variol. et anthracib.

*o**)* vid. pag. sequ. et Auct. ad hunc loc.

pag. 256. lin. 1. ad verbum polypo *adde* not. p*) Tantum 15 apud TARGIONI *raccolta*

II. p. 122.

*d**)* Medic. obs. and inquiries, T. III. p. 26.

remotior erat, ita priorem ab officio cessasse; demum solas arterias magnas et cordi propiores micasse. Vidit Cl. FOVQVET pulsus in moribundo primum in poplitea arteria defecisse, deinde in radiali, ut in sede cordis formatio quaedam superesset. Aderat (a contracta procul dubio auricula dextra) pulsatio venae iugularis, sed et ea ante mortem euauit.

- pag. 257. l. 22. *post* debilibusque *adde* a vapore venenato carbonum percussis *i**), aut fermentantis musti *i***), demum a vehementi terrore *i****) istis
- p. 258. l. 17. *adde* Verum id quidem apprimere memorabile videtur, quod et MORGAGNVS vidit, vir summus, et ego vidi, ad stuporem vidi, et alii certi testes viderunt, pulsus in sano homine alioquin, sed a dysenteria labefactato, nullum apparuisse ne in corde quidem, qui tamen orthostadius surgeret, ederet, loqueretur, officii vitae humanae fungeretur, nullius sibi periculi conscius.
- p. 259. l. 19. *adde* In fetu sexto mense edito pulsus 120 *e**).
- ibid. l. 23. *adde* Centum triginta ad centum quadraginta HEBERDENG*).
- ibid. l. ult. *post* 120 *adde* et perinde apud Cl. HEBERDEN
- p. 260. l. 17. *post* 45 *adde* Cl. WHYTTE qui 38. 40. *r**)
- p. 261. l. 13. ad quinquagesimum *lege* ad sexagesimum nonum *et post* numeravi *adde* frequenter supra 80, nunquam infra 70.
- ibid. l. 17. *post* potest *adde* Pulsus 44. 47. Thaddaeus BISCHOFF, triginta et 40 Cl. BOISSIER habet *q**).
- p. 262. l. 1. *adde* Mihi nunc, dum haec scribo, septuagenario pulsus ut pridem sunt fere 80, neque infra 70 descendunt.
- ibid. l. 14. *adde* FLOYERVS nimis paucos facit. Foeminae pulsus 120, numero forosum utique pulsuum patronus Cl. WHYTTE *e**).
- p. 263. l. 16. *ne lege* nullis
- ibid. l. 18. *lege* si vero ad eum numerum decem aut quatuordecim alii accesserint,
- p. 264. l. 8. *lege* grandis
- ibid. l. 21. *lege* vt accuratius paulo numeros augmenti definiamus.
- p. 265. l. 19. *dele* Aër frigidus pulsus decem - - - motus diminuitur.
- p. 266. l. 10. termino *lege* initio

*i**) SAGAR *system*. II. p. 541.

*i***) p. 358.

*i****) ZIMMERMANN *von der Erfahrung*, p. 371. qui tamen conualuit.

*e**) WRISBERG *Nou. Comment. Götting*, T. III.

*g**) *Med. Transact.* II.

*r**) *Nerv. disorders*, p. 119.

*q**) *Nosolog.* I. p. 382.

*e**) *Nerv. disord.* p. 119.

pag. 266. l. 17. *post* pulsus *adde* 160, 180, 183 s*), 200, aut demum
 ibid. l. ead. *post* assignari *adde* Summus numerus in aestuosisimo aëre apud Bri-
 tannos philosophos fuit 140. Vir utilissimus, et meliori sorte dignissimus,
 Antonius MARTIN pulsus in variolis ad 132 ascendisse vidit u*).

ibid. l. ult. *post* numerat *adde* Sic Cl. ALEXANDER pulsus supra 137 negat nu-
 merari posse.

p. 267. l. 7. febris *lege* pulsus

ibid. l. ead. excreuit *lege* increuerunt *et loco* rediit *lege* redierunt

ibid. l. 10. *lege* a 36 ad 50 d), et ad 66, etc.

ibid. l. 17. *adde* Ita Antonius MARTIN in variolis frequenter alium pulsum nu-
 merum in temporibus reperit et in carpo, vt etiam insignius discrimen esset,
 91 et 109; 64 et 95; porro 97 et 118; 91 et 109, vt fere in carpo fre-
 quentissimus videretur i*). Longius progressi Galli pulsum in vtroque la-
 tere feminae grauidae dissimilem esse sui, et debiliorem, qua parte puellam
 vtero gerebat i**).

ibid. l. 19. *post* comparant *adde* fere vt 5. 4. ad 1,

ibid. l. ult. *adde* Et in vniuersum in febribus, quoties pectus non laborat, pulsus
 multo frequentior est, cum respirationes a numero sani hominis parum re-
 cedant.

p. 270. l. 9. *adde* Mollem et debilem fibra laxa facit, qualem pulsum aestus in
 Carolina meridionali ex pleno et forti deprimit l*).

ibid. l. penult. *post* deserit *adde* quorum veritatem Ill. FONTANA testis con-
 firmat.

p. 271. l. 2. a diuerso *lege* a dicoto

p. 272. l. 5. *post* inaequalis est *adde* Demum nuper Idem pulsus duos nouos
 prioribus addidit, *pulsus nephriticum* et *pulsus stomachicum* n*).

ibid. l. ead. Verum plura repetere omitto, cum - - - animum poscunt *lege* Ve-
 rum plura repetere omitto; id autem structuræ genus experientiorum ite-
 ratione oportet aut stare, aut euerti, quorum vtrunque otium et opportu-
 nitates

s*) MONRO l. c.

pag. 266. ad verbum 300 in *textu* lin. 17. *adde* not. r*) WHYTT l. c.

u*) 1773. Trimestre III.

pag. 267. not. e) *adde* Vicq d'AZYR *exposé*.

ibid. not. g) *adde* p. 327.

i*) *Svensk. Wetenk. Acad. Handling.* 1773. Trimestr. 3.

i**) BORDEU *recherches* T. III. ann. 1772. et alii bene multi.

l*) CHALMERS *diseases*, p. 14.

pag. 270. not. g) *adde* de eo Cl. STRACK *Journ. de medec.* T. XXVI.

pag. 271. not. b) *adde* MENVRET, FOVQUET etc.

n*) *Recherches sur le pouls*, T. III. edit. 1772.

nitates, et liberum inprimis a praeiudicata opinione animum poscit. Sed etiam in praesentibus aegris experimentum facere mea aetas negat.

Qui nuper Cl. BORDEVII vestigiis insitit FOVQVETVS, hos pulsus et alios etiam subtilius figuris expressit. In gutturali pulsu longam et grandem eminentiam in anteriori arteriae sede reperit; in intestinali pulsum antrosum conice diminutum cum sensu grani duri, duorumue etiam granorum. In nasali eminentiam reperit, deinde grana aliquot antrosum fugientia. In vterino similia grana, rectius vero progredientia et absque tumore. In haemorrhoidali tumorem; deinde grana anterieus exigua, quae in dysenteria se diffundant. Sic Cl. STRACK pulsum irritatum descripsit, et intestinalem, et menstrualementem n**), porroque convulsorium. Idem pectoralem addit manifestissime esse distinctum, difficillimum hepaticum n***)).

Contra eos pulsus video Cl. viros insurgere. Nihil ferri in iis reperiebat Ill. WERLHOFIVS, cuius auctoritas merito est maxima; nihil Ill. HAE-NIVS, ut etiam fidem in nonnullis novorum pulsum patronis desideret. Ego quidem microtum respondere reperi, tum intermittentem aliquando, ut tamen saepissime omnia alia idem portendat.

SECTIO III.

MOTVS SANGVINIS PER ARTERIAS EFFECTVS.

Pag. 272. l. 15. *adde* Primo utique ea omitti non possunt, quae vel a Cl. viris sunt proposita, vel ex facili speculatione sequi videntur, etsi non nituntur experimento.

ibid. l. 20. *lege* illidere

ibid. l. ult. *post fit adde* neque aut globulorum lineae in parietes aliqua cum vi illidere videntur, neque se circa plicas convoluere; et eadem mecum Cl. SPALLANZANVS vidit. In calidis animalibus, et in arteriis maioribus haec illisio non est absque omni violentia, cum in cet.

p. 273. *vrgerentur lege* vrgeri

ibid. l. 14. *post discedant adde* Minor est firmitas concreti glutinis, maior terrei elementi; quare fibra his duobus elementis composita q*) minus suae dissolutioni

n**) *Journal de Medecine*, T. XXVI.

n***) Ib. T. XXXVII.

q*) L. I. S. I.

lutioni resistit: cum molliores particulae minus, quam durae, fluentum sanguinis continent.

pag. 273. l. penult. *post* nititur *adde* Ita certe ex theoria probabiliter docetur, et solidas quidem animalis partes destrui per experimenta docebitur x*).

p. 274. *lege* abeat

p. 277. l. i. etsi plerumque --- insuperata *lege* etsi plerumque alias ob causas arteria parum dilatatur.

p. 279. l. 4. *post* partem *adde* adque manum

ibid. l. 5. brachialem *lege* radialem

p. 280. l. ii. *adde* Hypothesin omitto nuper natam, quae pulsus contrario anastomosium torrenti tribuit. In flexu enim arteriarum, non adeo in anastomosi, pulsus euidentior est.

ibid. l. vlt. *adde* In canalibus se decussantibus tamen liquores paulum misceri

MVSSCHENBROECKIUS auctor est.

p. 281. l. 7. *lege* virorum

ibid. l. antepen. *adde* Haec ex theoria, cum nullo experimento fulciantur.

p. 282. l. 3. *lege* celeritas progressui motus

ibid. l. 16. *adde* in vasis nempe minimis

p. 283. l. vlt. *post* fuisse *adde* etiam quando eae aues in hibernaculis stupent

p. 284. l. vlt. *adde* Certum est, febres intermittentes, potissimum tertianas, sanguinem dissolvere, qui in me ipso meminerim, post tertianam vernam anno 1729 plurimum mihi de naribus sanguinem stillasse, et eum sanguinem pulli sanguine non fuisse densiorem. Post tertianam febrem haemorrhagia narium g*). Electricitas, quae sanguinis motum incitat, eadem sanguinis fluiditatem auget g**), et conseruat.

p. 285. l. 2. *lege* diminui

ibid. l. 4. *post* habeat *adde* quam summa est superficierum in singulis.

ibid. l. 14. *lege* perspicimus

ibid. l. antepenult. *lege* aut in frigidis animalibus, aut in calidis admittunt, cet.

ibid. l. vlt. *post* ducunt *adde* et omnino globos ligneos imitentur, qui longo ordine in aqua natant;

pag.

x*) L. XXX.

p. 276. *ad verbum* rumpuntur in *textu* lin. 15. *adde* not. o*) Conf. Lib. II. Sect. I. §. 14.

p. 283. not. x) lin. 2. *adde* In aneurysmate membrana subdura nata *Ess. phys. and lit-*

ter. p. 222. 223. — lin. vlt. *adde* RIVA Eph. N. C. Dec. I. ann. I. obs. 18.

p. 284. not. b*) *adde* et in vespertilionis saepe a BOERHAAVIO citato, LEEVWENHOEKIUS.

g*) E. N. C. Dec. II. ann. X. obs. 147.

g**) GERHARD *Memoires de l'Acad. de Berlin*, 1772.

p. 285. not. m*) *spectat ad verbum* actu in *textu* lin. 16.

pag. 286. l. 16. *lege* 58.

ibid. l. pen. *post* percipiatur *adde* Cum eo pulsu calor ipse redit. Vinculo arteriae injecto, artus friget, idemque legitimum calorem remoto vinculo recuperat, MORGAGNI experimento. Ita pariter in aneurysmate, arteria intercepta, subiecta manus friget, at restituto sanguinis commeatu per arterias communicantes, calor redit.

p. 287. l. 2. *post* nullo *adde* Nihil vulgatus, quam feminarum hysteriarum frigus, quas pulsus cum deferuerit, ipse vna calor restinguitur. Cum asphyxia frigus z***) coniungi vulgo notum est, et ipsi CL. aduersario HAENIO non ignotum.

ibid. l. 4. *post* initium *adde* calidae

ibid. l. 11. *post* pondere *adde* in moriente

ibid. l. 15. *post* continent *adde* Feruorem in corde statuit ARISTOTELES tantum, vt sanguis de corde ebulliendi prodeat.

p. 290. l. 3. *post* experiuntur *adde* humoresque animales in confinio putredinis perpetuo poni, plerique nuper Angli vrserunt r**).

ibid. l. 11. *post* foeno *adde* ex ipsis demum congestis pannis, pilisque animalium apud THEVENOTIVM, inque linteis chartae conficiendae destinatis

ibid. l. 13. *post* reliquerunt *adde* Pulvis etiam coriariorum sponte calorem concipit, qui 45 gr. Reaumurianum aequat, omni humano calore maiorem

ibid. l. 18. *adde* Nuperi Angli passim calorem a progressu sanguinis ad putredinem deriuant, vti modo retuli.

p. 291. l. 12. *dele* si

ibid. l. 20. *post* nascuntur *adde* aut certo ita euoluuntur, vt pro sua vrinosa natura nunc efficaces esse possint.

p. 292. l. 14. *lege* His frigidis animalibus potius, quam cet.

ibid. l. 23. vt aquae *lege* vtique

p. 293. l. 1. *lege* in viui animalis sanguine

p. 294. l. 5. *post* incalescunt *adde* cremoris exemplo, qui in butyrum agitando coit, non coiturus ob calorem, nisi eum aestiuis temporibus ipsa alioquin aqua niuata pastores coërcerent l**). Alii ponderosi liquores cet.

pag.

p. 286. not. r) *lege* Posito calore summo 112 gr. comparato acris = 54 cum calore medio. z***) ZIMMERMANN von der Erfahrung, p. 370.

p. 290. not. r) *adde* Eff. of a Society at Edinburgh, L. V. n. 77.

r**) Inf. Anz. de PLENCIZ de calore animali, Vindobon. 1773. 8.

p. 291. not. n) *lege* Vti vitrioli oleum.

l**) YOYNG de lacte.

pag. 294. l. pen. *post* producunt *adde* confertae equidem, rari enim crabrones et vespae in hibernaculis nullum calorem generant.

Sic pisces, vt continuo dicemus, prae frigore glaciali rigentes, qui multos adeo gradus caloris amiserunt, et eos gradus omnes, qui sunt infra 0 Fahr. reuiuiscunt tamen, et calorem regenerant *q*^{*)}), qui ipsis a natura datus est *q*^{**)}).

p. 295. l. 6. *post* pergunt *adde* Primum plurimorum animalium oua, et plantarum semina glaciale frigus incorrupta tolerant *q*^{***)}). Esti obliicias, nullum in his ouis, et feminibus vitalis humoris motum esse, addam, multa omnino nostratia insecta frigus glaciale tolerare *q*^{†)}), etiam aquae *q*^{††)}). Demum in vniuersum frigida animalia in frigore vitalia superfunt, et pisces adeo rigidi, vt rigeant, et frangantur flexi, tamen reuiuiscunt *q*^{†††)}).

ibid. l. 9. sed ad 113 - - descendit *lege* sed Kirengae ad 124, Torneae ad 113 *t*), leniseae ad 130 *u*) gradus sub Fahr. congelabili frigore descendit, demumque teste idoneo P. S. PALLAS frigus hydrargyrum in oppido Sarapul coagulauit, cum hydrargyrum ad 213. 226 et 235 gradus *Gulielmi DE LISLE* descendisset *u*^{*)}). In eo frigore hydrargyrum consistit, et flecti potest. Et tamen in eo ipso frigore integrae ciuitates vitales superfunt, et animalia vita fruuntur, inque maiori denique;

ibid. l. 19. *lege* nempe animalia 184 eiusmodi gradus caloris in suo sanguine solo motu generant *z*).

ibid. l. 20. *post* qualibus *adde* 212

ibid. l. 23. *post* sustentarunt *adde* nonoque mense vegeti in patriam reuersi sunt; quae eadem felicitas Anglis nautis contigit *a*^{*)}). Ipsi demum bis septem Belgae, qui desides, neque sustinentes per brumalem aërem venari, scorbuto extincti sunt, plurculos prius menses vixerant, passimque per niues et perpetuam noctem prandium quaesierant. Sex integris annis nuperi nautae Russici duce HIMKOFIO in insula Spizbergae vicina vixerunt, et in patriam redierunt.

pag.

q^{*)} SVLZER *Insekt.* p. 139.

q^{**)} L. V.

q^{***)} SPALANZAN. in nuperis *opusc.* Aphidum oua in glacie vitalia superfunt, *Verhandl. der Maatschapp. te Haarlem*, T. VIII. p. 72.

q^{†)} Ibid p. 23.

q^{††)} p. 29.

q^{†††)} SVLZER *Insekt.* p. 139.

u^{*)} *Reisen durch Rußland*, III. p. 418.

pag. 295. not. a) *post* hieamarunt *adde* et in collectione BORROVGM.

a^{*)} In CHVRHILL. collect.

- pag. 297. l. 1. *post tritu adde ferro*
 ibid. l. 11. *dele et animalia ferocia carniuora m).*
 ibid. l. 13. *lege impulsi*
 ibid. l. 15. *dele forte*
 p. 298. tres *lege tribus*
 ibid. l. 9. *post dictum est adde Asphyxia frigus, illa sublata calor rediit x*)*
 p. 299. l. 3. *adde frigent erinacei.*
 ibid. l. 6. *post plurimus adde teste F. MARTENS*
 ibid. l. 15. *post portionem adde ad totum corpus*
 p. 300. l. antepen. *adde et cutis*
 p. 301. l. 12. *post coalescere adde aut liquores homogeneos d*).*
 ibid. l. 15. *lege Violentius*
 p. 302. l. 1. *lege 900.*
 ibid. l. 4. *lege vasa*
 ibid. l. 6. *dele non omnibus animalibus - - - febrem facit.*
 ibid. l. 13. *quindecim lege septem*
 ibid. l. 14. *missionarios Danicos lege OVINGTONIVM*
 ibid. l. ead. sexaginta - - absolueret *lege supra viginti gradus secundo vento re-*
legeret.
 p. 303. l. 8. *post gradus adde (aut certe 112)*
 ibid. l. 9. *post differunt adde Exempla producant caloris aucti, cum pulsus minue-*
*retur u**). In Francisci HOME tabulis non eodem ordine calorem augeri,*
et pulsum numerum.
 p. 304. l. 3. *adde Neque cum pulsu calorem humanum perpetuo aut augeri, aut*
minui. In experimentis ea videas, quae recensuimus, inque aliis Cl. HOME
et HAENIL. Demum in aliis nuperis celebribus experimentis Cl. BANK-
SII, FORDYCE, et Antonii MARTIN in calore enormi atmosphaerico fa-
ctis ad 136, 139, et 145 pulsus ascendisse, graduum calorum numerum non
superasse a).* Cum in balneo calor esset 48 ad 102 pulsus mansisse 68 ad
 100 a**). In Cl. CAVERHILL experimentis cum in cuniculo perforas-
 set medullam spinalem, et calor, qui naturali in statu foret 103, descendisset

I 2

fet

x*) E. N. C. Dec. III. ann. IV. obs. 73.

pag. 301. not. a) *post 234. adde ignem sibi confecto ligno procurare.*

ibid. not. c) *adde Globulos Cl. LEDERMÜLLER depictos dedit Mikroskopische Ergänz.*

II. pag. 62.

d*) BIKKER *de calore.*

n**) LIEVTAUD p. 218.

a*) Phil. Transact. LXV. P. I.

a**) HAYGARTH apud FALCONER *barbaters* II. p. 182.

set ad $83\frac{1}{2}$, pulsus tamen fuerunt 140. In calore 79 cum pulsibus 118, et 78 cum pulsibus 122 a***). In *Antonii MARTINI ROLANDI* fil. experimentis calorem fuisse a 37 ad 44 cum pulsu in variis corporis partibus a 118 ad 57 numerato, et paulo post tertio variolarum die calorem a 34 ad 28 multo minorem cum pulsibus 109 ad 91, quæ ratio minor est; et paulo post cum pulsibus 132, nempe minorem calorem cum maiori pulsuum numero a†). In sacuo illo aestu, quem ad 220, 224, 260 gradus Fahr. Academici Angli tulerunt, pulsus non fuerunt supra 136. 144, qui numerus magnus quidem est, non tamen cum eo comparabilis, quem aër creat, quem respirabant a††).

pag. 304. l. 5. *post* maiori *adde* In peste cum pulsu vix celeriori aestum insensissimum fuisse RUSSEL.

ibid. l. 14. *adde* In cadauere denique potissimum post morbos malignos, febremque flauam, calorem vitali similem, aut paulo minorem diutiuscule superfuisse, cuius adeo causa non possit in sanguinis motu quaeri.

ibid. l. 20. *post* pure *adde* Demum non raro a morte calorem superesse non in solis apoplecticis e†), sed post febres malignas, aliasque ignotas causas.

ibid. l. 21. *adde* Non a circuitu calorem esse, cum animalia frigori resistent, quibus nullus circulus sit; effectum esse boni status sanguinis l. HUNTER e††), non circuitus nempe dicitur calorem facere, sed motum humoris vitalis.

p. 305. l. 16. *adde* Ad susurrum, seu inconspicuam oscillationem fibrarum calorem animale Cl. ROGER retulit.

Nuper Cl. CAVERHILL calorem ad neruorum actionem reduxit, eo potissimum experimento, quod laesa medulla spinali calor insigniter depressus fuerit. In eius viri quidem experimentis utique laesa medulla spinali et pulsus reddebatur debiliior, et calor minuebatur. In cuniculo, cuius calor erat 103 grad. a stylo in medullam spinalem detruso utique calor a 103 ad 93, a 100 ad $87\frac{1}{2}$, et 89, a 99 ad 70, a 86 ad 75, 71 descendit.

p. 306. l. 9. *adde* Cl. CAVERHILL vnice videtur demonstrasse, vires vitales, laesa medulla spinali, debilitari, cumque his viribus calorem. Nam etsi, quæ citavi, videntur dissensum inter pulsuum numerum et calorem animalis ostendere, non tamen ostendunt. Nam pulsus 140. 122. et 118, qui nobis multi videntur, et cum paruo calore coniungi, vere non sunt multi; noster enim

a***) On hear.

a†) See. Acad. Handl. 1773. Trim. 3.

a††) Philosophic. Transact. LXV. P. II. BLAGDEN.

e†) PORTAL apud ROZIER, 1774, Mois Octobre.

e††) Phil. Trans. LXV. P. II.

enim pulsus huic animali tribuit 183. 166. 162 et 160, vt omnino pulsus 140 et 122 multo naturali numero pulsuum cedant; debilem et rarum cum frigore pulsus factum ipse auctor est, et demum exiguo gradu paralyticos artus fieri frigidiores.

pag. 306. l. 19. *lege* Calorem animale non supra 112 gradum a motu cet.

ibid. l. 26. *post* intolerabilis *adde* Calor februm putidarum digitum quasi pungit p**).

ibid. l. penult. *post* afficere *adde* Neque recuso sudorem fieri, quando causa motrix sanguinis remisit. Cl. ALEXANDER per sudorem pulsus vere minui vidit, et a 104 ad 80 redire.

Sic fieri potest, vt cum summa debilitate aucta pulsus velocitas coniungatur p***), neque id phaenomenon rarum est. Eo in statu rerum sanguis trepidat potius, quam acceleratur, et sub mortis atria demum ad exiguum a corde distantiam per principes arterias promouetur, vt frigus in artibus coniungi aequum sit, ad quos calida sanguinis vnda nulla nunc pertingat.

p. 307. l. 1. *post* adipe *adde* diuitem

ibid. l. 4. *post* video *adde* inque Francisci HOME numeris cum frigore febrili calorem 104 et 101 fuisse lego.

ibid. l. 7. *post* exteriores *adde* exiguos

ibid. l. 13. *adde* Etsi nonnunquam calor in febre auctus fuerit non aucto pulsu, in vniuersum tamen, et in solita lege naturae pari proportionem et calor intenditur et pulsus. In meis quidem experimentis intermissio febris, finis adeo caloris, erat, cum pulsus redirent ad 94. Febrem percipiebam et calorem, cum pulsus 100 attingissent et superassent, molestum calorem, vt is numerus augetur, intolerabilem, quando 130 superabat.

p. 309. l. 4. *post* initia *adde* se efferre.

p. 310. l. 1. *post* exposuimus *adde* probabilem nempe hypothesin secuti, non vt demonstrata esse asseueremus, quae docuimus.

ibid. l. 10. *lege* 27.

ibid. l. 21. *post* abit *adde* Putredo ruborem destruit eo potentius, quo longius ipsa progressa est.

p. 312. l. 11. *post* rubor *adde* satis certo

ibid. l. 14. *adde* et plantarum coccinei liquores.

p**) FASANO febr. epid. p. 201.

p***) Libr. V. Et de oculo inflammato in distans aestus emicauit VIRIDET vapeurs, pag. 87.

pag. 312. ad verbum fuerit in textu lin. 12. *adde* not. p*) pag. 310.

pag. 312. l. antepen. *post inclinat adde eademque paulo post inuersa placenta aëri opposita, ruborem recuperat.*

p. 313. l. 1. Multis modis vtraque hypothesis euertitur *lege* Porro addunt, sanguinem, qui de vena emissus est, ipso traiectu longiori per aërem floridum colorem concipere. Cruoris aëri obuersi tot laminas rubore florere viuido, quot deinceps aëri obuersae fuerint. In spatio inani sanguinem atrum reddi. Oleo oliuarum superfuso, aëre adeo auerso, sanguini superficiem nigram nunc esse, quae florido colore fuisset, si aëris effectum sentire ei permisisses. Haec Cl. CIGNA z*).

Addere posset, purpuram marinam viridem apparere, inde in caeruleum, demum in purpureum transire z**), aëre reddito z***).

Nuper vir clar. Iosephus PRIESTLEY nouis experimentis pene persuasit, omnino tamen sanguinem ab aëre suum ruborem habere, ex quo nitrosi aliquid sanguinem subeat, uti vicissim phlogisti pars ex pulmone in aërem exhalat z†). Nam utique sanguinis in vena pulmonali laetorem, quam in arteria, ruborem esse z††). Eo meliorem autem ruborem ab aëre cum sanguine communicari, quo purior est admisto elemento phlogisto z†††). A phlogisti abundantia nigrum fieri, ab aëre laete rubere a*); vesicam interpositam non impedire, quin aër vulgaris sanguinem rubore tingat a**). Qui in spatio inani niger factus est sanguis, is in libero aëre ruborem recuperat a***).

ibid. l. 12. calorem *lege* colorem

ibid. l. 18. *adde* Nuper Cl. ROVME nigrum, qui dicitur, aethiopum sanguinem solum ob crassitiem laminae sanguineae nigrum esse f*).

p. 314. l. 9. *adde* In pulli incubati vasis sanguis, cui nihil ab aëre haëtenus beneficii accessit, iisque minoribus rubor est floridus, in maioribus potius subviolaceus.

ibid. l. 14. *post inani adde* per alia experimenta,

pag.

z*) CIGNA *Miscell. Taur. T. I.*

z**) BOYLE *color. p. 295.*

z***) REAUMUR *Mem. de l'Acad.*

z†) *Phil. Trans. LXVI. P. I. p. 237. et in T. III. sur différentes sortes d'air.*

z††) *Ibid. p. 238.*

z†††) *Ibid. p. 234.*

a*) *Ibid. p. 241.*

a**) *Ibid. p. 244.*

a***) *Ibid. p. 245.*

f*) Apud ROZIER *Journal de Physique 1773. Juillet.*

pag. 313. not. g) *adde* RÜDERER *de morb. mucoso, p. 162.*

pag. 314. l. 16. *post* recuperat *adde* Haec confirmaui facili experimento, ex quo constat, tenues laminas sanguinis, et marginem non crassi grumi, etiam consentiente D. PRIESTLEY, laetius rubere, quam crassam placentam q*).

ibid. l. 18. *adde* Verum omnino mihi videtur simplici experimento ostendi, non vere coccineum colorem sanguini ab aëre impertiri. Id verum est, sanguinem, qui de naribus stillat, vti guttula se dispergit, ita laete rubere. Verum indulge huic eidem guttulae aëris contactum, videbis continuo, hunc coloris florem diminui, et in obscurum, ingratumque fuscum colorem sanguinis mortui transire. Ex eo argumento certo credas, ruborem illum floridum potius ab ignoto aliquo elemento esse, quod de aëre decedens in sanguinem, hunc subito quidem floridum reddat, sed idem sanguinis naturam ita non mutet, vt continuo difflatum, deterius tinctum relinquat; vel in globulis ab aëris contactu mutationem aliquam produci, quae continuo iterum evanescat, vt omnino, quoties de perpetuo et vero sanguinis rubore, eiusque causa sermo sit, non possit idem ab aëre repeti, cuius effectus adeo fugax sit.

Contra ista potest denuo vrgeri experimentum III. CIGNA, qui de lamellis sanguinis taleolas refecuit, ita vidit eam, quae sequebatur, aëri oblatam floridiori fieri colore; oleum demum, quod aërem arcet, sanguinis colorem reddere obscuriorem, non mutato laminarum numero r). Ita videtur confici, non ruborem quidem, sed floridum ruborem et cinnabarinum aëris contactui deberi, eundem contactum autem vim minime perpetuam exercere, laminamque, quae coccinea fuit, post moram aliquam obscuritati reddi. Putes exhalans phlogiston hunc eximium fulgorem parare. Certe vt sub oleo, exhalationem impediante, nullus nascitur in Cl. CIGNA experimento, ita nullus sub aëre inflammabili, qui porro nullum de sanguine phlogiston admittit r**).

P. 315. l. 4. serum *lege* suum

P. 317. l. 4. *adde* Hanc coniecturam nuper clar. viris placuisse vidi, etiam qui ex professo de rubore sanguinis scripserunt, Cl. STORMIO x*), du RADE, et Illustrissimo Comiti de MOYROUX x**). Addit idem vir ill. etiam calcem sanguinis rubram esse, et vitris dare ruborem.

Neque

q*) *Phil. Transf.* LXV. P. I. obs. 246.

r*) *Miscellan. Taurin.* p. 68. 72.

r**) MOSCATI *nuoue esperienze.*

x*) *De rubore sanguinis.*

x**) *Miscell. Taurin.*

Neque mireris, a metallo animalia hunc colorem habere. Nuper ostensum est. x***), cantharides, quorum elythrae auri colore refulgent, omnino aurum arte chemica conspicuum reddere.

pag. 318. l. ult. *lege* dissoluere,

p. 320. l. 2. est *lege* sunt,

SECTIO IV.

MOTVS SANGVINIS PER VENAS REDVCIS.

Pag 323. l. 3. *post* celerior *adde* neque alia magis probabilia, in quibus in trunco, quam in ramis, maior fuit celeritas. Sed casui illam contrariam naturae praerogatiuam tribuerim; vti cet.

ibid. l. 15. *post* facile sit *adde* Non memini me vidisse, vidit tamen Cl. SPALANZANVS venam vnicum globulum vehentem se in magnum truncum, ipsamque venam cauam exonerasse d*).

ibid. l. penult. *post* maior est *adde* quam ad parietes sit

p. 324. l. 2. *lege* Ita ad truncos venarum maiores, et maximas tendunt

ibid. l. 6. *post* acceleratur *adde* Ita aequalitas in motu circulatorio obtinetur.

Vt enim arteriae de motu suo amittunt, quod pauciores continuo globuli plures propellere coacti, debiliorem iis motum imprimant, ob latitudinem in minimis ramis auctam, ita venae celeritatem recuperant, cum plures continuo globuli ramorum in pauciores globulos trunci nitantur.

ibid. l. 8. Prima, quam remouemus - - - causas numerari debent, *lege* Num cor sanguinem venosum acceleret, primum dispicere oportet.

Ego quidem *), tot in experimentis, nihil vnquam vel in minoribus venis, vel in maioribus simile vidi; vidit autem non LEEVWENHOEKIUS solus et STEPHANVS HALES, sed nuper clar. vir, cui merito plurimum tribuo, Lazarus SPALANZANVS; in minimis nempe venis sanguinem acceleratum fuisse, vt in systole cordis arteriosi celeritatem superaret, qui in diastole ei cederet. In mediis venis, et in caua vena, nunquam eam accelerationem Idem viderat.

p. 325. l. 1. *lege* suae distentioni

pag.

x***) FORSTEN *diff. de cantharidibus*, Lugd. Batav. 1775.

d*) *Mor. sangu. Leg. l. 53. Phenomen p. III. cet.*

pag. 324. notae n. o. p. q. et s. deleantur.

- pag. 325. l. 10. *post* rapiatur *adde* quod ipsum nuper Cl. WILSON pro magno inuento tradidit.
- p. 326. l. 8. *post* latiori *adde* Nuper adhuc SPALANZANVS sanguinis motum accelerari docuit, vt venae cordi propiores essent, inque vena caua potissimum.
- p. 327. l. antepenult. *dele* Cum venis maioribus - - - vt alias exposui.
- p. 328. l. 3. *lege* a copia
- p. 329. l. 6. *post* conuertitur *adde* Haec omnia, pariter vt ego, nuper Cl. SPALANZANVS vidit.
- ibid. l. 11. *adde* ope.
- ibid. l. 17. *post* fuerit *adde* A Cl. demum SENACO omnino negatum est, a venae incisione sanguinem in ea ipsa vena accelerari.
- p. 330. l. 16. qui a stimuli praesentia - - - sanguinis effectus est *lege* cuius actio a stimuli praesentia sustentetur i). Porro manifesto vidi, sanguinem stantem et coactum a venae incisione in viuo animali solui, vt globuli dissipati secederent. Sed sanguis in corde, eiusque auriculis coactus contractioni resistit k). Hoc ergo impedimentum potest a venae sectione tolli.
- ibid. l. 21. neque adeo inter - - - motum retardant *lege* in vniuersum tamen aliquantum sanguinis circuitum incitant.
- p. 331. l. 10. *adde* Nunc quidem motus in cerebro aliquis dudum innotuerat. Cum tenero infanti cerebrum solis membranis tegatur, ea in sede alternum encephali motum leuissima attentio animi distinguit, et omnino iam PLINIVS a) annotauit, soli inter animalia infanti cerebrum salire; quae eadem causa fuit nominis *fontis pulsantis*, quo sedem cranii osse non coopertam antiqui designarunt, animalibus autem aliis minores sunt eae nudaes sedes, et celeriter ab ossea natura occupantur. Motum cerebri in infante manifestum esse ORIBASIVS b), qui addit, dum id viscus eleuatur, accedere idem ad duram membranam, et recedere vicissim c), quando subsedit. ZOROASTRO, perantiquo mago, cerebrum ita palpitasse legitur, vt manum repelleret d). Eundem motum cerebri, quo alterne tumet et subsidet, plerique vetusti medici in sua scripta receperunt e). Innumeris exemplis idem motus in aegrotis

pag. 330. not. k) *lege* CALDANI *reflexion.* 254.

a) L. XI. c. 37.

b) Edit. DVNDASS. p. 50.

c) pag. 9.

d) Apud PLINIVM L. VII. c. 16.

e) COLUMBUS, p. 189. BAVHINVS *Theatr. anat.* SANCTORIVS in I. *Fen AVICENN. BARTHOLIN. anat.* p. 259 VIEVSSENS, p. 41.

tis hominibus, inque viuis animalibus confirmatus fuit *f*). Non potuerunt chirurgi ignorare, fungos in cerebri vulneribus per foramen cranii vrgeri, sanguinem post terebram admotam exsilire cum impetu *g*), cerebrum ipsum *h*) per vulneratum cranium exprimi; cranii suturas post cephalacas, aliosue morbos hiare *i*), eo in casu motum cerebri percipi, vasa demum peregrina per morbos a corpore ex foramine cranii alterne et exiisse, et in cranium fuisse resorpta *k*). Olim CAULIACVS cum cranium deesset, cerebri motum vidit *l*). Necesse est autem, aut molle esse cranium *m*), aut foramine perterebratum nudam offendere duram matrem. Demum in meis certe experimentis non prius cerebri motum vidi, quam digito de caluaria cerebrum, duramque meningem repulsiſsem.

Sequitur, vt modus ostendatur, quo cum respiratione hic cerebri motus coniungitur.

pag. 331. l. 16. *lege* anno vero 1751, mense Aprili in conuentu Societatis Regiae praelegi *n*), et circa anni 1751 finem, et 1752 initia cum amicis gallis REAUMVRIO etiam et SAVVAGESIO, Decembri et Ianuario mense in literis meis *o*) communicau.

p. 332. l. 5. *post* epistola *adde* etiam *post* meas responsiones repetito excusa, ibid. l. 11. *lege* accusat

ibid. l. 18. Praecipuis tamen in rerum - - - edidi prior *lege* qui cerebri sinus pulsare, et animal sopiri, cui venae iugulares intercipiuntur, et spatium inter duas meninges esse scripserit. Haec plagii accusatio me mouit, vt calamum arriperem, nunquam ne verbo contendere certus, si de sola gloriola inuenti ageretur.

pag.

f) V. COITER, p. 132. PARE, p. 300. RIOTAN, p. 414. C. BAVHIN. *theat.* p. 247. HILDAN. *Cent. I. obs.* 13. *Cent. II. obs.* 18. *Cent. V. obs.* 23. LINDEN *physiolog.* p. 148. 427. BELLIN. *miss. fungu.* p. 48. GÖCKEL *gallie. obs.* 54. BAGLIV. *oper.* p. 274. 275. RIDLEY p. 5. *Philos. Transf.* n. 281. BECKER *obs.* 26. EANTON. *esp.* p. 212.

g) TVLP. L. I. *obs.* 5.

h) Funesto enentui JAMIESON *Essay of a Societ. at Edimb.* T. II. p. 245.

i) BARTHOLIN. *Cent. V. hist.* 92. cet.

k) HAGEDORN. *Cent. I. hist.* 92. cet.

l) pag. 176.

m) Hinc in aue et pisce cerebrum non mouetur, SCHLIGHTING. *Commerc. nor.* 1744. libd. 52.

pag. 331. not. *m**) *adde* Conf. *Préface* ad *Form. étrang.*

pag. 332. ad nomen LAMVRE in *textu* lin. 1. *adde* not. *r**) Ita enim M. Martio 1752 Cl. de SAVVAGES fatetur, quae epistola excusa proſtabit.

ibid. not. *c**) *adde* Conf. *ceterum* *Supplement d'l Encyclopédie.*

ibid. ad verbum aperueris in *textu* lin. pen. *adde* not. *c**) SCHLIGHTING. *Mem. des Sav. étrang.* I. p. 117. WALSDORF, p. 2. 2).

pag. 333. l. 3. Vicissim in expiratione - - - digitum impositum repellere *lege* In proxima vero expiratione cerebrum mole augeri i), et assurgere k), et de cranio effracto prominere k*), digitumque impositum repellere k**), et sanguinem super cerebrum effusum exprimere.

Cum his experimentis alia consentiunt. Dum clamatur, cerebrum exferitur k***). Inter expirandum per futuram coronalem foetida materies k****) expulsa fuit. A tussi multus sanguis de cranii cauo expressus k†) est, sinusque cerebri intumescunt k††). De fracto cranio gutta sanguinis exsudavit, cum, clauso ore clausisque naribus, conatus k†††) ad respirationem ederetur, et de cranii foraminibus sanguis per expirationem effluxit k††††). A systole et diastole durae membranae in vulnere cerebri pus eiectum l*). Vehemens pulsatio, vt dura mater eleuaretur et magnum cranii hiatus repletet l**).

P. 334. l. 7. adde et Gualthero van DOEVEREN

ibid. l. 8. Neque enim hominem - - - synchronum fecerunt *lege* Qui vero aut venas c), aut ipsum cerebrum in inspirante animali turgere scribunt d), ii in experimento tempora confuderunt.

ibid. l. ult. adde Experimento haec confirmavit vir clar. Anna Carol. LORRY. Asperam arteriam adstrinxit, vt respiratio cessaret; ita cerebrum pro retenti sanguinis portione tumuit; laxavit eam arteriam, pulmoni libertatem reddidit, continuo cerebrum detumuit h*).

K 2

pag.

pag. 333. lin. 1. ad verbum inspirationes in textu adde not. d*) LAMVRE p. 565. *Mém.* etc. T. IV. Exp. 5.

ibid. not. e) adde SCHLICHTING l. c. LAMVRE, p. 543. LORRY, p. 300. 353.

ibid. not. i) *lege* Exp. 73. sur les parties irritantes, T. IV. exp. 8.

ibid. not. k) *lege* SCHLICHTING l. c. *Mém.* l. c. T. I. exp. 73. 74. 75-80. 82. 86. 88. 89.

90. 91. 12. CALDAN, ib. T. III. exp. 49. 50. SPROEGEL de vinen. p. 41 — 54. ZINN obs. 4. Vrb. TOSETTI lett. 2. off. 2. p. 198. WALSDORF exp. II. 5. 6. 10. 17. HOVSSET exp. 20. et ipsi demum Cl. viri A. C. LORRY *Mém. des Sav. étrang.* T. III. p. 301. 309. 35. LAMVRE *Mém.* de 1749. seu potius 1753. p. 142. 517.

k*) LORRY, l. c. p. 300.

k**) *Memoir.* etc. T. I. exp. 73. 75.

k***) ORIBAS. ed. DVNDASS. p. 50.

k****) BINNINGER *Cent.* V. obs. 96.

k†) *Ess. of a soc. at Edimb.* II. n. 12.

k††) MAGAT *rar. med.* II. p. 13.

k†††) SLEVOGT *dura mar.* n. 50.

k††††) ACREL *Haendelsj.* n. 9.

l*) TVRNER *cases* p. 30.

l**) Ibid.

pag. 334. not. d) *lege* FANTON. *anar.* p. 441. PETRIOL. in FABRI *Raccolta*, p. 336.

h*) p. 310.

pag. 335. l. 10. in venas cerebri *lege* in venas iugulares *k**), et cerebrum, eae ergo etc.

ibid. l. 12. *adde* Quare etiam resectis, ligatisque arteriis venisque capitis, intercepto in vasa cerebri refluxu, etiam is cerebri motus supprimitur *m**).

ibid. l. 13. *dele* si placeret malignum esse,

ibid. l. antepenult. *lege* debet

ibid. l. penult. *post* homine *adde* caluaria inuiolata

p. 336. l. 4. *adde* Id de tota re in viuo animali verum superest. Cum in exspirando venae cerebri magis repleantur *s**), mollis cerebri interposita medulla comprimitur *s**). Inde a sanguine cerebrum infarciendo ea cerebri induratio *s****), quam SCHLICHTINGIVS conuulsionem dixit.

ibid. l. 15. Alia causa est refluxus - - - obseruata sunt *lege* Alio etiam modo respiratio motum sanguinis venosi mutat, et moderatur. Diaphragma nempe, vt suo loco dicetur, inferiorem venam cauam constringit agendo, dum inspiramus; sanguinem eius venae cogit descendere, et a corde auertit. Paulo post remittit se diaphragma, et sanguis per expirationem in venam cauam, et dextram auriculam appropereat.

Vtroque modo respiratio motum sanguinis venosi potius dirigit, quam adiuuat, cum eius redditui modo resistat, fauceat modo. Sed ea alibi redibunt.

p. 337. l. 10 *dele* et rariores, et

p. 340. l. 19. *post* oportebat *adde* Venam cauam circa diuisionem in venas iliacas ALBINVS coaluisse vidit. Venam iugularem indurato quasi glutine fartam SPONIVS. Venae portarum ramum excaecatam SEVERINVS in phoca vidit. Vena caua, ad arteriae morem, et squamis offeïs varia, et dilatata, et polyposa materie farta apud MORGAGNIUM.

ibid. l. antepenult. *post* hydropicorum *adde* in hypochondriacorum hominum

pag.

*k**) T. I. *Mém. exp.* 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. III. LAMVRE p. 542. 548. 551. 554. 555. 556. 542. WALSDORF p. 51. SPROEGEL de venen. p. 37. 76. 81. LORRY 308. 313.

pag. 335. not. l) *adde* *Mém. nostr.* exp. 78.

*m**) LAMVRE p. 548. 555.

*s**) Quod in vomitu fit SWIETEN *Comment.* III. p. 266. Sed vide L. VIII. in Cap. de vomitu.

*s***) Aut LORRY *Mémoire des Savans étrangers*, III. p. 312. 53.

*s****) Id. ib. p. 377.

pag. 336. not. *z*) et *u*) deleantur.

pag. 340. l. antep. ad verbum viscerum *adde* not. *d**) RIDLEY *obs.* p. 108.

pag. 340. l. antepen. haec *lege* hic

p. 342. l. 11. *post* salit *adde* In nuperis Cl. FRAIRIOT mensuris sanguis ex vena febrientis hominis missus ad 48, 55, et 61 lineas exfluit, et intra tria minuta sanguinis libra effluxit, apud VANVCCIVM.

ibid. l. 14. *post* tempus *adde* ex corde in cor

p. 343. l. 4. *lege* intra

p. 344. l. 21. *lege* subtripla

ibid. l. penult. quod *lege* quo

p. 350. l. 10. *adde* Vti post mortem venosi sanguinis motus superesse potest, ita multo euidentius lymphae motus superest. Ea enim, quando primum aperto in abdomine vasa sua pulcherrime distendit, sub oculis inspicientis incisoris solet quasi euanescere, constrictis, ut videtur, per frigus vasculis, et suam aquam propulsantibus. Vulnerato vase magna vis lymphae de laeso vasculo manasse visa est, quae adeo eminus aduenisset. Idem vasorum lacteorum est priuilegium.

SECTIO V.

PRESSIO LATERALIS SANGVINIS VENOSI.

Pag. 351. l. 15. *post* rarer sunt *adde* Sinus venosi durae matris profundas foveas caluariae imprimunt, quae in fetu et infante nullae fuerant. Varices pressionis lateralis effectus sunt, a qua denique non sine periculo rumpuntur.

p. 353. l. 14. *post* primo *adde* ne arterias quidem minores micare; maiores vero venas non salire, quod ad eas cordis vis cet.

ibid. l. 17. ea a venis vndique abest *lege* ea a venis maioribus abest i), minores vero ne arteriae quidem micant.

p. 355. l. 12. *lege* continuari

ibid. l. 25. *lege* in minimis porro et reticulatis vasculis natura tantum cet.

K 3

pag.

pag. 343. not. u) *adde* et in L. IV. Sect. IV.

pag. 351. not. l) *lin. 2. post* eiusmodi *adde* cylindros.

pag. 353 not. l) *adde* Eadem habet Cl. FOURNIER.

pag. 354. not. o) *adde* FOURNIER *Journal de Medecine* 1774. Iuillet.

pag. 356. l. 12. *post* solent *adde* vt sub costis spuris abdominis venae pulsarent *a*)*.

ibid. l. 21. *post* infarciretur *adde* A struma comprimente venam iugularem *g*)*.

ibid. l. penult. *adde* Frequentior iugularium pulsatio GALENO non ignota fuit.

Alia rarior causa visa tamen est, quando, HUNTERO potissimum auctore, arteria in venam inserta apertam varicem excitauit, quae ad aneurysmatis modum pulsabat *i*)*.

Frequentius fit, vt arteria subiecta venam succutiat, sic pulsus mentiatur. Exemplum in frontis vena Cl. CARRERE habet.

a)* Med. obseru. and enquir. III 13.

pag. 356. not. *f)* *adde* SAGAR *System.* p. 143.

g)* ARTHAUD, p. 10.

i)* Apud GESNERVM in not. ad PYRCCELLII librum *von der Kolik*, p. 39.

ELEMENTORVM PHYSIOLOGIAE

LIBER SEPTIMVS.

SECRETIO.

PRAEFATIO.

Est vt veniam petam, Lector Beneuole, quod et perbreuem libellum hic reddam, et vix quicquam habentem mei. Quando haec scripta sunt, anno fere cclcccLIII, theoria BELLINI, PITCARNII, BOERHAAVII per libros dominabatur, et per professorum pulpita. Etsi nunc, quae potissimum ad librum sextum, et hunc septimum pertinent, viderem veram demonstrationem non admittere, totumque meum laborem non vtilissime ponerem in librandis contrariis hypothesis, quarum plerumque neutra recipi posset, nunquam tamen ausus fuisset omittere, quae vbique aut docebantur, aut a FRANCISCO BOISSIER, aliisque nuperioribus aut latromathematicis, aut phrenicis viribus, et occultis qualitatibus addictis doctoribus refutabantur. Nunc multae harum litium conqueuerunt: nouae etiam hypotheses, aut seuera ab hypothesis abstinencia dominantur. In hoc ergo libro septimo de natura, causisque secreti in certo, neque in alio, organo certi liquoris non sustinui porro quicquam rimari, tueriue aut refellere. Quae scripseram breuia, ea reliqui, nouis hypothesis bonam artem noui obnuere. Quae de fabrica colorum dixi, ea vt vera, etsi forte non plena, immutata reliqui, cum nihil noui de iis organis nuper didicerim. Quae de muco experimenta Ultraiecti edita fuerunt, lubentissime legissem, nunquam autem ad ea legenda peruenire potui, quae infausta saepe libellorum academicorum fors est. Ita vale, parceque sua peccata vltro fatenti.

Bernae, d. XXX. Mens. Octobr. cclcccLXXVII.

SECTIO I.

H V M O R E S.

Pag. 360. l. 17. *post* perficitur *adde* ex quo vegetabilia omnia prodeunt, in quem omnia resoluuntur.

ibid. l. pen. *lege* terrae

p. 361. l. 2. *post* olei *adde* aliquid.

ibid. l. 27. *post* adhaerefcit *adde* A frigore non congelatur, vt mucus animalis potentissime hiemis inclementie refiftat. In aëre libero potius densatur, a phlogisto et ab aëre inflammabili fluidior fit g*). Ceterum cum aqua non facile miscetur g), in Cl. FORDYCE experimentis nuperis, etiamfi caloris vim addideris. Odore caret et sapore cet.

ibid. l. penult. *lege* Pariter ab igne, et a feruida non cogitur, neque in albumen abit.

p. 362. l. 2. *post* manserit *adde* nisi aqua dilueris.

ibid. l. 3. *post* minus *adde* quando aëre purus est.

ibid. l. 5. *post* abeat *adde* grumi fimiles, neque cum aqua miscendas

ibid. l. 8. *lege* Cum oleo non bene miscetur, cum mucilagine ex plantis melius, quae vtriusque naturae particeps fit.

ibid. l. 10. *post* ipsis *adde* mucus

ibid. l. 15. *lege* etiam mucum aut non cogit r), aut leuiter, siue purus cet.

ibid. l. 17. *post* imposuerit *adde* cum tamen gummi in aqua solutum cogatur.

ibid. l. antep. *post* visi sint *adde* in Cl. FORDYCE tamen experimentis lentescit, a debili vero acore non tangitur.

ibid. l. pen. *adde* nisi caustici fuerint.

p. 363. l. 11. *adde* Gummi arabicum ad ignem acidum liquorem dat.

p. 365. l. 3. *lege* in caueas amni, pectoris m) cet.

ibid. l. 5. *post* destillat *adde* humor etiam, vt puto, cerebri, quem cet.

ibid. l. 6. *post* exponemus *adde* quando de liquore ventriculorum cerebri quae-
retur.

pag.

g*) MOSCATI nuoue esperiente, p. 30.

pag. 362. not. h) *adde* BUTT p. 14.

ibid. not. r) *adde* Cogere tamen Cl. LASSVS de lymph. p. 30.

ibid. not. s) *adde* LASSVS cet.

ibid. not. r) *adde* soluunt LASSVS.

ibid. lim. ult. ad verbum odore *adde* not. t*) LASSVS l. c.

pag. 365. deleatur not. l).

- pag. 365. l. 19. *post* D V V E R N E Y *adde* vt etiam ad lympham relatum sit.
 ibid. l. antepen. et cum minerali --- candidumque *lege* ab acore minerali et vegetabili cogitur, et ab adstringentibus herbis *b*)*, a minerali vero acore in spissati albuminis naturam abit, porro insolubilem *b)*.
 p. 367. l. 6. *post* castoreum *adde* et glandularum ad anum quadrupedum vnguen,
 ibid. l. 10. *post* nati *adde* Vitellus enim oui fere totus quantus in oleum resoluitur, cuius in vnico oui vitello duas drachmas Cl. S P I E L M A N N inuenerit.
 p. 368. l. 10. *adde* Ita et pus, humor quidem nunquam non sponte natus, videtur ad miscellaneos liquores pertinere. Vidi quidem, sed in variolis, flammam concepisse, cum capillos ob insectorum copiam minister ambussisset. Inest tamen in eo lymphae species, et in aqua etiam frigida continuo soluitur, et si vtrique iterum absque mora fundum petit *u**)*. Effusum per moram perinde soluitur, tunc vero resorptum in sanguinem redit.
 ibid. l. 13. *adde* sericum, telam araneae, succum acidum formicae, erucarum.
 ibid. l. vlt. *adde* Sed etiam, quod minus sperares, vrina sua per signa conspicua non raro vomitu *e**)* reddita est, cum arteria emulgens vinculo intercepta fuisset; saluam etiam vrinosam *e***)*, et sudores vrinosos dicemus, qui de hominibus exhalant, in quibus legitimae lotii viae obstructae erant *e****)*.
 p. 369. l. 8. *post* abundauerit *adde* qui aberrat.
 ibid. l. 11. *post* compenari *adde* Saliuatione, vt vocant, inualecente, alius siccat, vrina parce fluit
 ibid. l. antepen. *post* obducitur *adde* aut oleo confricatur.
 p. 370. l. 4. *post* supprimit *adde* in meo dudum mecum consenscente morbo, quoties vrinae nimia copia mihi molesta est, opii vis eam moderatur, et subito ad quartam partem, etiam ad decimam reducit, dum perspirationem potenter mouet.
 p. 371. l. 5. *post* regurgitauit *adde* inque puero, cui penis conferbuerat.
 ibid. l. 18. *adde* Vir nobilis, ex militibus C A R O L I X I I, quem in perniciosis expeditionibus Norwegicis sequutus fuerat, idem elegantissime doctus, magnus

HOMERI

b)* L A S S V S p. 23.

c) *adde* L A S S V S.

pag. 366. lin. II. ad verbum lymphatica *adde* not. *k*)*. Eo refert Cl. L A S S V S.

*u**)* B O R D E V *malad. chron.* p. 579. R O E D E R E R *progr.* 1758.

*e**)* S A G A R *System.* p. 317.

*e***)* Id. ib.

*e****)* Dicentur L. XXVI.

pag. 369. not. *h)* *adde* B R A S S A V O L V S in principe.

pag. 370. ad verbum supplet in *textu* lin. 10. *adde* not. *s*)* S Y D E N H A M.

ibid. not. *x)* *adde* Plura dicemus Libro XXVII.

HOMERI admirator, meus inprimis amicus, cum ad beatum senium peruenisset, subito diro morbo suffocatus est, cum vrina suppressa in cellulosam linguae telam se effudisset, ut ea monstrose tumens spiritum interciperet.

pag. 371. l. 19. *post* exiit *adde* multis in exemplis.

p. 372. l. 3. *adde* Vrina retenta per cutem ab axillis ad inguina sudauit, cum viae naturales clausae essent *t**).

ibid. l. 19. *adde* Fluor albus sponte subnata saluatione solutus *u**).

p. 373. l. 1. *post* genere *adde* cum lympham mistum,

ibid. l. 2. *post* exiit *adde* et per aluum. Sic frequenter et salubriter pus variosum vomitu reiectum fuisse lego; et ne quis vias novas et vitiosas huic metastasi apertas fuisse obiciat, in empyemate verum pus de vena incisa fluxisse BELLOSTIVS testis est. Frequens malum est, in coniunctivae tunicae palpebrarum glandulis pus deponi, eius simillimum, quod ab impura venere per vrethram educitur.

ibid. l. 7. *post* exit *adde* etiam per plusculos menses.

ibid. l. ead. *post* diarrhoeam *adde* per vomitum alias, ut etiam acescentem naturam retinisset

ibid. l. 10. *post* obliniuit *adde* Idem in cellulosam telam effusum speciem abscessus fecit, in mesenterio, in inguine, in musculorum artuum interuallis: idem in pulmones depositum fuit, et demum per sudorem excretum. Per faciei pustulas effluxit idem, neque rarissime *l**).

p. 374. l. 8. *post* humoris *adde* in oculo

ibid. l. 11. *post* porro *adde* ut adulescunt,

*z**) Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. 10. obs. 73.

*u**) LANZON E. N. C. Dec. III. ann. 9. 10. obs. 140.

*l**) Journal des Savans, 1690.

SECTION II.

ORGANORVM SECRETIONIS, SIVE COLORVM, FABRICA.

- P** ag. 375. l. 5. *post* humorem *adde* oculi
 p. 376. l. 20. *post* euidentissime *adde* hae fibrillae
 ibid. l. 24. *post* parotis *adde* et lacrymalis,
 p. 377. l. 8. *post* magnas *adde* non ea vndique glandularum conglomeratarum
 similis.
 p. 380. l. 6. *post* cochleis *adde* in istis ipse etiam SWAMMERDAMIUS:
 p. 382. l. 5. *lege* Si in eiusmodi glandulofum agmen nunc oculos dimiseris, vide-
 bis acinorum viciniam sensum laxari, vt demum cet.
 ibid. l. vlt. *adde* vt in rene nimis pene felix LITTRIVS, qui et renis solitarias
 glandulas vidit, et cuiusque neruum, et arteriam, et venulam, et excreto-
 rium ductum.
 p. 388. l. 16. *lege* glomere
 p. 390. l. 8. *post* comprehendit *adde* et quas non bene clari viri pro dilatatis
 glandulis habuerunt a*).
 ibid. l. 11. *post* ouaria *adde* in omnium viscerum extrema planitie, et peri-
 tonaei.
 ibid. l. 13. *lege* in exteriori ambiente membranae costas succingentis g) cellulosi-
 tate, in pulmone h), hepate.
 ibid. l. vlt. *post* manauit *adde* inque aliis exemplis de lumbis, de abscessu supra
 vmbilicum.
 p. 391. l. 13. *post* pertineret *adde* In vtraque maxilla Cl. HEVERMANN u)
 ibid. l. 14. *post* materies *adde* Ab hepate hydatides fuerint, quas aegri vomitu
 et per aluum reiecerunt.
 p. 392. l. 20. Hypothesin Cl. viri - - - pro vermium opere habuit *lege* Hy-
 datides, quas pro vermium opere Cl. TYSON habuit h), pertinent ad miri-
 ficum animal, nuper etiam a Cl. PALLAS descriptum, cuius pars cylindrus
 est, pars bulla.
 p. 393. l. 19. *post* vti *adde* $\frac{1}{2}$
 ibid. l. 22. *lege* vti

L 2

pag.

pag. 375. not. z) *speciat ad verbum* depluit in *textu* lin. 8.

pag. 377. not. u) *lege* WINTRINGHAM p. 213.

a*) Refert etiam Cl. HEVERMANN *Vntersuchung*, p. 302.

u) l. c.

pag. 393. l. 28. *lege* pedes 390 p), describet in minimo vasculo pedes 19 $\frac{1}{2}$, siue lineas 2508: in folliculo vero $\frac{2508}{237225}$, siue paulum supra centesimam lineae partem; atque adeo tribus cet.

p. 395. l. 6. *lege* valens

p. 398. l. 14. *post* vesiculis *adde* stagnat,

p. 399. l. antep. *post* reperiuntur *adde* et in lepore marino a Cl. BOHADSCH visae sunt.

p. 401. l. 14. *post* folliculis *adde* aliud in glandulis ventriculi struthiocameli p*).

p. 402. l. 2. *post* coalescunt *adde* Eiusmodi sunt sinus mucosi piscium apud LORENZINUM.

p. 405. l. 20. *lege* metatarsi

p. 405. l. ult. *lege* continuis fere quinquaginta diebus

p. 411. l. 4. *adde* alteriusque affinis animalis, quod BVFFONIVS *Zibet* vocat.

ibid. l. 7. *adde* Ad hanc classẽ pertinent cryptae odoriferae, quae in proprios faccos castoreum, vnguentum Zibethi et gliris moschati componunt. Hae enim glandulae saepe simplices, alias tamen, et in animali Zibetho affini ad genus compositarum referendae, per proprios ductus vnguen suum in magnam caueam deponunt, in qua asservatum vi musculari, etiam adiuuante mechanica demum fricitione educitur.

ibid. l. 20. *post* viscera *adde* et membranas

ibid. l. antepenult. *post* generant *adde* membranae aquam, lympham.

p*) VALISNERI *notomia d'un struzzo.*

pag. 411. not. c) *spectat ad verba reperta sunt in textu lin. 3.*

S E C T I O III.

CAUSAE QVAE FACIUNT, VT IN DEFINITAE FABRICAE ORGANO
SVVS CONSTANTER HUMOR DE SANGVINE SEPARETVR.

Pag. 412. l. 7. *post* accedendum *adde* Iterum monitum hic volo lectorem, non vera et euicta me proponere, sed ea, quae a viris doctis in his tenebris probabiliora dicta sunt.

ibid. l. 11. *adde* nisi raris cum conditionibus.

p. 414. l. 2. *afferri lege* demonstrari

ibid. l. 21. *post* potentius *adde* humor

p. 415. l. 5. *adde* Nempe in caput nonnullae particulae viscidae veniunt, in abdomen nonnullae volatiles descendunt, sed in caput plures volatiles, imbecillae plures et aquosae in abdomen. Sed vide alias aut dicta t**), aut dicenda t***).

p. 416. l. 21. *lege* inter vuae vero membranae floccos,

ibid. l. antep. ferum *lege* semen

p. 418. l. 8. *lege* proxime

p. 420. l. 17. *post* excludet *adde* haecenus

ibid. l. 18. *post* praeculantur *adde* crassiores dico non viscidas particulas.

p. 421. l. 15. *lege* longitudinem

p. 422. l. 7. *post* colligantur *adde* vt alaudas Lipsienses intra vnicum diem STALLVS pinguescere scripserit.

p. 424. l. 22. *post* sunt *adde* penicillorum arteriolae

ibid. l. 23. *post* innotuerunt *adde* ab ill. viro I. F. LOBSTEIN nuper confirmatae

p. 425. l. 10. *lege* et inter se, et cum trunculo parallela, progrediuntur.

p. 426. l. 8. *post* cingunt *adde* alium denique, qui pulcherrimus in vitreo corpore picium ex duabus diuaticis arteriis nascitur. Porro circuli vasculosi, ex quibus circulus vitelli, cet.

ibid. l. 2. vt arteriolae a truncis - - - se immittant *lege* aut sub quibus a truncis suis rectis natae, suas pariter in venas se immittere dicuntur, eas quidem cet.

p. 428. l. 15. etiam, *lege* molecularum

L 3

pag.

t**) Libr. V.

t***) Libr. X. c. I.

pag 427. not. c) *lege Oper. min. II. p. 345.*

pag. 428. l. 22. *lege* Ita per porum secundae classis molecularum capacem, excluso cer.

ibid. l. pen. inconspicua *lege* molecularae inconspicuae

p. 430. l. 9. *post* angustum *adde* flexilemque

p. 436. l. 14. *post* fetus *adde* Haec ut per mea experimenta didici, ita gaudeo hactenus a summo viro *Iohanne SVAMMERDAM* occupata esse, ut ranularum iuniorum bilem inspidam esse annotaverit.

p. 438. l. 20. *lege* sensilissimorum nervorum duorum colliculorum in parte inferiori nascentis glandis positorum, tunc semen non absque violentia exsilit.

ibid. l. 24. *lege* comperies.

p. 440. l. 11. *lege* humor

ibid. l. pen. famosa *lege* lacrumosa

p. 442. l. 10. *post* separari *adde* inspidos passim et inodoros flores esse, femina aromatica; alias in foliis aroma habitare, femina fatua esse.

p. 443. l. 4. *lege* excernantur,

p. 444. l. 16. *post* totusque *adde* in receptaculo

p. 445. l. 12. *post* quae *adde* in alui faecibus

p. 446. l. 2. *dele* causa

ibid. l. 12. *adde* In animali zibethico duo sunt sacci vnguentiferi maiores, in eos minores alii aperiuntur, in eos cryptae simplices a*).

p. 447. l. 18. muro *lege* contractili villo

ibid. l. 20. *post* idem *adde* ductus

p. 448. l. 12. *post* vi *adde* incitata,

ibid. l. 15. *lege* copia

p. 449. l. 2. *lege* idem mucus aquula mera est.

ibid. l. 12. *lege* sed dilute flavum

p. 450. l. 8. *lege* folliculo

ibid. l. 18. *post* replet *adde* aprorum et ceruorum.

p. 452. l. 3. *post* latex *adde* in venulas

ibid. l. 12. *post* quam *adde* in

ibid. l. 26. *post* demum *adde* halitus

p. 453. l. 7. *post* massae *adde* cibariae

p. 454. l. 19. *lege* colligi

ibid. l. 23. humanitatis *lege* novi animalis

p. 456. l. 16. *lege* ex America r)

p. 459. l. 8. *lege* interceptarum

a*) Apud BUFFON.

pag. 453. not. g) *adde* BUFFON *histoire naturelle* T. V. p. 21.

- pag. 459. l. 13. *post aliquibus adde* harum conditionum
 ibid. l. 17. *post infinitum adde* variari, et
 p. 462. l. 13. *lege* halitu
 ibid. l. vlt. *lege* biliarem
 p. 463. l. 18. *post* intortos *adde* vehitur
 p. 464. l. 20. *post* celeremque *adde* Aucta sanguinis penu per transfusionem,
 aucta lotii vbertas.
 p. 465. l. 12. *adde* Et omnino solus calor aquam in mucum, hunc in oleum,
 aut refinam excoquit.
 p. 466. l. 14. *lege* cordi, ventriculo, testi, lieni, hepati assignat,
 ibid. l. pen. *lege* subituras
 p. 470. l. 28. *post* particulis *adde* acceptum
 p. 473. l. 9. *lege* qui
 ibid. l. 10. *lege* piena
 p. 474. l. 11. *post* continuo *adde* ea vascula
 p. 479. l. 14. *lege* vitrioli
 p. 484. l. 7. *lege* vir Clar. caute ad neruos cet.

pag. 461. not. z) *lege* Serum in hypothesi LEALIS et BOERHAAVII.

pag. 480. not. u) lin. vlt. Idem *lege* BUFFON

pag. 484. not. f) *adde* L. XXIII.

AVCTARIVM
AD
ALBERTI HALLERI
ELEMENTA
PHYSIOLOGIAE
CORPORIS HYMANI


EXCERPTVM
EX NOVA EDITIONE
ET ADAPTATVM VETERI.

FASCICVLVS TERTIVS.

RESPIRATIO. VOX ET LOQVELA.

LIPSIAE ET FRANCOFVRTI,

MDCCCXXX.



ELEMENTORVM
PHYSIOLOGIAE CORPORIS HVMANI

T O M V S T E R T I V S .

PRAEFATIO EDITORIS.

Cum iam id ageretur, vt sextum, septimumque nouae *Elementorum Physiologiae* editionis volumen de prelo prodirent, obiit morbo fractus atque laboribus illustris Auctor, cuius summum ingenium, indefessum in inquirendo vero ardorem, vastissimam eruditionem, innumera de re medica merita tota Europa admirata est, grati nepotes recordabuntur. Eo casus iste acerbior accidit, quod nondum essent absoluta duo eius praeclarissima opera *Bibliotheca medica*, atque noua *Physiologiae* editio.

Illam absoluat, qui tanto labori parem se sentiet. Hanc ad finem perducere eo libentius in me suscepi, quod extet in aduersariis Ill. Defuncti immensa annotationum physiologicarum copia, quibus nouam editionem ditare sibi proposuerat, vt nihil aliud mearum partium futurum sit, quam earum quamque suo loco inferere. Cum enim per decem fere annos summa eius familiaritate vsus fuerim, aegrotantem ad diem vsque supremum curauerim, ita mihi manuscripta eius, paucis praeterea legibilia, nota reddidi, vt, quod alteri foret difficillimum, id mihi gratum futurum sit, atque iucundum. Neque laudis aliquid ex ea re mihi vindico. Ratus sum, id me manibus viri debere, quem dilexi vt patrem, vt aliquod saltem summi mei amoris erga illum monumentum extaret.

De hoc volumine pauca sunt, quae dicam. Multa in eo mutauit, multa addidit HALLERVS, praesertim in iis, quae aëris spectant naturam, atque eius in humanum corpus efficaciam. Ill. Auctori mens erat, nuperorum praeclara inuenta de vario aëre fusc ac dilucide pertractare, vtpote cuius doctrina magni sit in explicandis respirationis phaenomenis atque vtilitate ponderis. Dolendum vero, hanc tractationem in nouissima eius tempora incidisse, in quibus propter soporem fere perpetuum, atque languorem, quo premebatur, adeo non valuit typographorum errores, eo grauiores, quod optimi senis tremula manus litteras aut nullas, aut pessimas pingeret, corrigere, vt in pluribus locis textus penitus corruptus esse videatur. Totas enim sententias aut nullo nexu cohaerentes, aut quae intelligi minime queant, reperies. Cui malo non amplius licuit medicinam adhibere. Ignosce haec, Beneuole Lector, neque summae operis

aliquid inde aut dignitatis, aut pretii detractum esse existimato. Potius illi viri memoriam reuerere, qui tuis commodis inferuendi desiderium, atque laboris amorem non nisi cum vita deposuit.

Bernae, d. XVI. Mens. Ian. cloccccLXXVIII.

LIBER OCTAVVS.

RESPIRATIO.

SECTIO I.

THORAX.

Pag. 4. l. 14. *adde* In medio corpore vertebrarum cauea reperitur *b*)* tenaci humore plena.

p. 5. l. 6. *lege* tredecim in dorso sunt,

ibid. l. 10. *adde* rarius vndecim

ibid. l. 11. *adde* Auiibus pauciores, quam homini, costae sunt, in earum maxima vtrinque septem, nempe in struthiocamelo.

Quadrupedibus ab 11, quas in vespertilione BVFFONVS numerat, ad 20 vtrinque in elephanto ascendunt, plerumque tamen plures, quam duodenae sunt, etiam in pygmaeo tredecim Quadrupedibus frigidis 18 ad 24.

Piscibus numerosae ad vsque octogenas.

ibid. l. 12. *lege* Commune

p. 6. l. 5. *lege* et caueam aliquam pro pulmonibus fundant

ibid. l. 15. *post* vocant *adde* quam neque ego vidi, neque TREWIVS, articulatione aliqua mobili cum parte ossea committi

ibid. l. 18. *post* ossescere *adde* et sero id malum accidit,

ibid. l. 19. *post* fuisse *adde* Et plerumque ab ea degeneratione respiratio laeditur. Vifae sunt etiam in iunioribus, et in septemdecenni puella osseam naturam induxisse.

pag.

pag. 4. not. b) *adde* Fourn. des savans, 1699. n. 21. HUNAVLD diff. de ancylos. 1742 RVYSCH Thef. V. T. III. f. I. 2.

b*) RVYSCH Thef. V. T. III. f. I. 2. Thef. IV. n. 63.

pag. 5. not. n) *adde* EDW. TYSON The anatomy of a pigmy.

pag. 6. not. a) lin. 7. *adde* Durissimas subinde in mente capitis reperit GREDING in Adversar. LUDWIGII, III. p. 4. Durae in femina, cui vena caua ossea facta, CRUWEL cord. et vef. ossificat.

- pag. 7. l. pen. *lege Quinta*
 p. 8. l. 7. *lege Septimae*
 ibid. l. 16. *post* *in*sculpi*tur adde* vt ant*erius* nullus sit.
 p. 11. l. 17. *lege* nutasse
 ibid. l. ult. *lege* pene omnibus, quantum cet.
 p. 12. l. 6. id *lege* in
 ibid. l. 15. vna *lege* ima
 ibid. l. 17. definit *lege* protegit
 p. 12. l. 12. *adde* Quarta ab hac prima sterni parte alteram totam in adulto homine distinctam fuisse Cl. VELSE vidit.
 ibid. l. antepenult. *lege* Basileae
 ibid. l. ult. *adde* et nuper Cl. vir G. van DOEVEREN
 p. 15. l. 2. *post* sine *adde* appendicem
 ibid. l. 8. *post* negat *adde* SANCTORIVS et
 ibid. l. 9. *post* longitudo *adde* nimia
 p. 19. l. penult. tum super eam et infra *lege* atque super eam costam decrescat, et infra
 p. 22. l. 2. *lege* sexcentarum
 ibid. l. 3. *post* tolerari *adde* et ictus malleorum eo minus incommodos esse, quod inus ponderosior fuerit.
 ibid. l. 11. *adde* Lego tamen, cum reus in Anglia respondere recusaret, impossitas ex lege quadringentas libras eum aegre supportasse, periisse demum, cum male pertinaci noua pondera imponerentur.
 p. 25. l. 2. *lege* minora
 p. 26. l. penult. *lege* augeri
 p. 27. l. 24. *lege* Margines
 p. 28. l. 24. *post* cocti *adde* musculi
 ibid. l. antepen. *post* animalibus *adde* etiam cetis
 p. 29. l. 5. *lege* cuius fibris idem,
 p. 30. l. 12. *lege* continuata.
 p. 31. l. 3. *dele* nudum
 ibid. l. 5. *lege* in quo spatio soli cet.
 ibid. l. 10. *post* contrario *adde* cum externis
 p. 35. l. antepen. *adde* Tanta vi musculi intercostales in equo egerunt, vt baculum costis interpositum fregerint u*).

pag. 13. not. u) *lege* p. 7.pag. 14. not. r) *adde* Longa et trifida GREDING ap. LVDWIG *actuerf.* III. p. 4.u*) DVERNEY *posth.*

pag. 37. l. 11. *lege* sibi

ibid. l. 12. *adde* Hugo GOVRAIGNE*)

p. 38. l. 16. *adde* inter iatromathematicos etiam Cl. PEMPERTON, inter experimentorum auctores Cl. ARNSTEIN. Nam in Cl. TRABVCCHI experimentis multa sunt, quae intercedunt, ne ea aut probare ubique possun, aut velim refutanda sumere.

p. 39. l. 3. *lege* sit

ibid. l. 15. *dele* debilitabitur eius actio ex ea ratione, *et lege* non inuertetur eius actio, debilitabitur autem cet.

p. 40. l. pen. *post* dum *adde* costa prima

p. 41. l. 2. *lege* vti 1 ad 8

ibid. l. 5. *post* et *adde* ductam in eam firmitatis praerogatiuam

ibid. l. 16. *post* intercostalis *adde* inter

ibid. l. 26. *lege* Plena

p. 42. l. 12. semper *lege* eadem

p. 43. l. 9. quod hic obseruari oportet, *lege* quod inde sequitur

p. 44. l. 9. *post* eas *adde* inferiores

ibid. l. 12. *post* cur *adde* Natura

ibid. l. 16. motus *lege* ortus

p. 46. l. 19. *adde* Duos etiam vidit Cl. P. A. BOEHMER

p. 49. l. ult. *lege* et vtramque vocem

p. 50. l. 19. *adde* et Ill. CALDANVS

ibid. l. ult. *adde* Caput a dextro obliquo suo minore ad latus ductum sinister mastoideus restituit p*)

p. 51. l. 16. Omittunt hanc - - - me legisse omnes *lege* Haftenus adeo mastoideus poterat pro extensore numerari capitis, vti reperio COWPERVM numerasse, et Cl. le CHAT de la SOVRDIERE, et QUELMALZIVM et Antonium PETIT.

Ab eius tendine fibrae ad cartilaginem ensiformem euntes, proprium fere musculum faciunt q*).

pag.

g*) De respiratione.

pag. 37. not. o) *adde* GOVRAIGNE, SAVVAGES cet.

ibid. not. y) *adde* de natura homin. p. 32.

pag. 38. not. a) *adde* Nuper etiam Monspelienfes contra Francisci de SAVVAGES placita, vt video ex DARSEES *diff. de respiration.*

ibid. not. c) *adde* tum in Oper. min. T. I.

pag. 43. not. c) *adde* Confer, si viderur l. de respiratione in operum minor. T. I. Lausann.

1762. 4.

p*) GOVEY, p. 183. 184.

q*) P. C. FABRICIVS *method. secund.* II. ad p. 20.

pag. 53. l. 19. *lege* inseparabili

ibid. l. 21. *lege* curuatura

p. 54. l. 16. *lege* quam cum binis prioribus supremis

p. 57. l. 10. *adde* Dixi plures esse recti musculi partes. Vidit olim RHODIVS; vidit Cl. BOEHMER teretem musculum ab eo ad brachialem internum accessisse. Vidit Cl. olim noster HYBERVS fasciculum alium medium inter eius duas partes, clavicularem et sternalem, alias a prima costa et a secunda, alias a costa vltima, et a prima, aque sterno, vsque ad cartilaginem quintae costae ortum, tegentem musculum pectoralem, eundem decussantem, eique insertum.

ibid. l. 20. *post* stabile *adde* aliquod

p. 58. l. 15. *post* potius *adde* laboribus

p. 59. l. 17. is *lege* inde

p. 61. l. 19. *lege* iens

ibid. l. 21. *adde* Quater ad occiput ascendisse MORGAGNVS vidit o*).

p. 62. l. 16. *lege* remotus

p. 63. l. 18. *lege* Superior quidem et minor *columna* ad eam coniunctionem cet.

p. 64. l. 1. *post* indigeat *adde* vti neque ALBINVS existimauit indigere, neque MORGAGNVS.

p. 65. l. 13. *adde* Corporis vniuersi super peluim rotationem, quae fit consentiente obliquo externo vnus lateris, et externo alterius lateris, olim FALLOPIO dictam et CAIO z*), et GLISSONIO z**), demum et Riolano z***).

p. 67. l. 2. *adde* Paulo aliter nuper Cl. LIEVTAUD. Aponeurosis posterior dat primam laminam anteriorem, deinde ad oram anteriorem musculi recti finditur in duo folia: prius abiturum in aponeurosin maioris obliqui: alterum in aponeurosin transversam. * Illud legit duas tertias musculi recti, et terminatur in vltima intersectione. Lamina posterior non descendit infra vmbilicum. Pars anterior, inferior, obliqui minoris tertiam inferiorem aponeuroseos recti partem tegit.

p. 68. l. 7. *post* processibus *adde* lumborum

p. 70. l. 4. annulum habet *lege* funiculum transmittit.

p. 71. l. 6. *post* constituendum *adde* rectus

o*) *Aduers.* II. p. 38.

z*) Apud RIOLANVM p. 337.

z**) Nuper Cl. SABBATIER *Anat.* I. p. 254.

z***) In venere, in iis, qui natibus incedunt, p. 325. 326.

pag. 66. not. x) *adde* SABBATIER I. p. 258. qui BERTINO inuentam tribuit annotationem, sed ALBINI iura antiquiora sunt.

- pag. 72. l. 11. *post* Idem *adde* Similia etiam passim; sed singula fere exempla video citari apud CABBROLIVM, et amicos nostros P. C. FABRICIVM et WILLICHIVM h*). In sternum aponeurosi continuatum vidit Cl. SABBATIER h**).
- p. 73. l. 21. *adde* tunc inprimis apud Cl. CHARDENON s***), quando obliqui corpus circumagunt s***), ut concorditer obliqui et recti, tanquam musculus triceps, agant s****).
- p. 74. l. 8. *post* aliquid *adde* et imperfectum
- ibid. l. antepen. *post* producit *adde* Sic ab aëre vitio nato f**).
- p. 77. l. antepen. *post* primo *adde* transverso
- p. 78. l. 4. *adde* Arcus etiam duos ROEDERERVS dixit, internum a capite tertio ad processum transversum primae lumborum vertebrae; externum ab insertionem in primam vertebrae dorsi, ad ultimum apicem costae tertiae eundem, tamen ut fateatur, alterutrum arcum saepe deesse. Prima vero, quam dixi, portio saepe cum quadrato fibras aliquas confundit.
- ibid. l. 10. *lege* qui psoam transmittit.
- p. 82. l. 3. *post* distare *adde* Paulo aliter iterum SANTORINVS.
- ibid. l. 12. *adde* Eam arteriam raro exemplo MORGAGNVS fere per foramen tendinei centri transiisse vidit.
- p. 83. l. 3. *post* hepaticis *adde* Cl. etiam HUBERVS vidit, duo fuisse foramina, per quorum anterius idem magnus truncus venarum phrenicarum transit, per alterum vena cava.
- ibid. l. 5. *lege* reperimus
- ibid. l. 14. *post* dorsalibus *adde* natus, et

pag.

h*) In disputat. inaugurali.

h**) Anat. l. p. 255

s**) *Memoir, de Dijon*, T. I.

s****) p. 110.

s****) SABBATIER Anat. T. k.

pag. 74. not. b) *adde* Nihil carnosum in piscium spinosorum diaphragmate esse VICQ d'AZYR *Memoir, des sav. étrang.* T. VII. p. 29.f**) Apud GREDINGIVM in LUDWIGII *Adversar.* III. p. 4.pag. 77. not. g) *adde* SANTORIN. *posth.* T. X.ibid. not. n) *adde* Appendices duabus non plures habet SANTORINVS *posth.* T. X.pag. 79. not. i) *adde* Vnicam SANTORINVS T. X.ibid. not. u) *adde* Pulchre expresserunt ALBINVS et SANTORINVS.pag. 80. not. v) *adde* SANTORIN.pag. 81. not. d) *adde* SANTORIN. c.ibid. not. g) *adde* SANTORIN. d.ibid. not. m) *adde* SANTORIN.ibid. *ad verbum* appendice in *textu* lin. ult. *adde* not. o*) Alae sinistrae fibrae paulo aliter apud SANTORIN. l. 1.

- pag. 83. l. 18. *post septi adde* transuersi
 p. 85. l. 7. *adde* retrosum minus.
 ibid. l. antepen. *adde* Cl. TRABVCCHI planum fieri negat, quod non viderit
 ipse; sed ego et planum, et deorsum conuexum vidi.
 p. 86. l. penult. *lege* extrorsum,
 p. 87. l. ult. *adde* Et vicissim in expiratione tumere eandem et repleri.

Non vidi, alijs tamen testis adest, etiam aortam arteriam inter carneos
 diaphragmatis fasciculos constrictam fuisse, dum septum transuersum vehemen-
 ter descendebat.

- p. 89. l. 8. *post immiscuisse adde* Testis huius rami Gottingae ostensi est Cl.
 HYBER m*).
 p. 90. l. 7. *adde* Cl. viri CAMPERVS et COOPMANS viderunt, per ipsam ve-
 nam subclauiam inter eius membranas descendisse.
 ibid. l. 16. *post ramo adde* furculus
 p. 91. l. 18. *post longo adde* colli
 p. 92. l. antep. *lege* vehementer compresso
 p. 93. l. 1. *lege* quoad earum aliquid ad hunc musculum pertinet:
 p. 94. l. 13. *adde* Dextram ex renali sinistra MECKEL u*).
 p. 95. l. 4. *lege* inosculatos.
 p. 96. l. 6. *lege* furculi tendunt superiores; alter p) ex quarto fere cet.
 p. 97. l. 13. retro *lege* pone
 p. 100. l. 19. *adde* et demum bronchialem dextram a*).
 p. 101. l. 11. *post sequuntur adde* duaeque hic arteriae vni venae respondent.
 p. 102. l. 14. *adde* Arterias intercostales sex ex tribus trunculis ortas vidit Cl.
 POHLIVS e*).
 ibid. l. 19. retro *lege* pone
 ibid. l. 20. retroque *lege* poneque
 p. 103. l. 8. *post ligamentum adde* hepatis
 p. 105. l. 6. *lege* et dextri cum sinistris, et vtrique cum diaphragmaticis cet.

pag.

pag. 83. not. h) *adde* Apud SANTORINVM l. c. in vtroque latere.

pag. 88. not. i) *adde* GOVRAIGNE de respiration.

ibid. ad verbum principis in textu lin. 9. *adde* not. k*) PRESSAVIN.

m*) In tract. de medulla spinali.

pag. 93. not. i) *adde* Cl. CAMERARIVM in tribus dissert. medic. 1694. 3.

u*) Epist. ad me 121. p. 356.

a*) HYBER Act. Helvet. VIII. p. 81.

e*) Obseru. angiolog.

pag. 106. l. 8. *lege* aut duos, aut tres ramos intercostales

ibid. l. 14. *lege* et alii cum mammariis circuli

p. 107. l. 13. *post* vitulo *adde* equo secundum LANCISIVM

ibid. l. 15. *post* rarissimae sunt *adde* In boue subinde duas esse venas azygas lego, sinistram in coronariam aperiri, dextram in venam cauam inferiorem *b*)*.

Criceto duae sunt, sinistra maior *b**)*.

ibid. l. penult. ea *lege* eo

p. 108. l. 11. retro *lege* pone

ibid. l. 15. *post* membranis *adde* venulas

ibid. l. 17. *lege* Fuit, vbi vena sine pari secundam bronchialem cet.

p. 109. l. 3. *lege* azyga

ibid. l. 17. *post* intercostales *adde* arteriae

ibid. l. pen. vena *lege* venas

p. 110. l. 3. *post* corpore *adde* vertebrarum

ibid. l. 15. *post* incidi *adde* Denique est, vbi ad renalia vsque vasa maior esset, quam vena caua.

SECTIO II.

PARTES THORACE CONTENTAE.

Pag. 114. l. 13. COWPER *lege* CAMPER

p. 115. l. 8. *lege* vt in tres, aliquando etiam in quatuor cet.

p. 116. l. 18. *lege* exteriorem

ibid. l. 20. *adde* Antequam enim thymum vulneraueris, nihil vere caui adest, praeter intervalla lobulorum; vbi laesisti, aër in cellulosam telam subiens caueam facit, quam natura non praeparauit. Quae vero cauea videtur, lobulorum ea intervallum est.

p. 118. l. 8. *adde* Vasculum semel I. Adam KVLMS visum potuit, cum pellucidum fuerit, lymphatici generis fuisse.

ibid. l. 19. *adde* Tamen magna pars thymi extra pectus est in iugulo.

p. 119. l. 13. *post* insident *adde* In iis cellulis hydrops aliquando visus est, de eo genere, quod veteres *ανασπασμα* dixerunt, ab eo diuersus, qui fit aquis in pectoris caueam effusis.

pag.

b)* BOVRGELAT Supplement, p. 102.

*b**)* SVLZER Versuch einer Naturgeschichte des Hamsters, p. 63.

p. 120. l. 3. *post* pertinet *adde* magis, quam alios vapores, alcalinae naturae indicia praebere, et syrupum violarum tingere LASSVS x***).

In febris frequenter pulmonem, pleuram, pericardium, cor eiusmodi obduci crusta ex lymphâ factâ Cl. LIND x†). Idem vitiose cet.

ibid. l. 7. *post* lateret *adde* Cuius etiam mali innumerabilia exempla collegi. Sebacea lardosa crusta pulmonem obducens et pleuram z*).

ibid. l. 17. *adde* Hydrargyrus in arteriam pulmonalem ovis iniectus per pleuram exsudavit d*).

p. 122. l. 11. *adde* Haec pulmonis cohaesio, post morbos inflammatorios pectoris et pulmonis, frequens subnascitur, ut eo loco ad pleuram adhaerescat, quo inflammationem passus est. In asthma etiam, et pectoris hydropse pulmonis ad latus affixus visus est.

Verum etiam in sanissimis hominibus pulmo pleurae adhaerens reperitur, potissimum etiam in adultioribus. Ita, ut practicas annotationes omittam, Paulus SORBAIT et Ios. LIEVTAUD, Archiatri comes, et H. VYLHOORN, et olim A. PICCOLHOMINVS atque Franciscus GLISSON, ut paucos ex multis recenseam. In animalibus id vitium rarius est.

p. 124. l. ult. *adde* In infante, cui equidem pectus pulmonis vitio apertum erat, aer in eius cauo fuit z*).

p. 125. l. 11. *lege* vulnere in pectus penetranti

p. 127. l. 6. *adde* Olim GALENVS in moribundo animali pulmonem a diaphragmate discedere per experimentum affirmavit tantum, quod tunc discellus in parua respiratione minor sit q*).

p. 128. l. 20. *post* effunditur *adde* quae pectus diuidunt.

ibid. l. 22. *adde* Liceat hic perpulchrum nuperorum clariss. virorum inuentum describere Petri CAMPERI b*), et I. HUNTERI b**).

B 2

racis

pag. 120. *ad verbum* coagulabilem in *textu* lin. 2. *adde* not. x**) LASSVS, Cl. COTVNVS exhalare scripsit, et vitio coagulabilem fieri *Ischiad. nervos* p. 24. Apparet coagulabilem naturam a Cl. viro agnosci, verum humores nostri putrescendâ ex coagulabilibus aquosi fiunt, nec vicissim.

x***) Idem, p. 21.

x†) LIND *fever and insect.* p. 282.

z*) GREDING *Advers.* III. p. 4.

d*) *Amstelod. coll. priu. obs. anat.* II.

pag. 122. *ad verbum* religare in *textu* lin. 6. *adde* not. s*) In tertia parte cadaverum adhaerentem reperit GREDING apud LUDWIG III. p. 4. nempe in mente captis, aliisque miseris captiuis.

z*) DINKLER apud SANDIFORT, *Bibliothek*, II.

q*) *Admir.* VIII. 5.

b*) *Mém. présentés*, VII. p. 320. *Hedenlaagse Letter - Oefening.* IV.

b**) *Philos. Transf.* LXIV.

racis cauea in auibus continetur, idem in auium alte volantium, vt in Pelicano, vniuersa ossa longa alae, femoris, in sterni caueam, in maxillam inferiorem, in vertebrale cauum, in cellulas cranii continuatur, quibus in ossibus nulla medulla est. Diaphragmate etiam perforato cauea thoracis cum abdominis cauo consentit. Sed etiam in cellulosas telas colio, oesophago et asperae arteriae circumpositas aër exit, vt in vniuersum cellulosae caueae, et pariter ventres, et ossium tubuli aëre ita replentur, vt ex vno cauo in omnia fere aditus sit.

In auibus minus alte volantibus aër in pauca ossa longa subit, vt in gallina solum in humerum, et demum in auibus vix se eleuantibus pauca ossa caua aërem recipiunt.

In vniuersum tamen haec aëris in vniuersas corporis caueas abundantia aves leuiores reddit, eo leuiores, quo calor earum insignior sit, vtique adeo aër in earum corpore rarefit. Negauit vir clar. verum si velit negare, hunc fuisse naturae praefinitum finem, rem tamen ipsam non negauerit, leuitatemque, quae non potest ab animali abesse, cuius areae magna pars aëre fiat, qui milles, et vltra partibus solidis leuior sit.

pag. 129. l. 2. *post* Dudum adde aërem ex pulmonibus in pectus exire negauit GALENVS c*);

ibid. l. 10. *adde* et CL. MASON

ibid. l. 18. *adde* et Antonius PORTAL in suis experimentis, vt neque inspiranti animali, neque expiranti pulmo pleuram deferat.

p. 130. l. 16. *lege* recolere

ibid. l. 20. *lege* pleuram

p. 131. l. 16. *post* aperueris *adde* In viuo homine exemplum est pulmonis de pleura fugientis continuo, cum pleura perfossa fuisset apud GOOCH.

p. 132. l. 5. *adde* Nuper etiam in Anglia clari chirurgi experti monuerunt, per vulnus receptum aërem inter pulmonem atque pleuram retentum pulmonem comprimere, respirationem reddere difficillimam, vt laeso homini paracentesi subuenire neceffe sit, qua infestus aër emittatur, de cuius inuentu gloria etiam lites exarserunt. Is ergo pectoris status, quem aduersarii nostri pro naturali habent, manifesto naturae aduersus est, vt etiam periculosum auxilium requirat.

In cadauere a CL. GREDING inciso; cum aër vitio natus in pulmone esset, diaphragma de sua sede versus hepar detrusum fuerat z*).

pag.

c*) *Admir.* VIII. 5.

pag. 129 ad ALBINI nomen in textu lin. 9. *adde* not. k*).

z*) Apud LVDWIG *Advers.* III. p. 4.

pag. 134. l. 3. *post* FLOYERI *adde* et Cl. CIGNAE in pulmone cuniculi infecto aëre occisi.

p. 135. l. 10. *post* imitati sunt *adde* et vir iusti apprime iudicii Radulphus BATHVRST.

ibid. l. 18. *adde* Deinde in morbo aërem inter carnem pulmonis et eius velamen effusum vesicas excitasse vidi, neque exitum inuenisse.

p. 137. l. 5. expedit *lege* exserit,

p. 139. l. 16. *adde* In animalibus quadrupedibus calidis pulmo mobilis est, qui thoracis caueam replet. In auibus pulmo fixus, pectoris cauea minor. In quadrupedibus frigidis pulmo, et pectus, et abdomen, male distinctas caueas, replet, et in chamaeleonte fere vniuersum corpus. In piscibus frigidis plerisque pulmo nullus est, eiusque locum branchia tenent. Sunt tamen aliqui pisces pulmone vesiculoso, qualis serpentis, vt lampetra, alique chondropterygii (*). In serpentibus pulmo partim vesiculosus est, partim carnosus. In vermibus et insectis plerisque pro pulmonibus asperae arteriae sunt, solitariae, nullo coniunctae parenchymate.

Homini et quadrupedi *pulmones* peculiariter dextrum et cet.

p. 141. l. 5. *adde* Raris in exemplis plures, etiam septem lobi fuerunt.

ibid. l. 8. *post* fere *adde* sexfidum, nonnunquam

ibid. l. antepen. *post* mustela *adde* taxo.

ibid. l. ead. *post* catopardus *adde* animalia americana agouti et talpa.

ibid. l. penult. *post* herbiuora *adde* sex lobos castor habet, et simia, aper tayassu, capra dorcas, sciurus, rattus aquaticus.

p. 142. l. 1. *dele* sex dorcas - - et sciurus.

ibid. l. 3. *post* phoca *adde* vespertilio, et *post* manis *adde* tres buffalus.

ibid. l. 5. *dele* Simia septem - - et viuerra.

ibid. l. 10. Pisces frigidi sanguinis - - tubuli bronchorum similes, *lege* In piscibus frigidis branchiae sunt, plerumque sine pulmone, aliquando cum pulmone. Machinae sunt in capitis cum collo confiniis cartilagineae, cartilagine incisa et subdivisa in ramos sulcatos, quorum fulcorum quisque arteriam per totam longitudinem decurrentem habet, quae in venam reflectitur parallelam arteriae. Eae branchiae, dum animal viuit, perpetuo motu agitantur.

Vermes, qui in bufones, ranasque conualescunt, et qui in insecta aquatica, ephemerarum exemplo, tum astaci, branchias habent haecenus branchiis piscium analogas.

Insectis merae sunt asperae arteriae magno factae artificio, a stigmatibus natae,

(*) In chondropterygiis VICQ d'AZUR *Mémoire. présent.* VII. p. 31.

natæ, ramosæ, quæ ad omnia viscera animalis suis ramis tendunt. Est ubi filum mobile asperæ arteriæ circumdatur.

pag. 144. l. 15. *adde* Alia discrimina PORTALIVS annotavit, quæ vero potissimum ad fetus historiam pertinent.

In avibus nonnullis aquaticis, ut in grue, inque fero cygno aspera arteria in propriam sterni caueam recipitur, in qua ea contra se ipsam ter relectitur, ut nuper Cl. I. Targioni TOZZETTI confirmavit.

p. 145. l. 4. amphibiis *lege* natantibus

ibid. l. 10. *post* leoni *adde* aliquam tamen partem cartilaginis expertem Cl. SE-
RAO fecit,

ibid. l. ead. *post* gentis est *adde* castori huic de gente murina,

p. 148. l. 15. *post* legi potest *adde* et potissimum nuperi Britanni, quæ sedes videatur esse morbi gravis Croup, seu suffocationis stridulæ. Nisi forte, quam eo loco membranam dixerunt, potius mucus fuit membranæ speciem imitatus, qualem sæpe polypi asperæ arteriæ nomine clinici auctores descriperunt, qui figuram eius arteriæ exprimeret, et screatu redditus sit e).

ibid. l. ead. *dele* Plicæ fecerunt - - - WILLISIVS tribuerit.

p. 149. l. 8. *lege* filorum

p. 152. l. 6. *post* visa *adde* quæ per eadem vascula etiam repleantur.

p. 154. l. 11. *post* costam *adde* Hanc obscuriuscule ERASISTRATVS dixit a GALENO citatus.

ibid. l. ult. *post* prodit *adde* iterum ab ERASISTRATO dicta,

p. 155. l. 20. *post* miscentur *adde* quas manifestas vidi.

p. 156. l. ult. *lege* Dextra, quæ venæ sine pari propago est, et ERASISTRATO dicta, per quam pus reiceretur; eadem a I. Iacobo RAVIO cet.

p. 157. l. 1. *lege* azyga

ibid. l. 8. *adde* quamque ex azyga natam vidit SCHREIBERVS g*)?

p. 158. l. 19. *post* 8910 *adde* maiorem etiam in iuvene P. Conradus FABRICIVS vidit, cum quo viro multum et res publica amisit, et ego.

pag.

pag. 147. not. o) *adde* Negat Cl. SABRATIER, II. p. 183. Difficulus tamen tot magnos viros in re facili errasse putes, et negantis innumera requiruntur experimenta.

ibid. not. s) *adde* In animali et decussatis et oppositis)(similes Amstelodamenses viderunt coll. priu. obs. anat.

ibid. not. u) *adde* Amstelodamenses.

pag. 155. *ad verbum* osseis in *terru* lin. 13. *adde* not. g*) Osâ in pulmone COLVMBVS

p. 265.

ibid. not. h) *adde* Calculi tussi reiecti RVYSCH Thef. I. 38.

x*) Loc. aff. V.

g*) Epist. ad me data 5.

pag. 159. l. 4. *adde* Cum ductus arteriosus subclaviam arteriam sinistram adiret, arteria pulmonalis magna ratione, quam aorta, maior fuit apud Cl. KLIN-KOSCH. Multo, quam aorta, tenuior est et mollior, tamen et induratur, et concrementis lapideis obducitur *k*)*, aut offescit *k**)*.

ibid. l. 7. *lege* quam

ibid. l. pen. *lege* quam 1361 ad 1600, et 1341 ad 1849 *t)*.

p. 161. l. 1. *post* quae *adde* ex medio fere trunco, magis tamen ad dextra procedit *f*)*,

ibid. l. 16. *lege* conferuent

p. 162. l. 5. *adde* et alias dicuntur. In aubus duo ductus arteriosi sunt, et singuli rami pulmonalis arteriae suum ramum ad aortam mittunt, superiorem, inferiorem.

p. 163. l. pen. *lege* inosculationes et *adde* et nuper Cl. REICHEL arterias per angulos vesicularum rete facere, atque in venas continuari vnus globuli.

p. 164. l. 15. *post* necat *adde* inque lue bubula,

p. 165. l. 1. *post* vidi *adde* hydropem ipsius pulmonis, graue malum, paucisque dictum clinicis.

ibid. l. 2. *post* extreat *adde* et peruianum animal eius generis.

p. 166. l. 17. *adde*. Quare non miror, si euentus clar. viris perfecte contrarii obtigerint, et etiam nuper scriptum sit, pulmonem inflatum manere tumidum, neque adeo aërem in venas resumí.

ibid. l. antep. *post* venas *adde* nonnunquam in duas *u*)*.

p. 167. l. 3. *adde* vel potius spatium inter superiorem venam semilunare relinquunt et dextram posteriorem, obliquius descendunt, et cum anteriori maiorem angulum faciunt.

ibid. l. 9. *adde* In vniuersum dextris minores sunt et breuiores *c*)*.

p. 169. l. 16. *adde* Nuper demum extitit Cl. PORTALIVS, qui venas arteriis et numerosiores, et maiores esse scripsit, quae ad vniam arteriarum duae sint; addit se pulmonem repletum in aqua macerasse, tunc apparuisse venas arteriis maiores *f*)*. Experimentum non feci, truncos contentus metiri. Coniicias discrimen non esse maximum.

pag.

k)* SACHI *lap.* p. 100.

*k***)* In boue Eph. Nat. Cur. Dec. II. ann. III. *obs.* 38.

f)* ERDMANN *disq.* de arter. thyreoid. T. II. f. 2.

pag. 164. not. b) *adde* Amstelod. coll. priu. *obs.* anat. p. 11.

u)* POHL *obs.* angiolo. de venis, 1773.

c)* PORTAL *Hist.* de l'Acad. des scienc. 1771.

pag. 167. not. l) *adde* In eorum *obs.* anat. P. II. in oue.

f)* Histoire de l'Acad. 1771.

pag. 169. l. 17. *adde* in phoca PORTALIVS. De his nihil mihi constat; in homine vero neque certe numerosiores reperio, neque ampliores. In salamandra vena modo arteria maior, modo ei aequalis SPALLANZANVS.

p. 170. l. 3. *post* HYNALD *adde* et Cl. HEWSON anteriora, et posteriora, eorumque in ductum thoracicum, inque angulum venae subclaviae et iugularis exitum,

ibid. l. antepen. *post* sensus sit, *adde* isque satis accuratus, et *post* repugno *adde* et in bronchiis tussim irritando incitari, et in membrana pulposa cuti continua dolorem federe.

Liceat hic paucis de pleuritidis sede mentem meam declarare, qui, cum nunquam de hac quaestione quicquam scripserim, in has lites fui involutus. Plurima collegi ad fere ducentas cadauerum sectiones. Eo redeunt: post dolores pleuriticos pulmonis inflammationem et abscessus saepe apparuisse, quod ipse vidi; pleuram vero sanam repertam. Inflammatam etiam fuisse absque pleuritidis signis, et in musculis pleurae circumpositis pleuritidis vestigium apparuisse. Neque defuisse tamen exempla, in quibus post pleuritidem pleurae pulmo adhaesit, atque in ea membrana vestigia fuerunt inflammationis.

Ex his certis experimentis comparatis apparet, veram sedem mali in pulmone esse, pleuram nonnunquam in consensum trahi, absque tamen eius malo morbum locum habere posse. Nihil ergo ex pathologicis pro pleurae natura sentiente concludi posse, nisi in pleuritico cadauere pleura sola affecta reperiat, dum pulmo et intercostales muscoli sani sunt.

p. 172. l. 12. *lege* qui ab aëre repleti cylindrici videntur cet.

ibid. l. 13. *lege* inspecti

p. 173. l. 13. *lege* multangulares et *post* vesiculae *adde* quae in minores vesiculas diuiduntur, quoad oculos se subripiant.

ibid. l. 21. *adde* Quare etiam aër de lobo in lobum non transit, quo via non patuit, nisi per liberum intervallum.

ibid. l. 25. *post* cogit *adde* in tabidis non raras visu,

ibid. l. antep. *post* turgere *adde* lentius verò haec omnia, quam de vesiculis in vesiculas.

p. 174. l. 14. *lege* lacerta

ibid. l. 15. *lege* cauae

pag.

pag. 170. *ad verbum* magni in *textu* lin. 9. *adde* not. p*) Non bene G. DOWE, tamen magnos fecit CARRERE *inflamm.* p. 376. 377. 378.

pag. 173. not. s) *adde* Hoc ipsum malum esse, quod vocant *Brokenwinded horses* FLOYER *pulsevearch*, p. 399.

- pag. 174. l. antepen. in quibus *lege* per interualla cellulosa vesicularum
 p. 175. l. 2. *post* faciunt *adde* Denique membranulae ipsae vesicularum in con-
 uexitate sua rete vasculosum gerunt, quod de vesicula ad vesiculam commu-
 nicat. Lacertae maiori cet.
 p. 177. l. 14. *post* composuerat *adde* vt ex posthumis apparet, nullasque vesi-
 culas *Willisianas* admisit, quae ex dilatato ramo bronchi fierent.
 ibid. l. 23. *post* cellulas *adde* ex cellulis compositas,
 p. 178. l. 12. *post* transire *adde* aut aërem quidem etiam in ramum bronchi im-
 pulsum regressu tamen totum pulmonem replere *m**). Nihil vero simile fieri,
 si vinculo reditum aëris per bronchum interceperis,

S E C T I O III.

A È R.

- P**ag. 179. l. 5. *post* affero *adde* cum mea studia per vastissimum rei naturalis
 ambitum non potuerim aequa vi diffundere.
 p. 183. l. 1. *post* portione *adde* in sudore, pulmonis halitu, parca in salua et
 bile, magna in sanguine.
 ibid. l. 5. *post* abest *adde* et a terra aluminis, aliisque corporibus *b**)
 p. 184. l. 8. non exuere *lege* quam exuere
 ibid. l. 11. *adde* Aër, qui ex dissolutis corporibus generatur, perinde in aqua
 contabescit et soluitur, multo tamen celerius is certe, qui ex alcali in acido
 soluto generatur
 p. 185. l. 3. *post* agnouit *adde* et CAMERARIUS *z*†)
 ibid. l. 5. *post* fixus *adde* qui corporibus solidis adhaeret.
 p. 186. l. 13. *adde* Sed is aër fixus potentissimi veneni effectum edit, ad re-
 spirationem ineptus *i*), etiam flammam suppressit *k*); mures continuo oc-
 cidit

*m**) WILDRICK de fabric. pulmon. Franequer. 1767. p. 30.

pag. 181. not. l) *adde* NEGAT d'ARWEN Phil. Transf. Vol. LXIX. sed in rebus sensibus con-
 spicuis MVSSCHENBROEKIO fidem adhibeo, neque alium euentum in vena possum expe-
 ctare ab eo, quem in auricula cordis vir eximius in experiundo vidit.

pag. 182. not. c) *adde* SVE.

ibid. not. f) *adde* SVE anthropolog. p. 204.

*b**) GORGOLIVS diff. de purredinis theoria CL. MAKBRIDII, Halae 1768. SMETH
 de aëre fixo.

z†) De tensione cordis, natum ex aceto et creta.

i) MAYOW nitr. aër. p. 130.

k) HALES haemastat. p. 272. 285. Hist. de l'Acad. des scienc. 1710. p. 17. FORTIVS
 diff. var. p. 314. Miscell. Taurin. p. 131. BOYLE exp. phys. mech. II. p. 101.

cidit *l*), et auiculas *m*); tum colubros *n*), limaces, qui vacuum spatium non reformidant *o*), ranas *p*), et apes *q*), muscas *r*).

§. III*. *Aër varius.*

Quae prius sparsa erant, ea nuper a Cl. viro *Iosepho* PRIESTLEY collecta, nouisque experimentis aucta, eo redeunt, vt aëris fixi alia sit, et alia natura, vt ex diuersis corporibus per varios acores, variosue modos educitur. Ipse vir clar. amat peculiaria cuique aëri nomina imponere *s*), alii malunt aërem quidem vnicum vulgo notum facere, sed pro varietate admisti vaporis alium, aliumque *t*).

- 1) Ergo aërem fixum peculiariter eum vocat, qui ex creta nascitur cum acore aliquo feruente. Is aër vegetabilia, animalia occidit, etiam insecta stupefacit, cum aëre vulgari non miscetur, eumque destruit, acidaeque indolis est, vt etiam aquam grato acore imbuat *u*), aemulamque reddat acidularum, putredini aduersam, etiam in morbis putridis per experimenta vtilem *x*).
- 2) Aër, in quo candela accensa fuit, aut sulphur. Ea flamma aërem consumit, vt non supra quindecuplam partem superfit *y*), vt pondus tamen non mutet. Vapores eius enecant, iis vero fundum petentibus liberatus aër iste superstes a destructione non nocet.

Huius aëris noxiam vim vegetatio plantarum destruit. Effectus funestos candelaë habet *P. AMMAN* *z*), et per experimenta Cl. *LAGHI* *a*) vapores incensi sulphuris *b*); phosphorus *c*) aëris, in quo lucet, elaterem destruit. Terebinthinae inflammatae vapor *d*). Fumus exstinctae candelaë in aërem sufflatus

l) BOYLE ibid. p. 105.

m) Id. ib. p. 108.

n) Ibid.

o) p. 109. 110.

p) MVSSCHENBROEK in *Cimentin.* p. 121.

q) BOYLE p. 100.

r) p. 109. 101. 102. vt tamen suscitari possint.

s) *On different kinds of air.*

t) SMETH de aëre fixo, GORGOLIVS l. c.

u) PRIESTLEY sur l'imprégnation de l'eau.

x) Et in Anglia facta a Cl. *Hugues* PERCIVAL et teste *I. L. TARGIONI* in Italia.

y) PRIESTLEY, sic fere *HALES* *vegetable stat. exp.* 103. 106. 117. 128. *LANGRISH* *physf. exp. upon brutes* p. 145. Plus etiam destruit puluis pyrius *HAWKSBE* *physf. med. exp.* 83. ad 128.

z) Cubiculum funestum, in quo candela incensa fuit *med. erit.* 159

a) *Comm. Acad. Bonon.* IV. p. 81. 90.

b) *De HEYDE obs.* 56. *HALES*, p. 254. *LANGRISH*, p. 145. *van den BOS*.

c) BOYLE *nostilica aër.* p. 49.

d) Non quidem enecauit, aegros tamen reddidit homines, *MOSEDER deliqu. anim.*

fufflatus e). Ignis super corium madidum structus f). Vis noxia aëris per flammam corrupti multo pestilentior est, quam aëris respirati g). Affinis est aër, qui per ferrum candens h), aut aes i) transit, aut per flammam spiritus vini k), aut demum carbones; idem enim vitro receptus, et per inspirationem attractus necat. Huc etiã vaporem refero per specula caustica de metallis extortum, qui aëris partem $\frac{1}{3}$ destruit, reliquam noxiam reddit.

Longe vero celebrior est aër, quem incensi carbones corruperunt. Eo enim cum homines necessario vfi fuerint, et demum per multa experimenta, et conspurcationem funestam didicerint, dudum passim incautis lethi causa fuit, etiã Imperatoris *Valentii*; neque ignorata vis venefica *Hugoni BENZIO m)*.

Quare non mirum est, homines in eiusmodi aëre factitio, deque effervescente musto n), aut cereuisia o) expiranti extingui, quoties eo vapore cellae vinariae repletae sunt p). Mors subita ex vapore nato in cisterna, in qua sordes ad distillationem sacchari reliquae seruabantur q). Ex vapore dolii aqua marina pleni periit homo, cum summae putredinis indiciiis r).

C 2

Nuper

e) *Delic. chirurg.* p. 72. 73. 74.f) *KRAFT physic.* p. 322.g) *HALES l. c.* p. 272.h) *DESAGVLIERS cours.* T. II. p. 558. *Miscell. Taur.* II. p. 38.i) *DESAGVLIERS,*k) *Idem ibid.*l) *HAWKSBEER Phil. Transf.* n. 328. *DESAGVLIERS,* p. 389. 552.

m) *AMATVS Cur.* 33. *Cent.* VII. *Marc. DONATVS hist. med.* p. 170. *HILDANVS de gangraen.* p. 786. *FABER in HERNANDEZ* p. 784. *FONTAN. Analest.* c. 22. *C. BARTHOL. Exerc. Med.* p. 38. *Satyr. Silef. T. V. n. 1. Delic. Med. Chir.* p. 487. *art. de faire les rapports* p. 514. *Fränk. Anmerk.* T. I. n. 13. T. II. p. 145. *MANITIVS de Idiosyncras.* p. 25. *BIKKER nat. hum.* p. 55. Huc pertinet celebris historia studiosorum Ienensium, qui, cum thesauros venarentur, a fumo accensarum prunarum interierunt apud *TANNENBERG de suffoc. a must.* p. 56. *Act. Med. Vratislav.* 1719. *M. Dec. HOFMANN Med. Conf. Cent.* V. *Dec.* III. n. 108. Ex carbonum in bene clausis mapalibus fumo pene perierunt Belgae in noua Zembla *LINSCHOTEN lrim. T. II. p. 23. Assemblée de Beziers* 1731. *Dec.* Inde lethargus *ADOLPHI de conclau. aegror.*

n) *STAHL fundam. chem.* T. III. p. 91. *RAMAZZINI de morb. artif.* c. 20. *ROTARI Giorn. de' Letter.* 29. p. 434. *DRELINCOVRT de human. fer. membran.* n. 32. *ZACVT. medic. princ. obs.* I. L. 10. Animi inde deliquium *NEBEL de virib. electric. medic.* p. 38. *NEVMANN Oper. chem.* p. 1164. *Eph. Nat. Cur.* *Dec.* III. *ann.* 2. *obs.* 45. *Journal de Medecine* 1756. *CAMER annul. pneum.* p. 34. 35. *MYSSCHENBROEK ad Cimentinos.*

o) *NEVMANN oper. chem.* ex edit. *ZIMMERMANN.* p. 755. 756. 1164. Idem esse, quod inebriat, et flammam atque animalia necare *VERHEYEN L. II. p. 98.*

p) *STAHL ibid.* *NEVMANN ibid.* *VERHEYEN ibid.*q) *G. HUGHES Hist. of Barbadoes* p. 251. 252.

r) Sanguis per os, nares et aures fluxit, et cadauer continuo contabuit *du HAMEL art. de préserver* p. 41.

Nuper autem accuratius inquirendo compertum fuit, fumum carbonis sanguinis per pulmones iter sufflaminare, ita fieri, vt dexter ventriculus, et dextra auris, et vena caua, et demum venae cerebri et cerebrum sanguine plenissima, sinister vero sinus, et sinistra auris inanes sint *s*), et demum sanguis in cellulosa telam capitis effusus, et intestina inflammata *t*). Ita in hominibus carbonum venenata vi enectis, et in animalibus experimento subiectis muscoli in vniuersum mole aucti pertinent ad sanguinem in cellulosa effusum, et eo retulerim diuturnum horum cadauerum calorem et mollietiem *u*), sic etiam symptomata ab eo fumo nata eo referas, capitis grauitatem, sensus iacturam, liuorem faciei, capitis tumorem, pulsus defectum et respirationis *x*). Ignem idem suffocat *y*), et insecta, quae vacui spatii violentiae resistunt *z*); aëris naturalis partem destruit.

Eiusdem grauior fuerit venenata indoles spiritus carbonum vitro recepti, qui naturam venenatam diutissime retinet *a*).

Neque longe differre potest aër, qui in fodinis carbonariis Anglicis, aliisque passim habitat flammam concepturus. Si quando simplices metallarii eum ore hauserunt, vomitum mouet et aluum, et etiam subito suffocat. Hi etiam mortales diu a morte molles, calidique manent, neque rigescunt, vt cadauera solent *b*). Mirum posset videri, in iisdem etiam carbonariis fodinis vaporem non inflammabilem *c*) reperiri, perinde funestum. Idem ab igne dissipatus post aliquam moram renascitur *d*).

Alios vapores subterraneos et mephitides omitto, vt nec in aëris specibus *Priestleyanis* continentur, et cum de metallis, minerisque non satis certo constet, a quibus vitium ducunt.

Scintilla electrica aërem diminuit et mutat, vt cum nitroso cesset fumare.

3. *Aër inflammabilis*; huius aëris variae sunt scaturigines; quem carbones generant, nunc dixi. Sed etiam ex aliis corporibus incensis obtinetur, quaecunque ignem concipere apta sunt. *Noster* fere ex ferro *e*) obtinuit et zinc.

Hoc

s) PORTAL rapport.

t) HARMANS apud Per. IV.

u) PORTAL.

x) HARMANS.

y) Conf. HALES exp. 109.

z) MVSSCHENBROEK in *Ciment*. p. 107.

a) CLAYTON *misc. med.* III. p. 290. *Philosophic. Transact.* n. 452.

b) IARS *ibid.* p. 256.

c) POWER *microsc.* p. 179.

d) Le MONIER ap. CASSINI *mes. de la terre* p. 197.

e) HALES exp. 57.

Hoc aëris genus ingrati est odoris *f*), potissimum, qui ex animalibus educitur, eorumque partibus. Ex pisces, ostreis cet. *HALES* habuit *g*).

Elatere destruit; ex metallis per speculum visorium obtinuit *CL. PRIESTLEY*; ex paludosis aquis ascendit teste *FRANKLINO* et *CL. VOLTA*.

Aqua receptus odorem suum per ipsam aquam spargit, eamque cuticula iridis coloribus varia obducit; verum in ea ipsa aqua naturam inflammabilem deponit, et porro candelam exstinguit.

Animalia occidit, etiam limaces, colubros, ranas, insecta, perinde ut aër fixus, neque ab eorum morte vim inflammabilem amittit.

Sola concussione in aqua totus innocuus redditur, et ad respirationem aptus; a vegetatione vero minime corrigitur.

Porro aër, quem respiratio corrumpit, aut putredo, quem suo loco dicemus.

- 4) Tum *aër nitrosus*, qui nempe per acorem nitrosum ex metallis, exque hydrogyro educitur, per eum acorem dissolutus. Huius aëris mirificae sunt dotes. Cum aëre communi atmosphaerico mistus feruet, eum turbat, auran-
tione colore vitiat, tertia parte minuit, ipse quartam amittit. Idem amittit sensim facilitatem, qua in aqua soluitur. Cum aëre inflammabili mistus viridem flammam efficit. Plantas et insecta omnia subito enecat, etiam vulgari aëre mistus. Aquam purgante *) acri imbuat. Putredini vehementer resistit, natamque corrigit multo, quam aër fixus, potentius, ut in eo aëre *CL. PRIESTLEY* speret animalcula et fructus aequae ac in spiritu aliquo inflammabili duraturos. Confirmat eam spem *CL. ACHARD h)*, cum hoc aëre putredinem et a lotio, et a carne auerterit.

Per concussionem in aqua emendatur, et nunc tuto per respirationem adducitur. Flammam auget et adiuuat.

Hoc aëre occisi aues sanguinem habuerunt coactum *i)*; ab eo, sed ex multo nato, asphyxia.

- 5) *Aër salinus*, qui fit ex metallo per acorem salinum soluto. Hic aër in aqua soluitur, eam reddit acidissimam; ponderosior idem est, quam aër vulgaris, et flammam extinguit; cum liquoribus inflammabilibus aërem inflammabilem generat.

C 3

6) *Aër*

f) *Hamburg. Magaz. T. VII. p. 557.* vaporem subdulcem vocant. Add. *Mémoir. de l'Acad. de Berlin T. 13. p. 107. TILLY du charbon mineral.* Animalia corpora, non ita vegetabilia consumit. Inflammabilis in operibus carbonariis *Workington, 1ARS voyages metall.* et *TILLY p. 103.*

g) *HALES exp. 57.*

*) pungentè videtur legendum esse. *Nor. edit. hui. auct.*

h) *Journ. Litter. T. XIV.*

i) *SAGAR system. p. 538.*

- 6) *Aër alcalinus*, factus ex spiritu salis ammoniaci, cuius calefacti vapor vase recipitur hydrargyrio pleno. Similem alii sales volatiles alcalini fundunt. Ab aqua imbibitur, quam reddit alcalinam. Cum aëre fixo cryсталlos facit oblongas decussatas. Celerrime glaciem soluit.

pag. 188. l. 17. *adde* WOLF 816 ad 1.

ibid. l. 18. 885 ¹²² ad 1, *lege* 855 ¹²² ad 1.

p. 189. l. 19. *post* descendat *adde* perinde fere in glaciali monte *le B V E T* apud Cl. de LVC et in *M. altae*,

p. 190. l. 12. *lege* centum et viginti quinque

ibid. l. 13. 126. *lege* 150.

ibid. l. 14. 246. *lege* 275.

ibid. l. 16. *lege* Quare cum 182 ad 275 se habeant fere vti 2 ad 3, erunt cet.

ibid. l. 19. *lege* vti $\frac{1}{2}$ ad $\frac{1}{3}$.

p. 192. l. 8. *post* plus *adde* MVSSCHENBROEKIUS pressionem, quam vrinator sustinet, ad 332. 340 l. aestimat.

p. 195. l. 2. *post* imposito *adde* vt spongiis aures defendere cogantur,

ibid. l. 10. *adde* Denique quando summa cum velocitate pila ex maiori tormento cominus fere corpus hominis radit, visa est et ossa frangere, intacta cute, et hominem interimere, sola ab enormi aëris pressione.

p. 196. l. pen. *post* esset *adde* et alius passer cum ad tredecim pollices descendere, alius cum ad sedecim pollices,

p. 197. l. 12. *adde* Huius funesti effectus in nixu, inque nimio musculorum labore alias dicemus. His enim hominibus nixus nocet, qui pondus sui corporis singulo in passu per tres, quatuorve pollices eleuant.

p. 198. l. 3. *post* pollices *adde* quem alii ad 290 pollices auxerunt.

p. 202. l. 8. *adde* aut 130 vbi summus,

ibid. l. 14. *adde* Inde aeolipilae *Cesanae* et aliae circa Clavennam rhaeticam, quando in subterraneis cauernis aër, frigore immutato seruato, viribus integris in aërem exteriorem per aestiuos calores rarefactum erumpit. Inde ventus ille, de quo scripsi, status rupensis, quando aër in Valesia matutino sole contepuit, dum aër borealis montibus a sole defensius densitatem retinuit. Denique cum aër vaporibus tot aegrorum calefactus per foramen in fornice summo conclaus exit, in limine eius aër vndique per omnes succedit aditus.

Demum singulare huc pertinet phaenomenon in fodinis a Cl. IARS annotatum. Et hyeme, et aestate perpetuo aëris torrens mutatur; sic aestate

idem

pag. 196. ad verbum credantur in textu *adde* not. 2*) BOYLE Phil. Transact. n. 63.

ibid. ad verbum vixit in textu lin. ult. *adde* not. b*) Vipera tamen vixit in aëre sexies rariori.

idem in subterraneis cuniculis grauior ascendit in leuiorem atmosphaeram; hyeme, quando atmosphaera ponderosior facta est, descendit idem ab atmosphaera in aërem non mutatum, hinc leuiorem cuniculorum u*).

pag. 202. l. vlt. *adde* Ita porro aëris elater in loco clauso ab igne augetur, in loco libero minuitur, quia aër ab igne rarefit, eiusque adeo in eodem volumine minor nunc est massa z).

p. 205. l. 14. *post* addito *adde* ita vt tamen dilatari nequeat fornacis parietibus coërcitus.

ibid. l. 24. *lege* rarefactionem

p. 206. l. 5. *adde* Demum aër, qui in aqua dissolutus fuerat, ad volumen 470000es maius se expandit, et maiora adhuc WINKLERVS incrementa voluminis recensuit, in quae aër se demiserit.

ibid. l. 12. *lege* vapores

ibid. l. 16. *post* animalis *adde* et perinde per putredinem animalis, quod in eo aëre corruptioni traditum est.

ibid. l. 20. *post* resistere *adde* Octo pedes aëris respirationem non supra quindecim minuta prima alunt.

p. 207. l. 9. *adde* Porro elaterem aëris a respiratione destrui nuper Ill. SPALLANZANVS confirmauit.

ibid. l. 12. *post* agnoui *adde* Animal in aëre non renouato intra 3½ hor. perit, rana intra sexaginta, neque profuit aërem reddidisse densiorem.

ibid. l. vlt. *adde* Neque vel plantae in aëre non renouato supersunt, neque flamma alitur, postquam respirantia animalia eum aërem corruperunt.

p. 208. l. 1. *dele* Tempora, quibus - - vt aëris volumina.

ibid. l. 6. *adde* In vniuersum pereunt in ratione directa molis. Pleraque animalia in aëre clauso celeriter pereunt, celerius etiam, si rarior fuerit.

Insectorum tamen oua in animalia in aëre clauso inualescunt y*).

ibid. l. 21. Apparet vtiue - - elateris decedere, *lege* Vehementiores etiam istis sunt effectus, quos PRIESTLEY recenset. In eiusmodi nempe corruptum aërem inclusa animalia fere continuo post vehementes conuulsiones extinguuntur, vt tamen musculi diutius resistent e*), et iuniora animalia.

p. 209. l. 3. *adde* Neque densatus aër, vt quidem scribitur in nuperis Cl. CIGNAE experimentis animali incluso vitam seruauit. Neque ab elatere deletio; nam aëre etiam reddito intereunt, dum corruptus aër supersit.

pag.

u*) *Mémoire de l'Acad.* 1764.

z) WINKLER *Vtersuchung.* p. 116.

y*) SPALLANZANVS ibid.

e*) PRIESTLEY.

pag. 209. l. 7. *post felis adde* Occidere aërem non renouatum Cl. PRIESTLEY, quia phlogisto de animali halante nimium saturatus est, neque adeo phlogiston de corpore nostro potest resorbere. Tanto enim deteriorem esse aërem, quo minus phlogisto recipiendo aptus sit.

Stimulo nocere *Idem*, cum conuulsiones excitet. Eadem fere Cl. SPALANZANO est sententia, addito experimento, quod eo pestilentior aër fiat, quo plura fuerint animalia, quae in eo aëre respirarunt, neruosque pati, cum haec animalia fere conuulsa pereant.

Non longe recedit viri Ill. *Marfilii* LANDRIANI sententia, qui ob phlogiston de pulmone halans et aërem replens, quem respirare cogitur, animal mori docuit.

ibid. l. 9. *post dicentur adde* et in aëre, in quo animal extinctum est subito. Putauit eos vapores vim exferere, quae bronchia constringat, pulmonem reddat. Caro certe animalis in aëre extincti, qui respirando fuit corruptus, celeriter putrescit *q†*).

ibid. l. ult. *post frigesfacto adde* Cogitatum est de aëris elatere destructo, cum aliquibus in exemplis aër corruptus respiratione suffocauit, cum maiori vi impelleretur. Sed annotatum est, aërem corruptum animal necare, etiam reddito aëre, neque in mephitide elaterem destrui, neque in eo argentum viuum subsidet.

p. 210. l. 8. *adde* Addas aërem factitium ex creta per acidum liquorem soluta, respirationem non alere, quia subito fere in homine contabescit, soluitur et elaterem amittit celerius, quam aër vulgaris.

ibid. l. 10. *post toleramus adde* cuius tanta pars aqua sit.

ibid. l. 15. *adde* De hac ergo quaestione interim ampliamus. Denique difficultatem auget, quod etiam ea animalia in aëre non renouato intereant, quae pulmone destructo non intereunt, vt ranae *y***).

Contra vim vaporum constringentem obiciias, neque vesiculas pulmonum irritabiles esse, neque aëris vaporibus pleni eam violentiam, quae aëris cloacini, quem tamen homines facile ferunt. Nempe eo coniectura redibit, esse in aëre aliquod ad vitam alendam requisitum, aliquid in aëre, quod respirando amittatur, siquidem in experimento animalia occiduunt ab aëre clauso, quae respirationis interceptionem facile ferunt.

Quae putrescunt animalia, ea aërem generant eius similem, quem respirando corrupimus, et perinde funestum. Validior putredo acrem ipsis plantis fructum reddit, nisi vero eas destruxerit, mire incrementa viget.

Putridum

q†) ALEXANDER *Essays*.

*y***) SPALANZANVS.

Putridum aërem et vegetario plantarum emendat, vt demum absque noxa respirationi feruiat; corrigit etiam electricus torrens, vt sub campana vitrea, in quo animal computruit, innoxius fiat, si campana cum suis fulcris sphaerae rotatae electrico torrente perfluatur; demum si in aquam receptus concutiat. Ab acore solo non corrigitur, ab aëre fixo vtique, certe minus fit noxius.

pag. 210. l. 19. *post* amittit *adde* et in eiusmodi quidem aëre non quidem canis, rana tamen interiit, etiam irritabilitate amissa.

p. 212. l. 4. *dele* Idem ignem supprimit - - - cum summae putredinis indiciiis. *ibid.* l. pen. *dele* carbonariis

p. 213. l. 2. *adde* Flammam etiam putredo generat.

ibid. l. 4. *dele* Sed in eiusmodi - - - intervallum renascitur.

ibid. l. antepen. Huiusmodi mephitides creduntur - - - in corpore retineri nequeat *lege* Neque in stipo patiat puluerem pyrium ignem concipere. Parum cum assurgat, et vix supra pedem, nihil in eo patitur erectus homo, neque canis, nisi caput ei deprimatur; id si feceris, exanimatur, at restituitur equeidem, si continuo corruptum aërem meliori mutaueris.

Eiusmodi mephitides circa Vesuuium et Aetnam montes passim exhalant, etiam per puteos, quorum aquae non nocent, exque cellis eo tempore, quo Vulcanii montes exandescunt.

Iste etiam vapor putatus est bronchia constringere, pulmonem reddere immeabilem. Pulmonem certe animalis in eo vapore collabi, eumque vaporem quasi vacui sensum producere clari viri obseruarunt, qui experimenti causa eum hauserant. Et tamen in eo argentum viuum non descendit, neque acrimonia certo sensu percipitur. Sed compara, quae de bronchiorum constrictione diximus.

p. 214. l. 7. *post* Ribariensium *adde* thermarumque Egranarum, Wildungen-sium atque Carolinarum

ibid. l. 8. *post* manifestius *adde* ex odoris testimonio

ibid. l. antepen. *adde* Si quicquam in rerum natura bronchia constringere potest, id fumus fecerit sulphuris.

p. 215. l. 6. *post* putrefacit *adde* Vulgo inde occisi vespillones. Ex sepulchro aperto, in quo cadauer foetidissimum, febris epidemica maligna. Ex cloacae paedore, qui repurgaturus descenderat, subito periit. Ex sentinae paedore varia mala et mortes subitae, multa per exempla.

ibid. l. 18. *post* pestilens *adde* Quare pericula a cadaueribus in cellis per temp'a sepultis imminencia nuper viros publicae salutis studiosos impulerunt, vt legum praesidia contra supersticiosum, ciuibusque funestum morem implorarent.

pag. 216. l. 3. *adde* Notissimum est, quam pestifera in calidis regionibus per aestivos ardores paludum sint effluvia, ut in Bengala, in maritimis Pisani, in lacunis Pomptinis. Spuma in eiusmodi palustri aqua tauros in Iamaica insula subito occidit. Neque ignoratur, effosis paludibus, aquis emissis Pisani, Bagnanae, Stutgardiae, Neapoli, Caesinae, Balneo regio, aquis Martii salubritatem esse restitutam; aquae vero falsae novis aquis mistae pestilentius putrescunt, quoties in maritimis stagnant.

ibid. l. 16. in puteo *lege* in vase ligneo falsa pleno et diu clauso

ibid. l. ead. *post* frumentariis *adde* cryptis Aegypti intactis, cisternis

ibid. l. ult. *adde* et tamen eventus nimis certus est. Vapores noxios pellionum, saponariorum ad putredinem referas.

Super ipsam aquam stagnans aer putredinem pestilentem contrahit (*), etiam cum glacie tegeretur (*), aut super pureum colligeretur (**). Eiusmodi aquae vapor de puteo exiens flammam cepisse, homines ambussisse visus est (†).

Alii putantur esse vapores, qui de terra ascendunt, qui pestilentem efficaciam venti *Samiel* efficiunt (††) subito occidentem (†††).

p. 217. l. 8. *adde* Ego quidem nondum satis habeo experimentorum, ut certi quid definiam.

p. 218. l. 16. *adde* Aqua de mari plurima exhalat, quam ad pluvias, adque flumina, fontesque generandos sufficere *Edmundus* HALLEY comperit, qui tamen exhalationem aquae fecit iusto minorem; mihi enim de falsis fontibus Aquileiensibus duodecim horae aestivae fere tres lineas dissiparunt.

ibid. l. antepenult. mirosque *lege* minoresque *et post* contemplatur *adde* Copiosissimum ignem, quem venti pestilentes Orientis secum sumunt, diximus (**).

p. 219. l. 3. *post* alumen *adde* salem Ephraemensem, salem mirabilem GLAUBERI.

p. 220. l. 2. *adde* Cuprum in aëre aeruginem concipit, sed aerugo fit crystallis cupri ab acido vitriolico dissoluti (*). Aphronitrum ex spatho generatur ab acido

(*) SMETH de aëre fixo.

(**) BARROW IV. p. 75. in sinu Hudsoniensi.

(***) C. AREYES p. 65. *Hist. de l'Acad.* 1701. p. 18. CARDAN. *discurs. phys. med.* PLOT *Oxfordshire* p. 62. 63. RADSCYNSKI *hist. nar. Pol.* p. 229. FABER ad HERNANDEZ p. 78. BOADE *nar. histor. of Ireland.* p. 145. *Zool. Med. Gall. T. I.* p. 174. *B. Med. legat.* p. 7.

(†). *Holl. Maatschapp. Verhandel. T. XV.*

(††) CHARDIN IX. p. 221.

(†††) THEVENOT, TAVERNIER cer.

(*) Lib. VI.

(*) FALCONER *poison of copper.*

- acido vitriolico soluto t**). Tartarus vitriolatus ex clauellatis cineribus aëri libero diu expositis t***).
- pag. 220. l. 7. *post annum adde* aut per septem annos
 ibid. l. antepenult. *post cadunt adde* et ros in Aegypto falsus est.
- p. 221. l. 2. *post erodit adde* ferrum soluit.
 ibid. l. 14. *adde* Pinuum odorem sexaginta a terra leucis percipiunt, qui Americam Septemtrionalem praeternauigant s*)
- ibid. l. ult. *lege* eandem
- p. 222. l. 8. *adde* Romae Cl. GROSLEY vapores per aërem obuolitantes et vidit, et olfactu distinxit, qui alcali volatilis naturam retinuerint.
- ibid. l. 17. *post terra est adde* Gypsum pulvis variis locis abundantius obuolitans cum spiritu recipitur, et pulmoni nocet.
- ibid. l. 16. *post consuulū adde* In specu Cypria chalchanti odorem GALENVS percepit.
- ibid. l. antepenult. *post deponat adde* De zinco simile est testimonium per aërem ferri.
- p. 223. l. 5. *lege* in summas turres

SECTIO IV.

RESPIRATIO.

- Pag. 224. l. 3. *post vim adde* cum sodalibus
- p. 225. l. 8. *post bronchia adde* annulis asperae arteriae sibi impositis
- ibid. l. ult. *post abdomine adde* aut pectore
- p. 226. l. 3. *adde* Certa tamen ad respirationem moliendam maturitas in fetu requiritur. Qui sexto mense edius fuerat, respirauit, nequam, qui 130 die.

Prima initia respirationis nuper Cl. PORTAL ostendit in broncho dextro fieri; is enim eleuatur facilius, quia liberior est, dum sinistrum aorta am-
 D 2 plectitur

t**) FISCHER de aplurouitro.

t***) SVCH de tartaro vitriolato.

pag. 221. not. f) *adde* PIETSCH de nitro n. 30. conf. MARGGRAF Mémoire. de Berlin, 1752.

ibid. not. i) *adde* ALBERTI et BOEHM de salis medii genesi ex acido aëreo.

s*) BYRNABY et R. LENTILIVS.

pag. 221. not. v) *adde* Efflores paludibus Pisis salubritatem redditam esse CARVES.

pag. 225. not. h) *adde* PIA, IV. p. 77. Ibid. 2. Journal de Médecine, 1765. May. Mémoire sur les noyés.

- plectitur et comprimit. Exempla addit sibi visū, in quibus pulmo dexter natauerat, cum sinister nondum ab aëre dilatatus in aqua subderet.
- pag. 226. l. 12. *adde* Sic neque in pectore pleuram inter et pulmonem vacuum spatium nascitur, in quod aër subeat.
- p. 227. l. 2. *adde* Cum ab empyemate pectus fuisset perforatum, non ideo collabi pulmonem, neque pulmonem de motu cessasse.
- ibid. l. 10 *post* coaluisse *adde* Potuit etiam pulmo non collabi, qui pleurae adhaesisset.
- ibid. l. pen. motum amittit *lege* et immobilis in dorso haeret in GALENI experimento toties a nobis repetito, et animal cet.
- p. 228. l. 12. *post* BREMOND *adde* Perinde ut ab eadem compressione diaphragma vidi de pectoris vulnere expelli, et cor, et aërem, qui pectore continebatur.
- p. 230. l. 3. *adde* Nuper Cl. GOVRAIGNE aërem suo elatere in pulmonem aëre debiliore plenum descendere docuit *y**), et pectus dilatari, quia aër subit; non subire aërem, nisi pectus dilatatum fuerit. Sed repugnat vita hominum superstitum in aëre calidiori, quam est hominis sanguis; hic vero aër pulmonalis densior, atmosphaericus rarior est *y**).
- p. 231. l. 19. *adde* ut per nupera Britannorum inuenta eo in casu necesse sit pectus perforari, qua aër exeat.
- p. 232. l. 7. *post* dilatat *adde* GALENO teste.
- ibid. l. 11. *post* confirmant *adde* GALENVS ostendit, destructis omnibus musculis, et pectore aperto solum diaphragma laborare, imasque pectoris partes moveri.
- p. 235. l. 4. *post* capacitas *adde* pectoris
- ibid. l. 10. *post* pectus *adde* proprium
- ibid. l. 11. laxiorem *lege* longiorem
- p. 236. l. 27. quo *lege* qua
- p. 237. l. 4. *post* ponderis *adde* aëris
- ibid. l. pen. *post* incisionibus *adde* cor,
- p. 238. l. 21. adhaesit *lege* obstitit,
- ibid. l. ult. *lege* rigidi
- p. 239. l. ult. *lege* et parte musculorum destructa tanta pars cet.
- p. 240. l. 10. idem *lege* eadem

pag.

pag. 226. not. t) *adde* tum loc. affect. L. V.

g*) De respiratione, addit inflato aëre in animali mortuo omnia phaenomena inspirationis produci.

g**) Fulse L. V.

pag. 242. l. 18. *lege* ΜΕΤΕΩΡΩΝ

p. 243. l. antepen. *aëreis lege* aëre plenis

p. 244. l. antepen. *post retracta adde* et tortuosa

p. 246. l. 3. *lege* percurrentis

ibid. l. 12. *post partis adde* Cl. BERNARD putat, extra inspirationem sanguinis partes quadraginta octo in arteriam pulmonalem penetrare, in inspiratione 54; tamen ut primis in initiis maior sit facilitas, qua sanguis subit, ea vero perpetuo minuatur.

ibid. l. 13. idem *lege* inde

ibid. l. 21. *post* proicitur *adde* ut in viuis animalibus manifesto visum est.

p. 248. l. 7. *lege* vices

ibid. l. antepen. *adde* fecit nuper Cl. PORTAL.

p. 249. l. 3. Sed idem vitium, eademque causa mortis - - - ut vtrique indicationi satisfiat, *lege* Per experimenta enim numerosa nuper capta constitit, strangulatos equidem saepe cum signis apoplexiae perire, sanguine in cerebrum, eiusque sinus congesto *), vasis encephali cruore plenis, suborto delirio et sopore.

Vera tamen causa mortis utique in STOLTII, aliisque periculis est, quod, aspera arteria a laqueo intercepta, pulmo respirationis usu priuatur, ab aëre distendi nequeat; hinc sanguis in dextris cauis cordis, in arteria pulmonali, in pulmone, et demum in omnibus venis colli, pectoris et abdominis congeratur, ad sinistras vero cordis caueas nullus veniat, et arteriae ipsae inanes sint. Neque absque exemplo est, venas enormiter distentas demum ruptas fuisse, ipsam demum, Cornelio CONSENTINO teste, cauam venam, passimque sanguinem effusum et super cerebrum, et super intestina. Non video, quare Ill. HAENIO visum sit, sanguinem non frequenter in cerebrum congeri **).

Cl. STOLTE experimenta huc faciunt in submersis capta, et memini in nobilissimo viro, ob iniustum homicidium in Anglia laqueo extincto, sanguinem sub cutem brachii et manuum effusum fuisse r).

Quae strangulatio mala facit, eadem a submersione sub aqua fiunt; inque iis, nostro aeuo multorum bonorum ciuium coniunctis conatibus magis cognitis, liceat hic aliquanto esse vberiore.

D 3

Animal

pag. 249. not. o) lin. 4. *achle* WEBER Fascic. II. obs. 6. BÜTTNER zweyköpfige Kind, p. II. HAEN rar. med. T. I. GUMMER submers.

*) MENDEL de suffocatis.

**) l. c.

Animal sub aquammersum aërem quidem captat et inspirare conatur, et in mortuo etiam epiglottis erecta reperitur ***), sed aqua cinctum aërem non inuenit, et plerumque aquam deglutit, et in ventriculū et in pulmonem, ut etiam fundum petat, ut in strangulato ****). Et si enim exempla sunt, in quibus aut in ventriculo †) submersi animalis nulla aqua fuit q), aut in pulmone, longe tamen plerumque in cadaveribus incisis et in ventriculo ††) aqua reperitur, et in pulmone p), inque aspera arteria, cum residuo aëre, qui in pulmone relictus erat, subacta, inque spumam versa. Vtramque aquam et ipse vidi in animalibus de industria submersis, et viderunt plurimi clari viri †††), etiam suum per colorem conspicuam, cum in aquam tinctam animal experimenti causa demersissent, eamque homines infelices *) vomitu reiciunt. Demum ex iis hominibus, quos laudabilis industria Societatis Amstelodamensis seruauit, plurimi aquam, spumamque de ore reddiderunt **), etiam vomuerunt, aut per alium egresserunt, et admistum perinde lutum †), et aquam saponariam ***).

Cum vero aqua non perinde ut aër pulmonem ita distendat, ut per rarum elementum sanguis de arteriis in venas facilius transeat b), et potius pondere suo transituro sanguini resistat, fit ex submersione, quod ex strangulatione, ut nempe sanguis in arteria pulmonali, ventriculo et auricula dextra, inque venis ad cor ducentibus colligatur, neque ullus in sinistras ****) caueas, etiam meo experimento; ita subtracto sinistro cordi suo stimulo quiescit idem, et venae demum rumpuntur, aut in pulmone †), aut alibi. Ita in Cl. viri, Professoris nunc Göttingensis, Ioh. Friderici GMELINI periculis, ita in HAENII, pulmo a congesto sanguine infarctus est, ut aquae iecoris similis videre.

***) HANNÖVER. MAGAZ. 1763.

****) BÜTTNER P. II.

†) WEBER ib.

q) adde WEBER fasc. II. 2.

††) GYMMER l. c. exp. 2. 4. 6. 7. HANNÖVER. MAGAZ. 1763. MENDEL.

p) lin. 4. adde HAEN rar. med. T. XV. BOYLE Philos. Transf. n. 62. GYMMER l. c. MENDEL. — lin. 6. adde GYMMER ibid. exp. 2. 4. BOYLE philos. Transf. n. 62. in ann. V. Medec. in lite Claudinae Rouge experimento facto.

†††) GYMMER ubique Exper. I.

*) Ipse FORESTVS obs. chir. Lib. VI. p. 33. PIA sur les noyés.

***) Homo Cl. PIA dictus etiam stercus deglutitum, et simul tres pintas aquae renouauit, IV. P. 155.

****) FOREST. XV. obs. 2.

****) EVERS in suffocatis a fumo carbonis, a fumo sulphuris. Ceterum huc quoque spectant. not. g) et k); legendum tamen est loco SAVVAGES Aët. Litt. Vpsal. 1742 ab aëre non renouato.

†) ROUX Journal de Medec. 1774. Mois Octobre.

videretur, et fundum peteret ††). Haec theoria, mortisque ab impedita respiratione deducta causa †††) confirmatur experimento canis, qui submersus sub aqua vitalis superest, si per longum tubulum ex aspera arteria eductum super aquam ei aeris commeatus referuatur ††††). Hinc submersi feliciter nonnunquam per HOOKII experimentum seruati sunt u).

Hi homines aliquamdiu non viuunt *), cum neque cor saliat, neque respirant **), neque sentiant, neque extracti meminerint eorum, quae sibi acciderunt ***), demum frigeant toti, et eorum conditio in veram, perpetuamque mortem transeat, nisi auxilia artis accesserint. Aliquod tamen tempus est et pro strangulatis, et pro submersis, et pro enectis a fumo carbonario, in quo a benefica amicorum industria fuscitari possunt; idque tempus in submersis quindecim minutorum, semihorae, etiam horae integrae in iis miseris fuit, quos Societas Amstelodamensis vitae reddidit ****). Mirificas historias legas, in quibus narratur, multas post submersionem horas tamen potuisse vitam restitui, maxime mirifica olitoris PECHLINO dicta; non facile tamen fidem adhibeo, qui et ipse vidi, et CL. HAENIVM †) et GMELINVM habeam consentientes, pauca post minuta horae aues ††), canesque irreuocabili morte interiisse, neque vllō conatu, neque scintillis electricis eductis potuisse fuscitari. Videtur hic aliquod hominis esse priuilegium, qui cum paulo aqua grauior sit, subinde emerferit, aëremque captauerit, cuiusmodi cani vi sub aquam merso nihil contingere potest. Id tamen priuilegium non potest adeo laxari, vt homo haecenus animalibus quadrupedibus simillimus, et perinde aquam deglutiens, euentus ab animalium casibus totos diuersos sperare possit, et procul dubio praesidia, quae continuo laudabo, saepe tenax illa spuma inutilia reddiderit, quae pulmo et bronchi submersorum replentur.

Nempe ea si via libera foret, ab aëre in os inflato plurimum sperarem, quo infantes *), qui a partu non valebant respirare, vitae sunt reddit; quo restituti,

†) BÜTTNER I. C. WEBER, II 6.

††) *Hist. de l'Acad.* 1725. 12.

†††) pag. 225. Auctor excidit.

*) Lib. IV.

**) Obscure respirare ESCHENBACH.

***) PJA.

****) DRENKELING, p. 28. Minutis 30 hirundo *Hamb. Magaz.* 1767. n. 20. Verum non erat mortua, et cor pulsabat.

†) Difficulus fuscitavi, sic HAEN XV. Vnicum canem post 4 minuta idem HAENIUS reuocauit, sic ESCHENBACH. Multa animalia non potuit fuscitare PORTALIS a vapore moribunda.

††) Post semiminutum mortuae R. BOYLE *Philos. Transf.* n. 62. Alia animalia intra sex minuta, sic musculus celerrime.

*) MENDEL, PORTAL apud COLOMB. p. 17.

tuti, quos fumus carbonarius occiderat; quod etiam auxilium passim et a Cl. BERTANDI, et WESZPREMI, a BORELLO aliisque commendatum sit, et ab E. SQVARIO luculento experimento in femina confirmatum, quæ 45 minutis horæ in puteomersa fuerat d), quod idem Amstelodami frequentissime efficax experti sint. Omnino etiam nunc, ut in HOOKII experimento, aëre vi impulsō pulmo moribundi hominis distenditur, et redditur sanguini arteriæ pulmonalis libertas, qua in venam transire, pulmones expedire, in arterias viam sibi aperire possit. Cor etiam sinistrum, quod ab officio cessauerat, ad pulsationem redibit, stimulo recuperato, quo ex lege naturæ ad micandum compellitur **).

Cum vero aut ob eam, quam accusui, spumam ***), aut ob aliam quamcunque causam aër impulsus difficiliter pulmonem distendat, alio modo quaesitum est, ut cor quiescens, restituto sanguinis stimulo, ad micationem incitetur. Bonus olim ALBINVS m), et nuper ROEDERERVS n) suaserunt, compressio abdomine et pectore, sanguinem mechanica pressione vrgeret, ut ad cor sinistrum veniat.

Affine auxilium est id, quo WEPFERS o) olim, deinde NEEDHAMVS p) corda mortua cogebat reuiuiscere. Inflabat ductum thoracicum; aër in pulmonem veniens vrgebat sanguinem, ut in sinistras cordis caueas subiret, ita pulsuum rhythmī redibant.

Non alienum ab isto consilium est incisionis venæ alicuius z), potissimum vero iugularis venæ ****), ut peramplæ, et cominus pulmoni præfectæ. Ostendi in vivis animalibus b), quoties cor quieuerat, et sanguis arteriosus a motu cessauerat, incisa vena sanguinem fluxisse, et cor ipsum ad motum rediisse, dum simul oneratus pulmo liberabatur. Id consilium vulgo notum est, et ab Amstelodamensibus passim vtiliter adhibitum. In Cl. GVMMER experimento canis reuixit, cui aquismerso casu †) iugularis vena læsa fuisset.

Plerumque tamen facilius auxilium præfertur, irritatio nempe quæcunque vehementior, sternutationem ††) cientia medicamenta, acria ori infusa †††), naribus-

d) *adde* PORTAL *rappor.* In puerpera PIA IV. p. 174. alia p. 157. in viuo GRVVEL Eph. Nar. Cur. Dec. II. anno IV. obs. 43.

**) Lib. IV. ad fin.

***). Negat IEANNIN *morr. subire*, p. 29.

z) *adde* PORTAL *rappor.* in suffocatis a noxio vapore. Ceterum verba not. b) Anhelosus — THRUSTON p. 64. huc quoque spectant.

****). DRENKELING I. p. 28.

†) Exp. 6.

††) Huc spectant loci THRUSTON, BRVHIERI et PARACI *not. s)* laudati

†††) *Journ. Helvetiqu.* BOERHAAVE, *vid. not. r).*

naribusque, ignis admotus †††), dolor quicunque vehemens r), adspersa abunde frigida *), scintilla electrica †*), et potissimum clyster tabacarius ***) proprium per siphonem subditus, ut acris fumus incensi tabaci diu et repetito in intestinum impulsus id ad motum peristalticum sollicitet, ac eo motu ipsa sanguinis circulatio, cordisue motus restituatur. Hoc instrumento Societates illae beneficae Amstelodami et Parisiis nunc feliciter uti solent s).

Bronchotomen referas ad inflatum aërem. Eam proprio libello DETHARDINGIVS iunior commendavit, et experimento confirmavit ****), alii improbant.

pag. 252. l. 4. post liberum adde per totam vitam

ibid. l. 9. adde Sed etiam in I. F. GMELINI experimento catellus sub aquasmersus periit, cui foramen ouale nondum clausum fuerat. Et apud PIERKINVM Leodiensem submersus interiit, cui foramen ouale apertum erat l*). Fabulosum est, castori, aut phocae adulto foramen ouale apertum patere.

ibid. l. antepenult. post scripsit adde et alius, de quo Walther RALEIGH apud R. BATHURST;

p. 253. l. 11. Sed in nixu collum - - qui sub clauicula protuberaret lege sed in nixu sanguinem in vasis stare et colligi ostendimus y*).

p. 254. l. 1. post salit adde in Stephani HALES experimentis in equa quatuor integris pedibus.

p. 255. l. 6. post qui adde arterias

ibid. l. 11. non ea vnice diameter lege non axis siphonis solus,

p. 256. l. 6. post determinetur adde cui positis massae a caloris gradibus

$$m = \frac{11\text{ am} + 8\text{ bn}}{11\text{ a} + 8\text{ b}}$$
 et alterius massae b gradus caloris $n = \frac{11\text{ am} + 8\text{ bn}}{11\text{ a} + 8\text{ b}}$ inde positis massis aëris et sanguinis aequalibus, calore vero aëris minori, quam calor

†††) Verhandel. der Holl. Maatschapp. IV. p. 418. ISNARD in libello.

*) Huc pertinent not. u) et x) quibus adde PIA spiritu salis ammoniaci in nares dato.

**) In suffocatis a noxio vapore PORTAL. Canis, qui in specu Agnani lacus exanimis factus est, a solo aëre non facile suscitatur, melius in aquam proiectus BIRCH Hist. of the R. Soc. l. p. 421.

***)) In exanimis a lapsu PIA IV, p. 137. Motum submersae aui ego reddidi, non vitam.

s) lin. 5. adde PIONIER in Journal des Sçavans. PIA saepe P IV. ita reuocari vidit, cum nihil aliud proficeret — et post n. 82. adde Resicit in casu vaporis noxii PORTAL.

****)) PIA IV. p. 178. 179. post semihoram. Laudant in Drenkelingen, l. p. 28. (Ceterum eae notae, quibus nullae noui textus litterae respondent, delendae sunt).

l*) SIGAUD de la FOND p. 298.

y*) Lib. VIII, Sect. IV. n. 34. p. 397.

pag. 254 not. p) adde Pulsus inspiranti minuitur GALEN. diff. respir. p. 12. Suffocatio voluntaria CIGNA respir. n. 3.

calor est sanguinis, ut a + 8 sit incrementum caloris in aëre = 11. Ab ea formula *Rickmanniana* iterum aliter se habet, sed parum differunt omnes.

pag. 256. l. 18. *post* clauso *adde* aër.

ibid. l. 20. aëreum *lege* sanguinem

p. 257. l. 7. subquindupla *lege* subquindécupla.

p. 258. l. 5. *lege* et paulo ultra

ibid. l. antepenult. *lege* Sed aër non renouatus amittit eas dotes, per quas ad respirationem aptus est. Cl. *Stephanus Hales* u) 522 pollices cet.

p. 259. l. 25. *adde* Id vero putatur fieri, si aër elaterem suum amiserit, quo in pulmone retinetur.

p. 260. l. 15. *adde* Nunc quidem ostensum est, merito haëtenus dubitari, num id, quod aër in respirando amittit, id ipsum, propter quod ad respirandum utilis erat, et nunc desinat utilis esse, num id elater sit. Putredinem suspicantur alii. Demus vaporem subputridum de pulmone halare, aërem inficere; is tamen certo adeo tenuis est, adeo debiliter putridus, ut in homine sano nullum putredinis signum edat. Et tamen is aër retentus continuo suffocat, cum aër latinarum euidenter putridus, aut aër de cadauere multis horis respirationi sufficiat, et morbum faciat, non vero strangulet. Demus iterum vapores vitriolicos, sulphureos, bronchia constringere, pulmonem reddere immeabilem, nemo tamen in aëre pulmone retento, aut in anima eiusmodi acrimoniam ostenderit. Quare ne supra ea progrediamur, quae certa fide nobis comperta sunt, in eo effato subsistimus, aërem, utcumque id fiat, certo per respirationem amittere eam aptitudinem, qua pulmonem dilatare, atque sanguini iter aperire debet. Num vero aër vitiatum pulmonem quasi conuellat, num vnice cesset distendere, nondum definitio e*), eo minus, quod nuperi clar. viri mortem ab aëre putrescente illatam ne quidem defectui respirationis tribuant.

p. 261. l. 9. *adde* et nuper Cl. *IADELOT* o*).

ibid. l. 18. *adde* Demum omnino eum neruum non comprimi certum est, qui in pleurae canaliculo sibi exculpto tectus descendat, neque conuexus pressioni se offerat.

p. 262. l. 17. *post* recurrero *adde* qui placitis *STAHLII* nunquam fidem dedirim; irascuntur potius, qui me a *BOERHAAVII* sententia, et a mechanica secta

pag. 259. not. D) *adde* *COTTE* *meccorol.* p. 331. sic in animali per electrum occiso.

e*) *GARMINATI*, p. 109. Siquidem in eodem aëre neque hirudo percat, neque multi alii vermes.

pag. 261. not. o) *lege* *KRÜGER* de *neru. phren.*

o*) *Physl. corp. sani.*

secta deficere queruntur, vt plane apostatae nomen mihi impingant. Verum non alia mihi secta est, nisi agnita veritas, aut id, quod mihi quidem verum videtur. Nunc tota respiratio etc.

pag. 262. l. 18. *post* vidi *adde* tum vt alii clari viri,

ibid. l. 19. *post* replent *adde* aërem retinent in distento pulmone, aut subito deplent cet.

ibid. l. penult. *post* aliaque *adde* meticulosa.

p. 263. l. 26. *lege* et quidem omnium minime

p. 264. l. 24. *post* produci *adde* facile

ibid. l. 25. *post* quam *adde* vix et *post* potui: In sternutatione posse non ignoro.

Sed nullus eius violentiae stimulus ab homine recte valente percipitur.

p. 265. l. 26. *adde* et inhiberi possit.

p. 266. l. 9. *adde* mortalium.

ibid. l. 14. *post* inclinatae *adde* aut demum, vt nuperi, malunt, frigore occupatae, somnoque fuere, cum arundinibus a vento merguntur.

p. 267. l. 8. *adde* a linteamine, a casei frusto, ab vuae acino,

ibid. l. 12. *post* infantes *adde* et in Martinica insul. aethiopes,

ibid. l. 17. *adde* Subito demum ipsae illae hirundines ad ferendam hiemem natae, et irreuocabili morte pereunt, si sanae, validaequae sub aquas mersae tenentur.

p. 268. l. 1. *post* corpus *adde* peregrinum

ibid. l. 9. *adde* fringillam etiam minori tempore.

p. 269. l. 7. *lege* neque ad obseruandam naturam cet.

ibid. l. 12. *post* maius *adde* Celebre nomen est abbatis *Moccia*, viri ingeniosi, obesi, qui nulla sub aqua mergitur. Hystericas feminas, dum paroxysmus viget, non mergi vulgo notum est, et multa eiusmodi exempla in *Causis celebres* collecta sunt.

p. 270. l. 13. *adde* Sed neque in strangulato homine mortem moratur.

ibid. l. antep. *lege* Eos enim homines creditum est ex apoplexia cet.

ibid. l. ult. *post* meras *adde* et vasa cerebri saepe sanguine plenae sunt.

E 2

pag.

pag. 262. not. s) *lege* GÜNZIUS.

ibid. not. x) *post* GALENUS *adde* mor. muscul. II. 5. vbi manifeste separat a corde et ab intestinis, quae a natura reguntur, non ab anima;

ibid. not. z) *lege* VALISNERI etc.

pag. 263. not. i) *lege* Passum de seruis nigris, quos citauimus. *Adde* THIBAVLT, MARTINI.

pag. 264. not. l) *adde* Contra ea YPEY, p. 16.

ibid. not. n) *adde* YPEY.

pag. 268. not. p) *adde* Septem Astracani apud S. G. GMELIN It. II. p. 205.

pag. 271. l. 3. *adde* Vera tamen et vulgarior mortis causa est, quod sanguis in arteriis pulmonalibus, in dextris cordis caueis, in venoso systemate collectus restagnat.

ibid. l. 9. *adde* luxatum caput *i**), ruptas vertebrae, ut caput de cute penderet; sic etiam a laqueo musculus mastoideum, musculos laryngis, laryngem ipsum fractos.

p. 273. l. 10. *lege* renumque

p. 276. l. 6. eas *lege* cartilaginee

p. 278. l. 19. *adde* Merito eadem, quae a relabentibus in naturalem situm thoracis partibus etiam absque musculorum motu fiat, ultimum est naturae fatiscantis in moriente animali molimen.

p. 279. l. 4. *post* accesserit *adde* neque tunc aut facile, aut semper.

ibid. l. 7. *post* ratione *adde* et etiam is lobus solus natat, qui solus respiravit, dum alter fundum petit, ad quem aëri nondum datus est accessus.

ibid. l. 11. *adde* ut toties vidi in pullis meis.

p. 280. l. 4. *post* praestat *adde* Ita interpretor experimenta dissona clar. virorum, in quorum aliis pulmo fetus, qui nunquam respiravit, per putredinem natavit, in aliis subsedit. Vidi et ego subsedisse, cum aliquot mensibus pulmo in cloaca cum fetu fuisset servatus, et ex eo phaenomeno causam summi reae servandae. Sed alias utique et certo natale vidi. Maxima demum, et perfecta putredo, postquam volatile omne et aër exhalavit, et solus fere mucus atque terra de fetu superest, iterum subsidentiam efficit *2**).

ibid. l. 3. *adde* quam videbit bullarum specie de tota superficie aut pulmonis, aut integri fetus quasi efflorescere.

ibid. l. 11. *post* respiravit *adde* Summa putredo, quae pulmonem et integra corpuscula fetuum in tabum resolvit, dissipato aëre iterum sinit tabum fundum petere, in quem pulmo versus est.

p. 281. l. 5. *adde* et III. PORTALIVS;

ibid. l. 8. *post* vitis *adde* post pleuritidem, peripneumoniam, scorbutum, asthma, haemoptoën

ibid. l. ult. *post* agitavit *adde* Neque enim adeo subito fetus respirat, neque cum vigore *u**). In fetu in utero pulmones compressi rubri fundum petierunt

pag. 279. *ad verbum* densus in *textu* lin. 3. *adde* not. *i**) BÜTTNER zweyköpfige Frucht,

p. 13. 14. Sed nuper addit, non tamen ut subsideat.

*i**) SABBATIER p. 102.

*2**) BOCKEL.

pag. 280. not. *u*) lin. 2. *adde* BÜTTNER zweyköpfige Frucht, II. ROSE de diagnosi vitae fetus et neogeniri.

*u**) SABBATIER II. p. 131.

runt u**). Etiam pulmo fetus mortui inflatus, cum pars nataret, parte sui subsedit u***).

Apparet, siquidem haec est ex celeberrimis quaestionibus ad medicinam forensē pertinentibus, argumentum a pulmone natante et subsidente repetitum bonum esse, verumque, ut subsidens ostendat fetum non respirasse, natans respirasse confirmet, neque fallere, dum simus memores, putredinem efficere posse, ut pulmo fetus natet, etsi nunquam aërem duxit; morbum facere, ut subsideat, qui dudum et repetito respiravit. Noui Ill. viros etiam nuper dissentire, et negasse putredini eam potestatem, sed certo, quae vidi, refero, et quae nullo experimento negatio possunt refutari.

pag. 282. l. 7. *post* subsidet *adde* cuius euentus certa sunt testimonia.

Compressus in fulgurato, in animali in crypta canina enecto.

ibid. l. antepēn. *post* vndique *adde* a contracto pectore

p. 283. l. 24. *adde* Cl. BERNARD per respirationem singulo in pulsu plus aëris in sinistrum cordis ventriculum penetrare, calculis positis, existimauit.

p. 284. l. 13. *adde* Apparet adeo, quod non adeo facile erat praeuidere, eundem esse effectum diutius protractae inspirationis et respirationis; in priori casu, et in altero perinde vasa sanguinea compressa esse, et sanguini imperia. Inspiratione protracta vasa et bronchi se spontanee contrahunt, cum a corrupto aëre male distendantur. Post longiorem expirationem et vis contractilis bronchiorum pulmonem constringit, et vna thoracis pressio.

p. 285. l. 11. *post* transmittunt *adde* frigida eadem,

ibid. l. 13. *adde* hīdem branchiis vinculo constrictis male afficiuntur, hiant, celementer os aperiunt, clauduntque, et morti videntur proximi. Laxato tamen vinculo ad se redeunt Ill. GOVANO teste. Sed huius phaenomeni alia causa est, et sanguinis vnice circuitus turbatur, non exigua arteria vinculo intercepta.

ibid. l. vlt. *adde* reuiuiscunt a*).

E 3

pag.

u**) BÜTTNER l. c. u***) Id. ibid.

pag. 284. l. 22. *ad verbum* auibus *in textu* *adde* not. b*) Aues continuo SPALANZANI epuscoli l.

ibid. not. z) *adde* etiam vipera.

pag. 285. not. k) *adde* Catellus non reuixit.

ibid. not. s) *adde* SPALANZANI.

ibid. not. r) *lin.* 2. *adde* Non pereunt BOYLE n. 62. — *lin.* vlt. *adde* Ad se redierunt Philof. Transf. n. 33.

ibid. not. y) *lin.* 1. *adde* Sic SPALANZANI. ibid. — *lin.* vlt. *adde* Reddito aëre conualescunt BOYLE n. 62.

ibid. not. z) *adde* Aliae perierunt BOYLE n. 62. aliae ad se redierunt.

a*) BOYLE l. c.

- pag. 286. l. 3. *lege* Etiam facilius ex sanguine animalia aut aëre carent *b*)*, aut levio-
riorem et rarefactum ferunt *c)*, ut cochleae, aut congeneres limaces *d)*, cet.
ibid. l. 7. *post* volare *adde* sunt, quae, mortua cum videntur, aëre reddito vitam
recuperent *i*)*
- p. 287. l. 15. *adde* Contrarius est expirationis in venosum abdominis sanguinem
effectus. Quum enim diaphragma venam cauam inter inspirandum com-
primat, sanguinem a pectore repellit, intra hepatis venas et inferiorem cauam
cogit refluere; exspiratio contra laxato diaphragmate, agentibus nunc abdo-
minis musculis vniuersum abdomen vrgentibus, sanguinem cordi facilius
reddit.
- p. 288. l. 18. *adde* Erinaceus, qui hieme sopitur, non respirat conglobatus;
idem respirationes molitur, si extenderis *t*)*.
- p. 291. l. 21. *lege* Contra in maligna febre celerem respirationem viderunt clari
viri, pulsu parum mutato *m*)*.
- ibid. l. 23. *adde* In Cl. MARTINI annotationibus pulsus in variolis alio et alio
tempore diuersam ad respirationem rationem habent. Fuerunt pulsus 127
cum respirationibus 35, et 140 cum respirationibus 37, et sic aliae et aliae
rationes fuerunt *n*)*.
- p. 292. l. 12. *adde* Alios calculos iniuit Cl. BERNARD, quos nunc, cum hae-
res non possint certis experimentis definiri, malumus omittere.
- p. 296. l. 21. *adde* Sed ea melius dicemus, quando de fugendo lacte sermo erit.
- p. 298. l. 13. *post* moratur *adde* ut arteriae distendantur *m*)*; et *post* aneurysma-
ta *lege* a nisu adeo frequenter nata, ut etiam in equis *n*)* notissimum morbum
efficiant, demum a nixu arteriarum et venarum, ipsiusque cauae diruptiones,
inque nitentibus crebrae cet.
- ibid. l. 15. *post* sparsae *adde* ut haemoptoën nimis notam omittam.
- ibid. l. antepen. *post* pulmonem *adde* cuius vasa rumpi visa sunt *q*)*; et *post* capi-
tis *adde* congeritur :

pag.

b)* SPALANZANI tardissime pereunt.

i)* BOYLE *Phil. Trans.* n. 63.

c) TARGIONI *Viagg.* VII. p. 177.

n)* *Wercusk. Academ. Handlung.* 1773. Trimestr. 3.

pag. 298. not. *m)* *adde* In minimis vasculis sanguis a nisu acceleratur CALDANI expe-
riment.

m)* HALES p. 102.

n) *lege* LANCIS. *aneurysm.* p. 110. edit. nou. Le DRAN *obs.* 150. *Hist. de l'Acad.* 1700.
hist. 6. 1750. *hist.* 3. SAVIARD *obs.* 40. GVIATTAN. *obs.* 2. RELOF *Mém. de Berlin.* T. XIII.

n)* Fontes ascendentes *Ger. v. SWIETEN* IH. p. 288.

q) *lege* HIPPOCR. *Epidem.* IV. n. 14. cum homo alnum festulisset.

q)* CLAYDER *de method. balsmand.* p. 175. in cane.

pag. 298. l. vlt. *adde* Ruptae venae *t**) ; sanguis effusus sub membrana pulmonis, qua ad claviculam veniebat *t***).

p. 299. l. 2. *adde* Eodem pertinet sanguinis tantus impetus, ut per lotii vias exeat *u**), inque cutis vascula *u***), et in varia spatia cellulosa *u*†), ut etiam de labiis erumperet *u*††).

ibid. l. vlt. *lege* isque succedit

p. 301. l. 4. *post* calculosa *adde* minime rara

ibid. l. 6. *adde* officula, nummi, vuae acini, spica graminis.

p. 302. l. 20. *adde* Demum a calcis vapore, ab helleboro, frequentissime repetita.

p. 303. l. 4. *adde* Pisum de aspera arteria succussione eius reiectum.

A stimulo facilius extorquetur, quam tussis, certe in homine, stimulum autem putes teneriori membranae admoueri nempe narium, quae acutius, quam in bronchis sentiat.

p. 305. l. 4. *adde* Voluntatis opus agnoscas, cuius in cerebro sedes est, et quae organa sibi idonea, nec alia in motum ciet.

p. 306. l. 16. *post* extinxerunt *adde* Diaphragmati inflammato et laeso, certissima testimonia sunt, neque risum superuenisse, neque singultum. Optimus olim ITHIVS, quo cariorem et gratiorem discipulum nullum habui, cum ex morbo acuto interiisset, diaphragma inflammatum, abscessu etiam erosum habuit, neque vllus risus praecesserat.

A calculosa materia convulsiones et risum Sardonium natum legi, nempe eam faciei conditionem, quae in risu obtinet.

p. 308. l. 4. *adde* A risu aneurysma. Vulnus arteriae a risu funesto euentu recludit.

p. 310. l. 1. *post* incluso *adde* aut ab eius abscessu *y**),

ibid. l. 9. *post* reformidaui *adde* Par fere causa singultus fuit in dysenteria, in gangraena intestinorum, a ventriculo a protracto epiploo laceffito;

ibid. l. 17. *adde* ab ictero ex abdominis vulnere.

p. 311. l. 22. *lege* et post sonum succedit expiratio, ita certe vulgo docetur, nescio quid enim mihi superest obscuritatis.

pag.

*t**) Zed. Gall. III p. 444.

*t***) BECKET *obs. chirurg.* 16.

*u**) LISTER *ad Aphorism.* HIPPOCRAT. p. 121.

*u***) Sudor inde cruentus *Eph. Nar. Cur. Cent.* VIII. *obs.* 81.

u†) In scrotum SAVIARD p. 129.

u††) In ultimo Epiri principe Alcaandro, quem vulgo vocant Scanderbeg S. ALBERTI de *furore cruento.*

*y**) VPEY 202. 203. Pure per alium decedente idem quieuit.

pag. 311. not. *u*) *adde* TSCHVDI de *singultu*, STÖRZEL de *singultu.*

ibid. not. *x*) *adde* TSCHVDI.

- pag. 311. l. penult. *dele* Num sit inter - - - et vidi in puerulis.
 p. 312. l. 2. *post* trahitur *adde* Immo vero Cl. STÖRZEL putat in singultu oesophagum manifesto moueri, et ventriculum sursum trahere a*). Sed repugnant phaenomena diaphragmatis descendens, cum quo non potest non oesophagus descendere.
 ibid. l. 16. *lege* fatellitium

SECTION V.

RESPIRATIONIS UTILITAS.

- Pag. 314. l. 18. *post* priuatur *adde* ita certe relatum est.
 ibid. l. 23. *post* vixisse *adde* Eodem tempore catellus vixit, quem, postquam respirauerat, BUFFONIVS lacte merfit.
 p. 317. *post* extensione *adde* a capite extenso, collo educto, arteria aspera dilatata, a nixu fetus ad contrahendos omnes suos musculos edito,
 p. 318. l. 25. *post* suscitentur *adde* per multa et bona experimenta, quod cor, quod absque motu fuit, nunc micet, id pertinere cet.
 p. 319. l. 6. *post* reiciunt *adde* Sic vniuersa animalia, quae in testis viuunt.
 ibid. l. 8. *post* introducunt *adde* vniuersasque corporis partes adeunt.
 ibid. l. 13. *adde* De polyis vitque, aliisque animalibus perpetuo sub aqua viuuntibus, simplicissimis, corde destitutis, non affirmauero, spirare, sed vermes, mollusca, insecta, quadrupeda, aues respirant, neque pisces absque renouato aëre viuunt.
 ibid. l. ult. *lege* sanos et *post* commercio *adde* Demum experimenti causa Cl. HERRISSANT bufones in gypsum inclusit, vixerunt duobus mensibus.
 p. 320. l. 15. *post* aeuo *adde* ab HIPPOCRATE, ARISTOTELE et GALENO
 p. 322. l. 21. *post* percepisse *adde* In suffocato infante globulos aëreos ROEDERVS vidit.
 p. 323. l. 8. *post* demum *adde* in morbo bouum, in renum, aliorumque viscerum superficie, et intestinorum, in ouarii sacco
 ibid. l. ult. *post* tympanites est *adde* saepe et alias visus
 p. 324. l. 2. *post* regionibus *adde* in abdominis, in pectoris cauitates effuso.
 ibid. l. 11. *adde* Aërem, quo otides iratae pellem sub collo inflant, putes ex pectoris cauea eo venire.

pag.

a*) l. c.

pag. 312. not. e) *adde* ARISTOTELES *posth.* 33.pag. 319. not. h) *adde* *Extrait des Journaux*, 1773. Janvier.

pag. 325. l. antepen. *adde* Extant equidem nuperrima experimenta Cl. DARWIG, quibus haec omnia videntur refutari. Nempe iugularem venam, et vesiculam felleam sub antlia pneumatica non intumescere subtracto aëre, neque venam cauam sanguine plenam, vesicam vrinariam vti que *d**). Mira haec, quae contra tot alios clar. viros adoptare vix ausis.

p. 328. l. 20. *lege* reddi

ibid. l. vlt. *adde* de quibus alias fusius agemus.

p. 331. l. 1. *lege* admitti,

ibid. l. 6. *lege* aduenire,

p. 332. l. 4. *adde* vt nuper Cl. CIGNA.

p. 333. l. 17. *adde* Idem alii elementum pro electrica materia habent.

p. 334. l. vlt. *adde* et imminentem putredinem auerti DOSSIE.

p. 335. l. 11. *post* admistam *adde* et plurimum phlogisti,

ibid. l. 15. *dele* nitri

ibid. l. penult. *post* adhaerescens *adde* cum calce addita

p. 336. l. 1. Non *lege* Nam et *post* parari *adde* in nitrum

ibid. l. 4. *post* aërem *adde* internum corporum

p. 337. l. 13. *adde* et in quibus aër verus elasticus admistus, neque solutus adest.

ibid. l. antepen. *adde* Ipso calore sanguinis sanguis a 96 ad 120 gradum dilatur, vt volumen eius $\frac{7}{17}$ augeatur o*). Aliquantum sanguinem comprimere posse non miraberis, cum nuper demum compertum sit, et aquam, et vini spiritum, et olea aliquantum comprimere posse, vt tamen ea ratio exigua sit, et 44. 48. atque 66 per millionem diuisis o**).

p. 338. l. 19. *post* nasci *adde* aut demum, ad nostros enim fines perinde est, ad fermentationem pertinet, quae putredinem praecedat.

p. 339. l. 13. *post* tunc *adde* arteria sanguine plena

p. 340. l. 20. *adde* Viscera ipsa et sanguis in cadauere, qua aër contingit, florida rubescunt. Oricellae etiam tincturae et purpurae muricinae aër demum ruborem impertit. Sed haec dudum expendimus.

p. 341. l. 10. *post* haemoptoe *adde* cui nulla, nisi simplicissima medicatio chirurgica adhibita fuit

p. 342. l. 14. *post* exit *adde* et de otide diximus, quae pellem inflat.

p. 343. l. pen. *lege* et 482 ad 464 $\frac{1}{2}$

pag.

pag. 329. lin. 15. *ad verbum* receptus *adde* not. y**) Contraria quidem horum NOLLETVS, et plus inspirari aëris, quam expiratur.

o*) FALCONER *baulwearers*, T. II.

o**) *Philos. Transf.* V. LIV.

pag. 344. l. 14. i20 *lege* 125

ibid. l. 22. 32. *lege* 36

ibid. l. 23. *adde* retentis mensuris *Stephani* HALES.

p. 346. l. 17. *lege* vt illum potius calefaciat,

p. 348. l. 10. *adde* quorum vterque intra idem tempus euacuatur.

ibid. l. 15. *lege* neque tamen aliquem eo tempore fuisse pulmonem,

p. 350. l. 14. *adde* In morbis etiam ostendimus, perpetuo latiore fuisse cordis ventriculum, qui difficulter se suo sanguine liberabat.

ibid. l. 22. *lege* quem arteriosus ductus de sanguine in pulmonem tendente auerit.

p. 351. l. 1. *lege* accessum

p. 352. l. vlt. *adde* non vero repugno.

p. 354. l. 16. *adde* Particulae per pulmonem putrescentes potissimum diffantur, cum ad eam degenerationem humores nostri sponte inclinent x*). Hae etsi etiam de cute cum perspiratione *Sanctoriana* perspirant, tamen per pulmonem copiosius aufugere videntur x**). Multo enim vberius haec est exhalatio, quae modico in frigore oculis conspicua reddatur, non perinde perspiratio cutanea, quam demum in aëre multo densiori fodinarum *Clausthalensium* pariter de digitis fumantem vidi. Magis etiam odorata est anima.

Vna aufugiunt particulae alcaliscentes x***) foetidae, seu eadem fuerint cum putridis, vt vulgo putatur, seu coniunctae.

Demum phlogiston superfluum ea via dissipatur x†) adeo manifesto, vt homo in camera paulo accuratius clausa a pastu obambulans, phlogisti portionem in aëre eius camerae tertia parte augeat x††).

Non ideo sanguis refrigeratur, cum in sinistro corde non sit frigidior x†††); cauetur tamen, ne nimium phlogisti in animali coaceruetur summo cum eius periculo.

p. 355. l. 2. *adde* Quare nuperrime III. CIGNA noxii humoris de sanguine secessionem pro praecipua vtilitate habet, quam respiratio animali praestet.

p. 357. l. 19. *lege* sanguinem

p. 358. l. 12. *lege* venarum

pag.

pag. 346. not. k) *adde* Non esse ALBINVS *nat. hom.* p. 50.

x*) *Libr. V.*

x**) HOFMANN, qui eum finem faciendi pulmonis praecipuum fuisse putat.

x***) LANDRIAN.

x†) *Idem* p. 29.

x††) *Idem* p. 48.

x†††) p. 190.

pag. 358. l. 15. *post* apparuit *adde* Sed neque nuper Cl. SPALLANZANO, qui in pulmone sanguinem celerius, quam in mesenterio fluere vidit, quam in palato vero lentius.

ibid. l. 23. *lege* Et absque eo elemento in pulmonem recepto perinde cet.

p. 360. l. 3. *post* BOERHAAVIUS *adde* atque nuper BUEFONVS, qui pulmonem pro follibus habet, quorum motu vitalis ignis excitatur.

p. 361. l. 29. *dele* Venae cauae pressionem - - hic non repeto.

ibid. l. vlt. *adde* De venoso sanguine fere dico, in aortam enim diaphragmati multo minor est potentia.

p. 364. l. 15. *post* vox est *adde* vt olim Radulphus BATHURST vidit.

ibid. l. 16. *post* huic *adde* inter certas et euictas respirationis vtilitates

ibid. l. vlt. *adde* Haec ita dicta volo, non vt aliam aliquam efficaciam ad vitae radices profundius penetrantem, in respiratione esse negem; id volo, de eius ignotae vtilitatis natura, quam etiam animalibus in testis habitantibus et insectis aër in intimis praestet, mihi nondum liquere.

p. 365. l. 1. *dele* Parum forte satisfactum - - perspicacior intellexero.

ibid. l. 18. *post* scaturiginem *adde* Ita antagonisimum esse diaphragma inter et pleuram atque peritoneum, quas membranas cum suis cellulosis telis diaphragma alternis vicibus distrahat *f**).

ibid. l. pen. ineptae *lege* lentae *et* lin. vlt. *adde* nimis lentum, nimis inconspicuum, quam qui ad circuitum sanguinis adeo rapidum proximi aliquid conferat.

*f**) BORDEV sur le ziffu maqueux, p. 77. cet.

ELEMENTORVM PHYSIOLOGIAE

LIBER NONVS.

VOX ET LOQVELA.

SECTIO I.

LARYNX IN VNIVERSVM.

- P**ag. 366. l. 10. *post* quadrupedibus *adde* calidis
 p. 367. l. vlt. *post* pictas *adde* et medulla,
 p. 369. l. 6. *post* ossescit *adde* etiam vt medullam contineat,
 ibid. l. pen. *post* arteria *adde* et neruus,
 p. 371. l. 1. *post* mente *adde* quam praefens naturae testimonium
 p. 372. l. 17. *adde* etiam cetis
 p. 374. l. 4. *post* protegat *adde* quod miror potuisse nonnemi negari
 ibid. l. 6. *adde* osscam factam negat MORGAGNVS se vidisse.
 p. 376. l. 10. *post* vetusta *adde* GALENO dicta et ORIBASIO, non ignorata
 C. STEPHANO et EVSTACHIO, pro re noua a *Seuerino* PINEAV dicta,
 aque LAVRENTIO
 ibid. l. vlt. *post* innotuit *adde* BARTHOLINVS, C. BAVHINVS, DRELIN-
 CVRTIVS, et pro noua iterum re SCHELHAMMER.
 p. 377. l. 2. *adde* Muci sunt receptacula satis affinia valvularum, quas in mulie-
 bri pudemus dicemus.
 p. 379. l. 9. *adde* Membranaceum ligamentum ab epiglottide ad capitula carti-
 laginum arytaenoidearum abit, in quo in animalibus subinde duae cartilagi-
 nes obliquae reperiuntur *m**).
 p. 380. l. vlt. *adde* III. CAMPERVS tensionem ligamentorum minutius expo-
 suit *b**). Basin ossis hyoidis sibi relictis in statu naturali cartilagini thyreo-
 deae incumbere; in voce vero acuta reddenda os hyoides per suas vires an-
 trorsum duci, vt eius ossis basis vltra cartilaginem thyreoideam producat,ur,
 et simul larynx pone basin ossis hyoidei eleuetur; ita et ipse sursum it, et os
 hyoideum

pag. 369. not. c) *adde* CAMPER apud BVSCHE de organo vocis.

pag. 376. not. o) *adde* Ab obstructis ventriculis rocis vitium NEMESIVS.

*m**) CAMPER ap. BVSCHE de mechanis. organ. vocis homin. 1770. 4.

*b**) Apud BVSCHE l. c.

hyoideum antrorsum. Dum nunc cartilago thyreoidea ascendit, tendi ligamenta glottidis necesse est; dum enim ea cartilago sursum it, arytaenoideae cartilagine immotae persistant: dum interim (forte) aspera arteria diducta et vna cricoideam abducit, sic ut sola thyreoidea sursum eat. Porro ab osse hyoide thyreoidea in priora trahitur, cricoidea actione cricothyreoidei politici retrorsum. Ita ligamentis tensis vox acuta producitur.

Contra in graui voce cricoidea cartilago antrorsum ducitur, ita eius distantia a cricoidea nulla fit. Cricoarytaenoidei politici musculi cartilagine eius nominis deorsum et ad latera trahunt, processus anteriores ad se inuicem adducunt, ita bases earum cartilaginum deducuntur, glottis fere clauditur, sola pars postrema rimae dilatatur.

pag. 382. l. pen. *lege* transversum

p. 395. l. 17. *adde* Si vero thyreoidea cartilago alia a causa eodem tempore antrorsum it, cricoideam ipse retrorsum ducit, et glottidem tendit c**).

p. 386. l. 6. eo magis vero diducit - - et ligamenta relaxet *lege* guttales etiam cartilagine hactenus vertit, ut baseos finem interiorem ad anteriora conuertat, exteriorem ad posteriora.

ibid. l. 18. *adde* Contra CAMPERVS eum capitula quidem cartilaginum arytaenoidearum ad se inuicem adducere, sed bases diducere, rimam posteriorem dilatare, glottidem claudere docet. Nondum quidem hic a sententia recedo, cum praeterea musculus, de quo scribo, cum thyreoarytaenideo idem sit, qui, ipso CAMPERO consentiente, ligamenta glottidis relaxat.

p. 388. l. 1. *post* diducat *adde* sic etiam CAMPERVS.

p. 389. l. 15. *adde* A genioglossò WALTHERVS deduxit.

p. 390. l. ult. *adde* a filopharyngeo ad epiglottidem fibras WALTHERVS deduxit; a primae vertebrae processu transverso in totam partem transversam thyreoideae cartilaginis Nicolaus HABICOT.

p. 391. l. 17. *adde* Is mucus coactus in membranae speciem abit in morbo, quem Scoti nuperiores medici descripserunt, et dixerunt suffocationem frigidulam.

p. 397. l. 9. *adde* Maiores alias hydatides fuerunt.

ibid. l. 13. *post* vidit *adde* quae numerosa nuper egregius incisor Guil. HEWSON vidit, in dextro latere in angulum venam inter iugularem et subclauiam inserta, in sinistro in ipsum ductum thoracicum.

F 3

pag.

pag. 385. ad verbum posterioribus in textu lin. 17. *adde* not. c*) CAMPER apud BVSCH. c**) Tendere Cl. SABBATIER, II. p. 93. cuius sententiae argumenta nunc non possum in praesente larynge expendere.

pag. 386. not. h) *adde* CAMPER.

ibid. not. n) *adde* CAMPER.

pag. 388. not. b) *adde* CAMPER.

- pag. 399. l. 14. *adde* neque infrequens est, in morbose glandula vias apertas ad caueam asperae arteriae duxisse.
- p. 404. l. 6. *adde* Est vbi altera ab aorta accessit.
- p. 406. l. 19. *lege* Maior est, et a GALENO inuentore n) celebratus, quem cet.
- p. 408. l. 6. rarum *lege* ramum
- p. 409. l. 3. *adde* et in animali nuper Cl. PORTAL.
- ibid. l. 9. *post* scriptores *adde* idemque, quem laudau, PORTALIVS.
- ibid. l. 17. *adde* quo videtur Cl. CAVERHILL euentus pertinuisse, qui vocem debilitari vidit, non totam tolli.

SECTIO II.

ORGANA LOQVELAE.

- Pag. 414. l. 2. *adde* solet autem in quadrupedibus magis compositus esse.
- ibid. l. vlt. *adde* vel certe a membrana tendinea clauiculæ affixa q*).
- p. 415. l. 16. *adde* aut in altero latere, aut in utroque.
- p. 418. l. 20. *post* fuerit *adde* siue nunc in sua cum ossæ temporum dearticulatione fundata fuerit, siue retenta a masseteribus, temporalibus et internis pterygoideis, clauso ore, aut aperto, erit maxilla inferior musculo biuentri pro cet.
- p. 419. l. 4. *adde* Eodem tempore et maxillam superiorem eleuare et inferiorem deorsum ducere alii r*).
- ibid. l. 11. *adde* In deglutiendo utique agit, eiusque musculi actio digitis percipitur.
- p. 421. l. 20. *adde* Quadrupedibus ouiparis aliqua est minus libera, ut de ea in ipso crocodilo ambigatur c*). Insectis REAVMVRIVS (certe api), cochleae SWAMMERDAMIUS linguam tribuit.
- p. 422. l. 20. *adde* Nuperos chirurgos video de hoc frenulo, deque eius amputatione, ut de re non rara et de necessario auxilio dicere.
- p. 431. l. 18. *adde* atque vuula corrupta multos commode loqui HILDANVS testis est.
- ibid. l. 20. *lege* per veli palatini vitiata organa cet.

SECTIO

pag. 403. not. b*) *adde* NEUBAVER et ERDMANN *diff. posth.* T. 2. f. 2. MECKEL in *epist. ad me* II. n. 321.

q*) SABBATIER ibid.

r*) SABBATIER l. p. 411.

c*) Nullam habere ARISTOTEL. Part. IV. n. II. SEBA T. CX. f. I.

SECTIO III.

TONI.

Pag. 434. l. 8. *adde* Neque tamen dissimulandum est secundum Cl. la CHAPPELLE totum artificium poni in aëris penu, quem ventriloquus in posteriori parte caueae oris referuat, et pro arbitrio edit.

ibid. l. ult. *post* aquaticis *adde* auctore olim ALDROVANDO,

p. 436. l. 12. *dele* erinaceo,

p. 438. l. 13. *adde* lutra, lepore,

ibid. l. 14. *post* RVNGII *adde* atque veteris amici I. GESNERI, demum PORTALII. Idem experimentum eodem cum successu in larynge inferiori auium aquaticarum DVVERNEYO successit.

p. 440. l. 7. *post* percipitur *adde* vna arytaenoideae cartilaginee retrorsum ducuntur, et ad se inuicem accedunt.

ibid. l. 8. *adde* descendit etiam sola restitutione, quando vires eleuantes desinunt agere.

p. 442. l. antepen. *adde* In tussi conuulsua sonus acutus fit ob glottidis arctationem.

p. 445. l. 22. *lege* sonorum

p. 451. l. 8. *adde* Pro FERRENIO etiam Ill. CAMPERVS sentit, tantum vt vocem artificialem imperfectam et fuscam esse moneat, qualem nunquam non audiui.

p. 453. l. 3. *adde* A vocis robur aërem in auibz omnes fere in caueas etiam ossium receptum facere posse, Cl. I. HUNTER, quod in serino sit manifestissimum t*).

ibid. l. 21. *dele* in erinaceo - - - pene membranea.

ibid. l. antepen. *post* lacerta *adde* vocali

ibid. l. ult. *adde* Grauem et clangosam vocem gruis plicae tres asperae arteriae fecerint, quae in propria stemi carne repetito contra se ipsam insectitur, qualis etiam in cigno est syluatico.

p. 458. l. 17. *dele* Addi posset - - - ad humanam accedere.

ibid. l. 22. *post* expriment *adde* aut alias aues, cum quibus educantur, discunt imitari,

SECTIO

pag. 432. not. s) *adde* cum nulla vuula esset, adultior certas litteras pronuntiare non poterat WEDEL morb. infant. p. 12.

pag. 435. not. l) Quae in prima editione Auctor de vocis in anseris organo p. 449 et 450. not. r) disputauit, ea in noua huc retulit.

t*) Phil. Transact. n. LXIV.

S E C T I O IV.

L O Q V E L A.

- P**ag. 465. l. 12. *adde* Vt possint in lingua Tamulica 13 diuersae vocales esse, aut 16 in Sanscritica, id quidem non intelligo *m**).
- ibid. l. 19. *adde* Insulae Taiti *e, g, s, z* non pronuntiant. Iroseskii *b, f, m* et *p*.
- ibid. l. antep. *adde* Sunt tamen in lingua Sanscritica euidentissimae litterae consonantes, quas numerant omnino 35 *r**). In Tamulica, cui tantum 18 numerant, sunt tamen duae Europaeis ignotae et saepe a Danicis missionariis citatae *r**), quare fit, vt alii et alii Europaei eas suis litteris aliter exprimant, etiam vt alii *d, h* scribant, alii *r*.
- p. 468. l. 12. *adde* A Chinesibus *d* nunquam pronunciat
- p. 472. l. 15. *adde* Hac vitia potius ad veli palatini morbos retulerim, quam ad vuulam proprii nominis *r**).
- p. 474. l. 8. *post* lego *adde* et alia affinia exempla video.
- ibid. l. antepen. *post* docent *adde* restituere.
- p. 475. l. 18. *post* pendet *adde* et luscina, si absque parente cum alia auicula canora fuerit educata, eius vocem suam facit, neque porro luscinae cantum canit.
- p. 478. l. 11. *adde* Nuper legimus esse Edimburgi Cl. BRAIDWOOD, qui scholam pro docendis surdis et mutis aperuerat, vt virginem etiam mathemata docuerit *q**).

Deinde Cl. ARNOLD, V. D. M. prope Gieslam his ipsis annis patritium puerum Bernensem loqui docuit ad AMMANNI fere morem, ingeniosis artibus adiutus.

Cl. LASSVS et Abbas EPEE *q****) potius symbola aliqua et inuentionem docent, etsi LASSVS in principio etiam loqui docuit, quod institutum ob ingrate vitiosos accentus deferuit.

- p. 479. l. 6. *adde* Aliquanto facilius fit, quod hi pueri muti et surdi ingenio soleant valere.
- ibid. l. antep. *post* PORTA *adde* quod artificium nuper in Germania repetitum fuit.
- ibid. l. ult. *adde* ita omnino omnes soni, caluariae ossibus vtcunque impressi, exaudiuntur, etiam quando tympanum et reliqua auditus organa officio suo fungi desierunt.

*m**) Anqueril du PERRON Voyage. *r**) Anqueril du PERRON.

*r***) Idem. *r**) vid. p. 432.

*q***) JOHNSTON rel. *q****) Institut. des sourds et muets, à Paris 1776. 12.

pag. 479. not. e) *adde* Minime vero successit LASSO aut ARNOLDO. Sonum audiebant, litteras non distinguebant.

AVCTARIVM
AD
ALBERTI HALLERI
ELEMENTA
PHYSIOLOGIAE
CORPORIS HVMANI

EXCERPTVM

EX NOVA EDITIONE

ET ADAPTATVM VETERI

FASCICVLI QVARTI PARS PRIMA.

CEREBRV. NERY. MVSCVLI.

LIPSIAE ET FRANCOFVRTI,

c1o1occcLXXX.

ELEMENTORVM
PHYSIOLOGIAE CORPORIS HVMANI
TOMVS QVARTVS.

PRAEFATIO.

Pag. VI. l. 19. *lege* Sed in altero latere et ego reliqui, vt discrimen appareret.
p. VII. l. ult. *post* incidi *adde* ad eas fibras valuulam pariter, et maiori iure pertinere.
p. VIII. l. 1. *dele* Tantum do interim - - aut emendare studebo.
ibid. l. 7. *adde* Ostendi in libro XXIV discipulos rariter cellulosaē telae valuulam coli tribuisse, quos aequum sit, sua a praeceptore hausisse.
ibid. l. 22. eandem *lege* accuratius.

PRAEFATIO ALTERA AVCTORIS.

Primam praefationem omittere destinaueram, nunc etsi non omitto, omnia certe pressi vndique, quae in morituro sene aliquam in praeceptorem ab aeternitate susceptum similitatem prodere possent. Rebus enim pensatis, vidi, cum annotationes ALBINI supersint, sintque ad posteros sua ob merita peruenturae, non posse me defensionem meam premere, quam aequum sit, vna cum accusatione superesse, ne posteri de lite ab Ill. viro mihi mota ex sola accusatione iudicent. Eo magis vero necessariam apologiam esse persuadeor, quod me viuo et supersite, etiam docti viri, etiam minus iniqui, passim de ea lite ita scripserint, ac si de inuento aliquo anatomico lis fuisset, quod ego mihi tribuissem, ALBINVS sibi vindicasset. Nunc nihil subfuit eiusmodi causae. Membrae enim pupillaris inuentae gloriam dudum WACHENDORFIO cesseram, ALBINI merita laudaueram in detegenda vera structura valuulae coli.

In nouo opere monendum duxi, me de cerebro, eius anatome et functionibus plus adiecisse, quam in aliis solebam operibus. Cum nulla pars oeconomiae animalis obscurior sit, et numerosioribus obnoxia litibus, cum passim nos lux anatomes deferat, cum eam supplere sim conatus collectis ex morbis, exque

morbosis corporibus annotationibus, aliquanto liberalius putavi collecta exempla me reperere debere, vt de constantia veri constet. Neque enim dubium est, eum euentum, qui naturae quasi familiaris sit et inquilinus, eundem frequentius se offerre.

Bernae Heluet. d. XX. Mens. Mart. cccLXXVII.

LIBER DECIMVS.

CEREBRVM ET NERVI.

SECTIO I.

CEREBRVM PROPRIE DICTVM.

- P**ag. 1. l. vlt. *adde* Sic clar. viri VNZERVS, BODDAERT *a***), alii etiam polypis sua cerebra esse scripserunt, nullum experimentum suum allegarunt. Verum non licet rebus in physicis pro rebus euictis recipere, quae nullus sensus demonstrat. Cum in polypis nodulos, in aliis minutis animalculis fibras distinguamus, nihil videtur esse, cur cerebrum visum fugeret. Et in vniuersum videor mihi annotasse, cum oculis cerebrum coniungi, et reperiri, quando oculi adsunt, abesse, vbi desiderantur.
- p. 2. l. 8. *adde* Sed etiam lepus marinus aliquid habet medullae spinalis simile nodulis interceptum *p**), et in polypo maiori marino systema nervosum egregium Cl. KOELREVERTERS inuenit *p***).
- p. 3. l. 2. *post* lobi sunt *adde* in limace *i**).

pag.

Praef. pag. II. l. 27. ad verbum odiis adde not. 2)*. Per III. Bar. de ASCH epist. anno iam 1751 ad me datam, quam nuper excudi feci.

pag. 1. l. 13. *ad verba* polypis illis *adde* not. *a**) BONNET *Contemplation* Préf. p. 25.

*a***) *Verhandeling. der Maatschapp. te Haarlem* T. XIV.

h) lege SCHAEFFER *von krebsartigen Kiefenfuß*, p. 39.

*p**) BOHADSCH *de anim. marinis*, p. 8. 9. 10.

*p***) In sermone mecum collato. Habet PLINIVS L. XI. c. 39.

pag. 2. not. *ij*) *adde* Hic aliquid simile cerebelli in bombyce, vbi additur non satis certe adesse, *Commenc. Bonon. V. l. p. 193.* SWAMMERDAM *Bibl. p. 316.* Aequale $\frac{1}{150}$ capilli LYONNET p. 96.

*i**) SPALLANZANI *riproduzion. p. 60.*

pag. 3. l. 8. ut tamen ea sui similia sint - - - et percae alteri, *lege* In plurculis piscibus varietates prosecutus est Cl. VICQ d' AZVR g) et Petrus CAMPER r). In meis experimentis cerebrum piscibus, quam aubus, multo minus altum, planiusque, longum, modice conuexum, superne et inferne in duas columnas suis sulcis diuisum. Tubercula in vniuersum superiora quinque, olfactoria duo, cerebellum anatum. Inferiora pariter fere quinque, tubercula olfactoria et alia reniformia, et glándula pituitaria media. Plurima ceterum varietas, et in multis piscibus duo tubercula abscondita, quae ab aliis absunt a).

CAMPERVS pleraque similia habet, tantum neque tubercula recondita, neque cornua ammonis, neque glandulam pinealem. Samuel COLLINS plurimam ex multis piscibus varietatem habet, quae conferri potest, et quam hic enumerasse nimium foret b).

p. 5. l. 14. adde salamandrae p*),

ibid. l. 15. adde testudini q*) et viperæ q**).

ibid. l. penult *lege* vti i ad 1200 r),

p. 6. l. 6. adde pantherae z*),

ibid. l. 7. adde hyaenae d*), lupo nigro e*), cibetto h*), coati h**), aguti h***).

A 3

pag.

q) *Mém. des Savans étrangers* T. VI.

r) *Ibid.* T. VII. p. 181.

a) *Optisc. anat. min.* T. III.

b) *Systém.* T. I. p. 60—69.

p*) WURFBAIN p. 69. Mera fere appendix medullae spinalis, VESLING *epist. posth.* V.

q*) *Parifini.* q**) VESLING *ibid.* IV.

pag. 6. not. z) adde Pondus animalis 243. l. quarum singula vnc. 16 sine gr. 9216 aequivalet; cerebri vnciarum quinque et drachmarum trium; cerebelli drachmarum septem cum dimidia. Encephalon ergo ad totum animal vt i ad 615. BVFFON IX. p. 36.

z*) Animal = 101. l. cerebrum vnciarum 5, drachmarum trium, cerebellum 3ix, quae ratio est i ad 249. *ibid.* p. 182.

b) *dele* vncias 16.

d) *lin. vlt. lege* quae ad $\frac{1}{154}$, $\frac{1}{88}$ et $\frac{1}{70}$ redeunt.

d*) Pondus ei 60 l. cerebrum 3xx, cerebellum 3iv, ratio ad animal i ad 302. BVFFON IX. p. 286.

e*) Pondus corporis lb 43, cerebri 3xx, gr. xv, cerebelli 3iv, gr. xv, ratio vt i ad 224. BVFFON IX. p. 368.

h) adde Corpus pondere librarum 23, 3vj, cerebri drachmarum 17, granorum 48, cerebellum drachmarum quatuor, quae ratio fere est i ad 49, *ibid.* p. 249.

h*) Pondus ei vnc. 210, cerebri 3vijs, cerebelli 3ij, gr. xviii, ratio ad corpus fere i ad 170. BVFFON IX. p. 322.

h**) Pondus vnciarum 243, cerebri drachmarum vndecim, cerebelli drachm. 2 $\frac{1}{2}$; ratio fere i ad 146. BVFFON VIII. p. 348.

h***) Pondus vnciarum 61 cum dimidia, cerebellum granorum 64, cerebrum drachmarum trium, ratio fere i ad 131. BVFFON VIII. p. 386.

pag. 7. l. 8. *post* quintuplum *adde* Iterum in aliis cerebrum modo nato homini vncias quatuordecim, cum vniuersus penderet libras octo. In adulto corpus centum et sexaginta librarum, cerebrum librarum quatuor, atque adeo cerebrum ad corpus vt 1 ad 40; quadruplo et vltra adeo minus pro ratione corporis in adulto, quam in fetu.

ibid. l. 16. *adde* Sic dromedario $\frac{1}{8}$ s*), boui *buffle* $\frac{1}{16}$ s**).

ibid. l. 21. *lege* et fere $\frac{1}{8}$ aut $\frac{1}{16}$ corporis proprii

ibid. l. vlt. *adde* Triplo minus humano Cl. BOVRGELAT c*).

p. 8. l. 3. *lege* vt aequaret libras $\frac{1}{8}$ d) fui corporis

ibid. l. 5. *lege* quae ratio est $\frac{1}{22}$ f).

ibid. l. 9. *lege* ad $\frac{1}{34}$.

ibid. l. 12. *lege* $\frac{1}{27}$.

ibid. l. 17. *lege* mus vulgaris omnium maximum, quod sit sui corpusculi $\frac{1}{33}$ s); mus agrarius $\frac{1}{27}$ t), et *adde* Marmota $\frac{1}{27}$ t*), vespertilio $\frac{1}{16}$ t**), surmulot $\frac{1}{16}$ t***), talpa $\frac{1}{16}$ t****), glis $\frac{1}{16}$ t†), porcus indicus $\frac{1}{16}$ t††), cricetus $\frac{1}{16}$ t†††), vrsus et ipse omnivorus, cuius praeterea fabrica ab humana non longissime differt $\frac{1}{16}$ t††††).

pag.

i) *adde* Animal pondere 17 l. cerebrum 3ivss, cerebellum 3iss, quae ratio est 1 ad 362. BVFFON VIII. p. 317.

pag. 7. not. n) *lege* Nempe in boue $\frac{1}{36}$.

o) *adde* Non adeo exiguum Ill. CAMPER.

s*) Librarum in animali pondus 369, cerebri 3xij, 3vj, cerebelli 3iij, quae ratio est 1 ad 216. BVFFON XI. p. 260.

s**) Cui pondus l. 1150, cerebrum l. i. cerebellum 3iij, 3ij, quae ratio est 1 ad 903, ibid. p. 342.

c) *adde* Sextam tantum partem longitudinis capitis habet GARFAVLT, p. 26.

e*) *Elem. d'hippiatr.* p. 112.

pag. 8. not. n) ad vncias 136.

t*) Marmota, quae libras pendebat sex, cerebri habuit drachmas duas, grana viginti, cerebelli grana 34, BVFFON VIII. p. 234.

t**) Cuius pondus erat granorum 616, cerebrum gr. 32, cerebellum gr. 23 habuit, ibid. p. 138.

t***) Cui pondus semidrachmarum 219, cerebrum 36 gr. cerebellum gr. 12. p. 212.

t****) Cui pondus vnciarum octo, drachmarum trium, cerebrum gran. 18. cerebellum gr.

4. p. 94.

t†) Cui pondus drachmarum 23, cerebrum gr. 21, cerebellum granorum septem cum semisse, p. 172.

t††) Cui pondus unciarum 23. cerebrum gr. 52, cerebellum gr. octodecim, p. 12.

t†††) Cui pondus drachmarum 62 cum semisse, cerebrum drachmae dimidia, cerebellum granorum nouem. T. XIII. p. 131. Sed alias maior fuit, SVLZER *Naturgeschichte der Hamsters*, p. 94.

t††††) Pondus corporis librarum 141, cerebri drachmarum 57. gran. 15, cerebelli drachm. 12. gran. 36.

pag. 9. l. 6. $\frac{1}{102}$ lege $\frac{1}{78}$

p. 10. l. 2. $\frac{1}{27}$ lege $\frac{1}{17}$

ibid. l. 8. *Verbis* „Denique classis humanae cet. §. IV*. *incipit, eaque* „In simiis“ *inscripta est, et verbis* „Homini cerebrum aliquando cet. quinta orditur.

ibid. l. 11. *adde* Nunc nuper B V F F O N I V S multarum simiarum cerebra adpendit, quorum pondus totius corporis ponderis est in simia *Onifiti* pene $\frac{1}{18}$ q*); in *Coaita* fere $\frac{1}{10}$ q**); in *Saiou* ratio fere incredibilis $\frac{1}{17}$ q***); in *Sai* iterum ratio fere $\frac{1}{10}$ q****); in *Saimiri* $\frac{1}{21}$ q†); in *Mone* $\frac{1}{21}$ q††); in *Talapoin* $\frac{1}{37}$ q†††); in *Patas* $\frac{1}{21}$ r*); in *Malbrouk* fere $\frac{1}{24}$ r**); in *Papione* $\frac{1}{37}$ r***); in *Gibbon* $\frac{1}{30}$ r****); in *Macaque* $\frac{1}{24}$ r†); in *Magot* $\frac{1}{107}$ r††); in *Mangabey* $\frac{1}{21}$ r†††).

ibid. l. 13. *lege* alias fuit trium librarum t), et trium librarum, semidrachmarum nouem t*), et trium librarum atque octo vnciarum cum cet.

p. 11. l. 5. *post* equo *adde* non proportione, sed pondere ipso. Simiae quaedam

pag. 9. not. x) *adde* B V F F O N XIII. p. 335. Cum animal penderet ff xxvj, cerebrum erat 3vj, 3ij, cerebellum 3ij, 3ij, vt adeo encephali ad corpus ratio foret = 1 ad 55. Non ideo maius, quam homini.

pag. 10. not. x) *lege* Grana vndecim in granis 346.

o) *lege* Grana 21 in granis 380. Pondus cet.

q*) Cerebri pondus drachmae vnus, granorum decem, cerebelli granorum 13, animalis vniuersi 3iv, drachmarum quinque cum semisse, B V F F O N T. XV. p. 104.

q**) Pondus animalis vnc. 144, cerebrum vnc. trium, gran. 54. cerebellum drachm. 3 cum semisse, ibid. p. 30.

q***) Animalis pondus vnciarum 26, drachmarum quinque, cerebri vnc. 2 cum drachma dimidia, cerebelli drachm. 2. gran. 10. ib. p. 44.

q****) Animalis pondus drachmarum 406, cerebri drachm. 22 cum semisse, cerebelli dr. 2 cum semisse, ib. 57.

q†) Animal pondus 22 vnciar. cerebrum drachmar. septem cum granis 64, cerebellum gr. 33. ibid. p. 74.

q††) Animalis pondus libr. 5, vnc. 9 cum semisse, cerebri drachm. 15, gran. 28, cerebelli drachmae 1, gr. 62. T. XIV. p. 265.

q†††) Pondus corporis vnc. 44. cum semisse, cerebri vnc. vnus, gr. 56. cerebelli drachm. 1. gr. 11. ibid. p. 294.

r*) Corpus vnc. 136. cerebrum drachm. 23. cum semisse, cerebellum drachmarum trium, ibid. p. 217.

r**) Animal pondere vnc. 72. cerebrum drachm. 17, gran. 36, cerebellum drachm. sex, gr. 6. ibid. p. 233.

r***) Animalis pondus libr. 26, cerebri drachmar. 30. gr. 32. cerebelli drachmar. 4, gr. 32. ib. p. 144.

r****) Animal libr. 9. cerebrum drachmarum 18, gr. 48, cerebellum drachm. 4 gran. 12. ibid. p. 99.

r†) Animal vnc. 194, cerebri drachm. 14. gr. 36, cerebelli drachm. 2, gr. 12. ibid. p. 199.

r††) Animal libr. 23, cerebrum vnc. 3, cerebellum dr. 3 cum semisse, ibid. p. 119.

r†††) Animal libr. 10, cerebrum drachm. quatuordecim, cerebellum drachm. 3 cum vna tertia, ib. p. 250.

r*) *Mémoires de Berlin*, T. XX. p. 75.

dam minores, vt mures et animalia minora, videntur cerebrum habere potius ad corpus vniuersum maius. Verum et hae simiolae, et auiculae, in quibus aut aequa cet.

pag. 11. l. 8. *dele* Deinde oculos habent grandissimos.

ibid. l. 13. *adde* Ipsi demum siniae non eadem est rotunditas capitis

§. V*. *Cerebri pondus specificum.*

In vniuersum aqua ponderosius, in ea fundum petit g^*), eiusque pondus specificum a MVSSCHENBROEKIO $g^{**})$ aestimatum est ad aquam 1, 0310 ad 1, 0000. Non expectares, cum cerebri, vt dicitur, magna pars adeps sit. Singularis vero est Ill. MECKELII annotatio, cerebrum nempe cum aetate leuius fieri, vt idem cubus iunioris cerebri gr. 64 $\frac{1}{2}$, cerebelli gr. 63 $\frac{1}{2}$, adultioris vero cerebri grana non supra 4 reciperet $g^{***})$; in alio exemplo idem cubus grana sexaginta cum semisse alias 63 recepit. Idem in maniaco cerebrum leuius seperit totis septem drachmis $g^{****})$.

In epilepsia $g^{****})$, mania $g^+)$, stulticia $g^{++})$, hypochondriaco malo $g^{+++})$ frequenius durius est, non quidem semper $g^{++++})$.

p. 13. l. 15. *lege* crista

p. 14. l. 10. *post* euanescent *adde* demum etiam in sanis cadaueribus $^*)$.

ibid. l. 11. *adde* gliri $u^*)$, marmotae $u^{**})$, talpae $u^{***})$, sciuro $u^+)$, vespertilioni $u^{++})$

ibid. l. 13. *post* apparent *adde* In catopardo tantum secundum longitudinem pliocatur $d^*)$.

p. 15. l. 19. *post* referri potest *adde* eoque peculiari $p^*)$

pag.

$g^*)$ BOIVEL *bleff. de la tête*, p. 199.

$g^{**})$ *Introduit*, p. 556.

$g^{***})$ *Mémoires de l'acad. de Berlin*, T. XX. p. 67.

$g^{****})$ *Ibid.* p. 75.

$g^{*****})$ MORGAGNI *de sed. et caus. morb.* I. p. 71.

$g^+)$ PRINGLE in viro Ill. in epistola ad me data. MORGAGNI p. 55. 158. 159.

$g^{++})$ MORGAGNI II. p. 55. 401.

$g^{+++})$ SCHMIEDEL *pericard.* I. p. 22. 23.

$g^{++++})$ MORGAGNI I. p. 60.

pag. 12. not. r) *adde* vulpi BVFFON VIII. p. 235.

$s^*)$ GREDING apud LUDWIG, III. p. 4.

$u^*)$ BVFFON VII. p. 290.

$u^{**})$ *Iidem* VIII. p. 234.

$u^{***})$ *Ibid.* p. 94.

$u^+)$ *Ibid.* p. 63.

$u^{++})$ *Ibid.* p. 140.

$d^*)$ *Parisi.*

$p^*)$ ALBIN. *natur. homin.* p. 133.

pag. 15. l. 20. *adde* A dura cerebri membrana in basi cranii oriri Cl. vir *Andreas BONN* p**).

p. 16. l. 21. *lege* fila

p. 18. l. 10. *dele* matrem ex Arabicæ linguae analogia

ibid. l. 11. *post* dixerunt *adde* circa tempora *Gabrielis a ZERBIS t*)*, neque enim Arabibus ita dictam fuisse monet *SCHNEIDERVS t**)*

p. 20. l. 3. *adde* In medulla spinali hydrocephali ope in duas laminas diuisam fuisse lego p*).

ibid. l. 13. *post* strangulatis *adde* apoplecticis *), hydrophobis **), febre ardente ***), variolis ****), delirio ***** et conuulsione †), stupore ††), maniacis †††), peste laborantibus ††††), cephalaea †††††).

p. 21. l. 15. *post* videtur *adde* ipso consentiente Cl. viro *A. C. LORRY*, qui antea contrariam opinionem defendit m*).

p. 21. l. 17. *adde* Alias a gelatina effusa et concrecente alba fit et crassior m ††). Crassior in febre epidemica *FASANO*.

pag.

p**) *Membranas. continuat.* p. 24.

pag. 16. not. b) *adde* *Negar CLIANKE* cellulosa dici posse *de foramin. calu.* p. 38.

pag. 17. not. f) *lin. 1. adde* Aqua fluida *MORGAGNI de sed. et caus. morb.* p. 48. *BIRCH* IV. p. 501. In melancholico aquae libra sub dura matre *Journal de Medec.* 1763. Août. — *lin. 5. adde* Lympha inter arachnoideam tunicam et piam *MORGAGNI*, in hemiplegia I. p. 84. Lympha mucosa in epilepsia *BAADER obs.* 48. *GISEKE Abhandl.* p. 287. Viscor gummi similis in febre epidemica *FASANO*.

t*) *SCHNEIDER casarrh.* p. 16.

t**) ibid.

p*) *GILG spin. bifida.*

pag. 20. *lin. 13. ad verbum* meninx *in textu adde* not. y†). Ruber quasi sanguinis exsundans *MORGAGNI de sed. et caus. morb.* II. p. 301.

*) Vasa piaë matris varicosa *HENKEL Sammlung.* VIII. sanguine plena, *Journ. de Med.* 1764. Sept.

**) *MORGAGNI sed. et caus.* I. p. 62. 63.

***) *LIEVTAUD précis* I. p. 30.

****) *LE FRANÇOIS Reflexions critiques* p. 196. cerebri vasa sanguine plena.

*****) *BAADER obs.* 26. Membranae valde rubrae. Vasa sanguine plena. *SAVAGES Nosolog.* IV. p. 372. *Journal de Medecine*, 1763. Oct.

†) *NANNONI medic. simpl.* p. 247.

††) *Id. obs.* 25. meninges inflammatae.

†††) *CALDANI ristess.* p. 63.

††††) *SCHEVCHZER.*

†††††) Varicosa *DE HAEN rar. medend.* IV. p. 173.

m*) *Memoires des Savans étrangers*, III. p. 165.

p. 21. not. m†) *adde* *SVE* in *MONRO, HEBENSTREIT off. concrement.* *GRETING Adu.* III. p. 4. *GRETING* frequenter in maniacis, apud *LVDWIG Adu.* II. p. 3.

m††) *GRETING ibid.* In comate duræ membranae similis, *Edimburg. Essays*, III. p. 143.

pag. 22. l. 13. *post* tenuis est *adde* Annotatum est, in iuniori animali et nuper nato medullam corticis simillimam esse, vt vix distinguas s**).

ibid. l. pen. *lege* In piscibus marinis, etiam maioribus, a gelatina parum differre putes a), si recte scriptores vocibus vsi sunt *et adde* nihil enim simile in piscibus reperi, quos incidi, vt forte de circumfuso cerebrum inter et duram membranam oleo sermo sit. Ita certe in cerebro canis *Seekatze* medulla aqua tantum tegitur a*)

p. 23. l. 1. *lege* crescere dictum est *et adde* verum contraria sunt accurata experimenta MECKELII.

ibid. l. 6. *adde* phreniticis c**), epilepticis c**), deliris c***), febribus malignis c†), apoplecticis c††), post cariem femoris c†††),

ibid. l. 7. *dele* manifestiora etiam in nonnullis - - - corticem cerebri percurrunt.

p. 24. l. 5. *adde* Plurium ordinum H. BOERHAAVE p*)

p. 25. l. 4. *post* repertum *adde* et cerebrum glandulis plenum in epilepticis vidit Ant. DEIDIER b*).

ibid. l. 7. *adde* Nuper denique Cl. Vincentius MALACARNE in cerebello, exemptis portionibus piaë matris intimis, vidit innumerabilia granula globosa versus superficiem laminarum disposita, vt medullae se immergerent d*). Demum microscopiis suis acerrimis S. M. della TORRE non corticem quidem, sed medullam cerebri globulis fieri docuit d**).

p. 27. l. 11. *lege* minores.

p. 29. l. 9. *adde* et BOERHAAVIANA.

p. 30. l. 4. *post* homo est *adde* et subinde cortici similior

ibid. l. 8. *adde* in hydrophobis n*), epilepticis n**), infans n***).

pag.

s**) MASSIMI *esper.* 33. in cane.

a*) Dronheim. *Gesellschaft*, II. p. 255.

c*) BOERHAAVE *morb. nerv.* p. 133. vt rubicundior, quam in iis sit cerebris, quorum vasa minio repleta fuerunt.

c**) STOERK *annus med.* I. p. 101. Richard de HAVTESIERK I. p. 107.

c***) NANNONI *obs.* 36. BAADER *obs.* 26.

c†) RICHARD I. p. 82.

c††) Idem cum valis varicosis.

c†††) Idem I. p. 84.

p. 23. lin. 14. *ad verbum* componere in *textu* *adde* not. f*). Etiam ALBIN. *natur. homin.*

p*) *Morb. nerv.* p. 99.

b*) *Patholog.* p. 313.

d*) p. 124. d**) *Nuoue osservazioni.*

p. 30. not. k) *adde* Subnigra *epist.* ad me III. p. 408. Non consentit quidem Cl. STOLTE *submers.* neque ego experimenta propria habeo.

n*) MEAD *venen.* p. 144.

n**) RAST in *epistola* 1765.

n***) MORGAGNI I. p. 55.

pag. 30. l. 9. *adde* in febribus intermittentibus o*) et epidemicis o**), tum in aqua o***).

p. 31. l. 6. *post* calloso *adde* commissuris s*),

ibid. l. 20. *adde* Nullas autem medullae cerebri fibras esse, quae merum gelatum sit, id vtique contra sensuum testimonium scriptum est c*).

p. 32. *Verbis*: „Liceat hic, etsi parum vtilem cet. noua, eaque XIII* orditur paragraphus, quae „Analytis chemica“ inscripta est.

ibid. l. 3. *post* alibi *adde* conspicuus et *post* tela: Qui scripserunt ANDERSONII fide balaenae cerebrum merum esse oleum k*), ii abusi sunt oleo duram inter membranam et cerebrum effuso. Negatum est etiam oleum reddere, vt verus adeps, cet.

ibid. l. 13. *adde* Verum in alia non dubie accuratiori analysi III. SPIELMANNI t*) libra cerebri humani dedit spiritus alcalini drachmas duas, olei empyreumatici rubri integram vnciam cum $\frac{2}{3}$, salis volatilis gr. 40.

A spiritu salis in massam lacteam resoluitur t**), et a spiritu vrinae; cum spiritu vini et nitri mistum indurefcit t†), quod RVYSCHII arcanum fuerit. Conquassatum dicitur gratum odorem edidisse t†).

p. 33. l. 13. *post* breuius est *adde* Sed in variis cadaueribus non eadem ratione z†) retrorsum latefcit. Firmius esse vtique cerebro z†).

ibid. l. 16. *post* tangitur *adde* non tamen cohaeret c*).

ibid. l. 21. *adde* Inaequaliter cerebrum diuissse vidit Cl. INSFELD f*)

B 2

pag.

o*) COLONY p. 46.

o**) FLASCVS ad LANCIS. *Epid.* III.

o***) *Physiol. batav.* p. 369.

s*) SABBATIER *mém. prés.* VII. p. 600.

p. 31. not. u) *adde* In balaena. *Oper. min.* p. 200. 201. 203. alia tubercula p. 207. 211.

c*) KIRKLAND *two differr. the one on the brain and nernus cet.*

k*) LE CAT *sensibil.* p. 228.

t*) *Chem. Institut.* p. 179.

t**) COWARD *de ferment. volat.* p. 59.

t†) *Essays of a Society at Edimburg*, III. p. 129.

t††) MARTINI *Erschürter. des Gehirns*, p. 36.

p. 32. not. u) *adde* Pyrophorum inde HEISTERVS produxit *Wahrnehmung*.

p. 33. not. z) *adde* DUVERNEY T. I. p. 216.

z†) GREDING l. c. III. P. 4.

z††) BOURGELAT *Elem.* p. 473.

a) *adde* *Oper. min.* p. 214.

p. 33. lin. 14. *ad verbum* piscibus in *textu* *adde* not. b*). Habet III. CAMPERVS in aliis non dubie piscibus mibi nihil simile vnquam visum.

c*) GIRARDI ad SANTORIN. p. 45.

e) *adde* DUVERNEY.

f*) *Luf. natur.* p. 41.

pag. 34. l. 20. *adde* Ad huius hippocampi pedis varietates legi omnino debet, plurima qui vidit, I. E. GREDING n*).

p. 35. l. 1. *post* undulatus *adde* antierius socio propior, posterius diuergit q*).

ibid. l. 2. *adde* Eius nerui locum sulcum tenuisse MORGAGNVS vidit s**).

ibid. l. 10. *post* raro *adde* DVERNEYO et

ibid. l. 15. *adde* quod tamen accuraciones anatomici se vidisse negant c*).

p. 36. l. 1. *post* iugo *adde* tamen vt velum a pia matre productum intercedat h*),

ibid. l. 4. eius vero locum - - vas rubrum decurrit *lege* Vidi tamen in anseri ortum a commissura anteriori, et ab imo hemisphaerio cerebri, et retrorsum in ventriculum anteriorem descendere, eum tegere, et in fibras demum dissolui i*).

ibid. l. 9. *adde* Breuior est, quam septum lucidum.

p. 37. l. ult. *adde* Obliquas esse posterius, et videri ex dissoluto corpore fimbriato nasci Cl. SABBATIER g*), anteriores duas tenues et valde eminentes. Nullum esse psalterium Ill. MEKELIVS, cuius voces non satis intel igo g**).

p. 38. l. ult. *adde* nullam fuisse caueam x*) aliter interpretor, vt laminae cohaeserint, siccata aquula.

p. 39. l. 2. *post* pellucet *adde* Faciliorem sermonem meum fore persuadeor, si Cl. MECKELII et SABBATIER descriptiones integras excerptas dederō.

Ergo Ill. olim MECKELIVS posterius versus oram fornici laminam septi lucidi dextram a sinistra distare ad tertiam vnciae partem, et crura fornici posteriora subire. In media longitudine thalamorum opticorum easdem laminas se contingere. Inter laminas, qua distant, plexus choroideus medius libere ponitur, et pia meninx a corpore calloso faciei internae laminarum septi lucidi adhaeret, easque porro conuestit. Porro septi lucidi laminae per striam medullarem vniuntur ad crura vsque anteriora fornici, quibus implantantur. Sed ab ora anteriori communi corporis callosi ad finem eius corporis anteriorem eadem laminae porro

n*) *Advers.* LVDWIGII III. P. 4.

q*) DVERNEY t. 2. SABBATIER l. c. p. 594.

s*) Venarum esse vestigia, qui nerui dicuntur: BERGEN *tab. non. ventric.* ad i. i.

s**) *De sed. et caus. morb.* l. p. 55. II. p. 406.

c*) SABBATIER l. p. 594.

h*) p. 29. 30.

i*) *Oper. min.* p. 192. 196.

g*) l. c. p. 596.

g**) *Mém. de Berlin*, 1765. p. 97.

p. 38. not. s) *adde* Habet HVBERS in *progr.* 1760. et N. A. N. C. III. *obs.* 101.

n) *adde* MECKEL l. c. p. 96. GIRARDI l. c. p. 49.

x) *adde* DVERNEY t. I. Varietates vidit HVBERS.

x*) Ita vidit GIRARDI p. 49.

porro discedunt ad octauam fere pollicis partem, et pia matre obducuntur. Iterum inferius denuo vniuntur per substantiam medullarem inter corpora striata, et quando se contigerunt, utique uniuntur, ut vnica nunc sit lamina. Anterior extremitas septi lucidi clausa est, qua laminae eius parti anteriori corporis callosi adhaerent. In extremitate posteriori discedunt eadem, et dici potest, laminas septi lucidi constituere crura fornix posteriora. Septum lucidum dimidio pollicis longius est, quam fornix *y**).

SABBATIER. Septi lucidi cauitas triangularis est, fatis similis falciformi sinui, membrana subtili vestita, anterius latior, posterius in caudam terminata. Non aperitur in cerebri ventrem tertium, sed extra cerebrum, tamen ut lamina medullari tenera et pia matre claudatur. Nunquam defuit haec cauea *y***).

pag. 40. l. 6. *adde* Veram caueam esse, putabat III. MORGAGNVS, defendi posse exemplo medullae spinalis, in qua medullam inter et caueam vertebralem vera sit intercapedo *k**). Graue certe argumentum est, et omnino in cadauere ea intercapedo inanis videtur, ut certe ab adipe non recte repleatur. Verum etiam si in medulla spinali agnoscere teneamur veram caueam, non inde argumentum in ventriculos cerebri transferri posset, in quibus contactus lacunaris superioris in inferioris colliculos manifestus est.

p. 41. l. 13. *post* curuus *adde* Ad vnguis modum, eundemque lamina medullari tegi vidit GREDING *z**).

ibid. l. penult. *adde* In his caueae posterioris colliculis, eorumque varietate audiendus est Cl. I. E. GREDING *b**). Paruum describit, triangularem, circa flexionem cornu hippocampi medullae innatum. Demum tertium peculiarem colliculum *b***).

p. 42. l. 4. *post* apertus est *adde* In parte tota posteriori GÜNZIVS sulcos transversos vidit *h**).

ibid. l. 9. *post* continent *adde* Sic in piscibus, iisque, quos incidi, omnibus *i**).

B 3

pag.

*y**) *Mém. de Berlin*, 1765.

*y***) l. c. p. 595. SANTORIN. *obs. posthum.* p. 49.

pag. 39. not. g) *adde* Oper. min. III. p. 216.

pag. 40. not. k) *adde* Recte etiam SABBATIER l. p. 164.

*k**) *De secl. et caus. morb.* l. p. 33.

l) *adde* Oper. min. III. p. 192.

*z**) Apud LVDWIG *Aduers.* III. P. 4.

*b**) Apud LVDWIG *Aduers.* l. c.

*b***) Ibid.

*h**) Ibid. p. X.

*i**) Oper. min. III. p. 216. BARTHOLIN. *Centr. II. obs. I.* in orbe pisce.

pag. 42. not. p) *adde* Tum MARTINI *Sreischrift*, p. 40. 41. MECKEL *Mém.* 1765. p. 48.

pag. 42. l. pen. Haec tamen quaestio - - - disquisitione indiget *lege* Anterius separantur per septum lucidum et fornicis principium, posterius per fornicem incumbentem medullae oblongatae q*).

Alii tamen communicare asserunt, certe quia cum tertio ventriculo communicant q**). Verum neque ea communicatio perpetua est, et si status transitum non inueniret, putares utique nullam adesse.

p. 43. l. 9. *adde* (qualis etiam undique de cerebro exhalat, dum dissecatur u*).

p. 44. l. 7. *post* epidemicis *adde* variolosis h*), affectibus catarrhalibus h**),
ibid. l. 11. *adde* Librae quatuor, vnciae undecim in sacco a cerebro facto q*).

Caput ob aquam in ventriculis collectam adulti capiti aequale q**).

p. 45. l. 8. *post* membranae *adde* In speciem albuminis quidem non coactam fuisse, sedimentum tamen puriforme posuisse, ut lymphae solet a**),

ibid. l. 11. *adde* Video Ill. virum, et quem merito plurimi facio, coagulabilem esse negare, eandemque vicio aliquo in pectore nonnunquam coagulabilem reddi. Verum idem vir clar. contra numerosa utique experimenta etiam pericardii, et pectoris, et abdominis aquulam negat coagulari a††).

p. 46. l. 13. *adde* etsi demum coniungantur.

p. 47. l. 5. *post* sede *adde* sub fornice ultra thalamos opticos

ibid. l. 9. *adde* Tertium ventriculum claudunt, ut nulla eius rima pateat d*)

p. 48. l. 2. *post* extat *adde* Sic in asthma*), hemiplegia**), et apoplexia***).
Varices

q) *adde* PORTAL *Mém.* 1770. p. 241.

q*) ALBIN. *nat. hom.* p. 130.

q**) LIEUTAUD *essays* p. 338.

u*) *Physiol. batav.* p. 369.

pag. 44. not. c) *adde* HENKEL *Samml.* VIII. Post hemiplegiam vnciae duae in ventriculo dextro, MORGAGNI l. p. 38.

d) *adde* Demiseptier in lethargico DUPERNEY *posthum.* II. p. 539.

f*) *adde* Epilepticos HAADER *obs.* 48.

h*) COTVNNVS *Sed. variolar.* p. 304.

h**) LIEUTAUD *Synops.* I. p. 51.

q*) BERTIN *osteolog.* II. p. 498.

q**) *Art. Helvetic.* V. p. 186.

p. 45. not. x) *adde* ab acore cogitur VIEVSSENS *Malad. intern.*

a**) GREDDING l. c.

a††) HEWSON *inquiries* II. p. 193. COTVNNVS *de ischiad. nervosa.*

pag. 47. not. z) *adde* MECKEL *Mémoire.* de 1765. p. 99.

d*) MORGAGNI *de sed. et caus. morb.* II. p. 405.

e) *adde* Venam magnam et magnam arteriam DUPERNEY *posth.* T. III. f. 2. 3. 4.

*) RIDLEY *obs.* p. 180.

**) Corpus hydaticum phaseoli mole MORGAGNI *sed. caus.* I. p. 83. Vesiculae plexus sinistri rigidae. Idem ibid. p. 84.

***) STOERK *de stramon.* p. 14.

Varices post delirium ****). In comate vasa dura obstrueta ****). Est vbi aliis in sedibus cerebri glandulae visae sunt, vt super corpora striata posteriora †). Duo corpora glandulosa singularia mucronibus coronata sub lucido septo in equo ††).

pag. 48. l. 6. *adde* Cl. DUVVERNEY lobosum aliquid, spongiosum et celulosum. Sic in comate rigido dura, compactae albae pilae o*), demum offesa particula o**).

p. 49. l. vlt. *adde* Nullas fuisse MORGAGNVS grauis testis est g*).

p. 50. l. 13. *adde* Sed neque in piscibus corpora striata reperio.

ibid. l. antepen. *adde* Second cordon SABBATIER q*).

p. 51. l. 5. *post* inferius *adde* Demum a tuberculis mammillaribus, et quidem totum deriuat, et funiculum SABBATIER t*), quae descriptio a meis aduersariis haecenus recedit.

ibid. l. 9. *adde* Longius et in interiorum eminentiarum sedem hippocampi deducit Cl. SABBATIER y*), difficili, vt fatetur, inquisitione vsus, vt nuper demum rem totam viderit, et omnino prius centrum geminum pro pedunculo glandulae pinealis habuisse videtur y**). Idem fibrosus esse, minui et exiguum fieri, qua ventriculus lateralis descendit.

ibid. l. vlt. *adde* Coniungi negat, et interponi laminam cineream Cl. SABBATIER f*).

p. 52. l. 14. *lege* deprimit.

pag.

****) MORGAGNI l. c. p. 49.

****) *Ess. of a societ. at Edimb.* III. n. 23.

†) *Dict. d'Anatom.* II.

††) BOVRGELAT *Elemens d'hippiatrique*, p. 474.

o*) PANAROL. II. n. 9.

o**) SVE *ost.* p. 21.

pag. 49. not. g) *adde* Habet etiam SANTORINVS *posth.* t. 3. f. 3. non satis ouatas strias.

g*) *De sed. et caus. morb.* II. p. 281.

q*) *Mém. de Savans étrangers* VII. p. 601. seqq.

r*) l. c. p. 602.

y*) *Anat.* I. p. 503.

y**) l. c.

pag. 51. not. f) *adde* Raro vidisse GREDINGIVM miror, vt tamen fateatur, ponte tenui medullari superne intratos fuisse, et perinde, qui negare videbatur, SABBATIER *Mém.* VII.

p. 578. SANTOR. T. 3. f. 2. p. 39.

f*) *Anat.* I. p. 467. *Mém. des Sav. étrang.* T. VII. p. 498.

pag. 52. not. m) *adde* Non perpetuum esse, Cl. GREDING *Adu.* II. P. II.

n) *adde* GREDING l. c.

q) *adde* GIRARDI l. 3. f. 2.

r) *adde* Habet fere eodem, quo ego, modo SABBATIER *Mém.* VII. p. 601. *Anat.*

p. 497.

- pag. 53. l. 3. *adde* Cl. SABBATIER ad vsque corpora mammillaria deduxit t*),
 SANTORINVS ad thilamos t**).
- ibid. l. 9. *adde* Infertum in glandulam pinealem funiculum, inque eam solam habet Cl. GREDING y*). MECKELIYS perpetuam facit infertionem y**).
- ibid. l. 12. *adde* Tenera membrana tegi DVVERNEYVS coniecit.
- p. 55. l. 4. *post* VIEVSSENS *adde* Eo Cl. SABBATIER et centrum geminum retulit u*), et funiculum, qui peculiarem commissuram posteriorem facit.
- ibid. l. 6. *post* habent *adde* vt anas ferus y*).
- p. 56. l. 7. *adde* Non raro etiam in isto ventriculo humor apparet h*). Et aues eum ventriculum habent h**), et pisces h*).
- ibid. l. 9. *post* valens *adde* fibrosus h††)
- ibid. l. 15. *adde* Et defuisse visa est l†), et duplex l††). Aliam anteriorem vidit Cl. GREDING in fine anteriori tertii ventriculi l†††).
- p. 57. l. 11. *lege* Suspicio adeo hos veterum a ventriculis lateralibus in tertium apertos cet.
- ibid. l. 19. *lege* ostium x) ad basin cranii ducere videtur ante cet.
- p. 58. l. 12. *adde* Negat in aqua descendere ALBINVS n*). Solidum facit Cl. SABBATIER n**).

Ab

- t*) *Anat.* p. 503.
- t**) t. 3. f. 2. p. 115.
- pag. 53. not. u) *adde* Habet Cl. SABBATIER l. c.
- y*) l. c.
- y**) *Mém. de 1765.* p. 97.
- c) *adde* BARTHOLIN. *Cent. II. hist. I. COLLINS t. 53. f. 2. Oper. min. III. p. 216.*
- p. 54. not. m) *adde* Habet etiam MALACARNE.
- q) *adde* SANTORIN. *posthum. III. p. I.*
- r) *adde* GREDING.
- u*) *Anat.* p. 503. *Mém. des Savans étrang.* p. 601.
- y*) *Oper. min. III. p. 190.*
- p. 56. not. e) *adde* Saepe communicare GREDING.
- h*) GREDING. GIRARDVS glacie plenum vidit ad t. 3. SANTORIN.
- h**) *Oper. min. p. 192. etc.*
- h†) Ibid.
- h*) *adde* Habet GIRARDVS t. 3. f. 2.
- h††) SABBATIER *Mém. de sav. étrang. VII. p. 7. Anat. I. p. 49.*
- l†) GREDING l. c. Sed raro.
- l††) Idem.
- l†††) *Advers. II. p. 3.*
- pag. 56. lin. 16. *ad verbum* habent in *textu* *adde* not. l**) *Oper. min. III. p. 192.*
- l*) *adde* Vulvam et anum ALBIN. *nat. hom. p. 130.*
- pag. 58. not. m) *adde* Idem GIRARDVS ad T. 3. f. 2. SANTORIN. Subire videbatur, fed vix ingressa sine obstulo desinebat.
- n*) *Nat. hom. p. 130.*
- n**) *Mém. des sav. étrang. p. 598. 599.*

Ab infundibulo in pituitariam glandulam canalem GIRARDVS dicit, non tamen perpetuum *n***)*.

pag. 59. l. 3. *adde* Amplum calcarea materia plenum III. HAENIVS vidit *r*)*, cellulosa plenum LVDWIGIVS *r**)*.

Alias et in iunioribus hominibus liberum vidit Cl. GREDING, alias neque medulla plenum, neque cellulosa tela, sed totum liberum, et telam illi, si qua visa est, vitio putat natam esse *r***)*. Ita et III. LIEVTAUD inferne solidum dixit, et vocavit *tige pituitaire*.

Denique Cl. Professor Vpsaliensis *Adolph. MURRAY* nuper summo studio in hanc infundibuli caueam inquisit; reperit pia membrana fieri et arachnoidea et interposita cellulositate; descendendo fieri graciliorem, inde iterum latefcere. Caum porro esse, et glacie manifesto repleri, celluloso textu carens. Diuidi demum in duos ramos, quorum quilibet suum glandulae pituitariae lobum adeat *r†)*. Cum isto adeo viro, qui peculiari labore in hanc inquisitionem incubuerit, putauerim nos stare debere, vt infundibulum nomen suum mereatur, caumque sit. Caum etiam facit Cl. SABBATIER *r††)*.

ibid. l. 14. *post* quidem *adde* neque de lymphatico genere *x*)*.

ibid. l. 15. *post* appendix *adde* Mollior reliquo cortice *y*)*, tamen vt etiam dura et fere cartilaginea visa sit *y**)*.

p. 60. l. 17. *adde* Olim a *Car. STEPHANO* dicta est *s*)*.

p. 61. l. 11. *adde* Denique putat Cl. *MURRAY*, vidisse se ductus a glandula pituitaria in receptaculum apertos, nisi forte venulae fuerunt. Sed plenius Cl. GIRARDVS canaliculum sub pia matre ab appendice huius glandulae ad infundibulum ascendere vidit, neque tamen perpetuum *m*)*.

Veteres

*n***)* P. 36.

r)* *Rat. medend.* VI. p. 271.

*r**)* *Physiol.* n. 198.

*r***)* l. c.

r†) *Disp. de infundibul. cerebri.*

r††) *Anat.* l. p. 464.

p. 59. lin. 11. *ad verbum* distans in textu *adde* not. *u*)* LITRE.

x)* HEWSON *inquir.* II. p. 57.

y)* GREDING *aduers.* II. P. III.

*y**)* *Ibid.*

p. 60. lin. 17. *ad verbum* piscibus in textu *adde* not. *r*)* *Oper. min.* T. III. p. 215. et in fouea caluariae pariter CAMPER *Mém. des sav. étrang.* VI. p. 184. cet.

s)* p. 252.

pag. 60. not. 2) *adde* Nuper ita sensit III. de SAUVAGES, *Nosolog.* V. p. 18.

2) *adde* Per vascula cauernosa SAUVAGES, vt cerebrum subleuet.

m)* Ad SANTORIN. *posthum.* p. 36.

Veteres etiam hydrocephali exemplum prodixerunt, cum glandula pituitaria scirrhusa esset *m***), et aliud Ill. olim LUDWIGII extat. Epilepticus erat, in cuius cerebri ventriculis post mortem plurima aqua reperta est. Is, dum vivebat, leuabatur capite prono dato, ut aqua in infundibulum facilius descenderet. Quare et infundibulum ei aqua plenum fuit *m***).

pag. 62. l. 22. *adde* Animum tamen addit hypothesin proposituro, quod omnino in piscibus fere omnibus filamenta cerebri parti alienae et frequenter ad neruum olfactorium ramum dedisse viderim *c*)*. Quare hanc disquisitionem peritis viris, et sua ad incisiones opportunitate gaudentibus commendo. Constantia enim me mouet, qua filamenta neruorum similia in omnibus piscibus educit. In febre maligna nuci aequalem ORTESCHIVS vidit *c***). Secretioni potius aptam videri BOVRGELAT *c†*).

p. 63. l. 6. *post* transuersa *adde* quadrigemina.

p. 64. l. 3. *adde* extrorsum in gracilem caudam producit.

ibid. l. 10. *dele* nihil vero - - sanguinis habent.

ibid. l. 13. *adde* In fele Samuel COLLINS tertium par tuberculorum habet, exterius positum, quam testis *b†*).

ibid. l. 15. *adde* Sic in piscibus frigidis *b††*).

ibid. l. pen. *post* particula *adde* veteribus tamen et GALENO non ignota

pag.

*m***) *Hist. de la Societé Royale de Montpellier*, p. 110.

*m****) *Epist. ad me* T. III.

pag. 61. not. q) *adde* Castaneae mole BOVRGELAT.

c)* In cyprino, corticis tamen videntur pediculi, *Oper. min.* p. 204. in alio cyprino p. 207. In lucio pisce filamenta dat ad tubercula minora, ex quibus altera est origo nerui olfactorii, aliud filamentum ad commissuram inferiorem p. 208. Ad tubercula olfactoria in trocta p. 210. Sic in *Ombre chevalier* p. 212. Alii pedunculi in perca supra commissuram transuersam cerebro affixi pag. 213.

*c***) In *Diario* l. p. 414.

c†) *Elem.* p. 479.

pag. 63. not. f) *adde* SANTORIN. *posth.* T. III. f. 2.

m) *adde* Potius minores SANTORINVS.

pag. 64. not. u) *adde* In elephanto CAMPER.

b†) *System.* t. 53.

pag. 64. not. b*) *adde* *Oper. min.* III. p. 193.

b††) *Oper. min.* III. p. 216. cet.

c)* *adde* Annumerat glandulis, quae in vasorum diuisionibus penunt, GALENVS.

pag. 65. not. i) *adde* Vide icon. *meat. Fascic.* VI. t. 2.

ibid. l. 5. ad verbum imponitur in *textu* lin. 5. *adde* not. i*) SANTORIN. *posthum.* T. III. f. 2.

m) lin. 8. *adde* MORGAGNI *de sed. et caus. morb.* l. p. 118. 296. Duriscula Id. p. 184.

Offea circa pinealem glandulam GALENVS *administr.* IV. c. 1. — lin. pen. *adde* Frequenter MECKEL *Mém.* de 1765. p. 94. NIEMANN ad COHEN *de calc.* p. 3. GREYING l. c. in D. LEGGE, cui debilis erat ventriculus, Ill. l. PRINGLE in litteris — lin. vlt. *adde* Post febrem intermittentem COLONIS p. 56. In sano milite SCHMUCKER *Wahrnehmung.* p. 109.

pag. 66. l. 4. *lege* Reperiri eiusmodi glandulam in plusculis *q*) quadrupedibus lego, non tamen in omnibus, tum in nonnullis auiibus *q**), in frigidis piscibus aliis reperi *q***), in aliis nullam *q****). In homine cet.
ibid. l. 8. *dele* non valde facile conseruantur, et
p. 67. l. 10. *adde* et pisces *f***).
p. 68. l. 2. *adde* tum pisces.

SECTIO II.

CEREBELLVM.

Pag. 68. l. 3. *lege* vt etiam in piscibus similis eodem loco particula reperiatur *r*);
ibid. l. penult. *post* recipiat *adde* Cl. MALACARNE in quadraginta cerebellis tredecies reperit nihil differre, in viginti et tribus cerebellum mollius esse, decem demum, vbi durius, et tria potissimum duriora, quorum vnum pene cartilagineum esset *z**).

p. 69. l. 9. *adde* Piscibus perexiguum.

p. 70. l. 2. *post* diuiditur *adde* Dictum est, in animali nuper nato corticeam naturam cerebelli a medullari vix distingui *p**). Verum sollicite inquirens Cl. MALACARNE *p****) vtique etiam ea aetate vtramque naturam distinctissimam reperit.

p. 71. l. vlt. *adde* qui floccus est *Vincentii* MALACARNE.

p. 72. l. 6. *adde* Nuper *Vincentius* MALACARNE *r**) fusissime descripsit lobos,
C 2 lobulos,

pag. 66. not. *q*) *lin.* 2. *adde* CAMPER.

*q**) In struthiocamelo *Parisini*, in aquila *BORRICH. hermet. aegypt. sapient.* p. 266. *HARDER apiar.* p. 63. Nulla in anser, anate, tringa *Oper. min.* P. II. p. 197.

*q***) Carpio, capito, tinca. *Oper. min.* p. 215.

*q****). Coregono, lucio, trosta. *Oper. min.* l. c. In asello nulla CAMPER.

pag. 67. *b*) *adde* SANTORIN. *posth.* I.

ibid. l. 10. *ad verbum* aues *adde* not. *f**) *Oper. min.* III. p. 192.

*f***) ibid.

pag. 68. not. *r*) *adde* In nostris *Oper. min.* III. p. 215.

g) *adde* Plerumque mollius *GRETING. aduers.* III. P. II.

*z**) MALACARNE p. 118. 119.

pag. 69. not. *k*) *lege* Cerebrum gr. 2 4. cerebellum gr. 8. cet.

m) *adde* Conf. multas mensuras p. 6. et *Auctar. Fasc.* IV. p. 5. seqq.

*p**) MASSIMI.

*p***) P. 121.

p. 70. not. *r*) *adde* Decem Cl. CARNAVALE; tredecim DUVERNOI.

pag. 71. not. *n*) *adde* Vuula Cl. MALACARNE.

*r**) *De cerebello.*

lobulos, laminas parallelas, foliola. Lobos dixit, superiorem anteriorem, superiorem posteriorem, inferiorem posteriorem, subtilem, liuentem, centralem. Eos lobos et loborum ipsas laminas numerat.

Distinguit porro *pyramidem laminosam*, quae inuerso cerebello, eleuata medulla oblongata demum apparet. Inuolutarum laminarum est fasciculus.

Tunc *tonfillas* et ipsas laminis compositas, vnam vtrinque assidentem vuulae, et *vuulam* longam, conicamque, quae vulgo vermis audit inferior, et valuulas femilunares duas quarti ventriculi TARINO dictas; et ex eorum limbo eductum pediculum sustinentem *floccos laminosos* inter plicas piaë membranae, et granula plexus chorioidei positos, crispas, liberos, in cauum cranium pullulantes, suos habentes nucleos. Demum *nucleos medullares* tectos substantia corticali pene vndique numero decem, quorum princeps fit vermis GALENI.

pag. 72. l. 12. *adde* Laminas in eo medullares in duas diuisas Cl. GREDING vidit.

p. 73. l. 12. *adde* Cl. MALACARNE pene eodem modo describit 1. fibras transuersas esse; 2. duae fasciae medullares latera tenent sulci medullae oblongatae; 3. planum cineritium subfuscum; 4. fibrae longae albae sequentes ductum fibrarum pontis; 5. fibrae transuersae et distinctae a fibris medullaribus longitudinem sequentibus *y***).

ibid. l. ult. *adde* In piscibus pons mammillaris adest non simillimus humani *n***).

p. 75. l. 8. *adde* Medullaris cum sit, ob tenuitatem saepe pellucet, alias fibris medullaribus conspicuis percurritur. Aliam, sed obscuram, valuulae descriptionem SANTORINVS dat *k***).

pag.

pag. 72. lin. 9. *ad verbum* serratas in *textu* *adde* not. *s***) Aut certe flexus GREDING, et puncta, et verae stellulae, nonnunquam *Aduersf.* III. P. IV.

ibid. not. *z*) *adde* Mauult brachia dicere Cl. MALACARNE.

p. 73. lin. 10. *ad verbum* corticea in *textu* *adde* not. *g***). Habet etiam GIRARDVS ad SANTORINVM T. II.

*g***) De cerebello, p. 76. 77. 78.

h) *adde* SANTORIN. t. 3. f. I. DUVERNEY T. III. f. 5.

i) *adde* Habet etiam CARNAVALLE.

*n***) *Oper. min.* III. p. 202.

pag. 74. not. *p*) *adde* SABBATIER *Mémoir. des savans étrangers*, VII. p. 603. 604.

ibid. not. *c*) *adde* et intus membrana pulposa inuestiente quartum ventriculū, et extus epithelio p. 108.

pag. 75. not. *g*) *adde* Nomen valuulae reicit Cl. MALACARNE.

*k***) p. 72.

pag. 75. lin. 16. *ad verba* quarti paris in *textu* *adde* not. *l***) Negat eas se vidisse Cl. MALACARNE.

m) *adde* MALACARNE p. 115. 116.

pag. 76. l. 6. *adde* Easdem valvulas Cl. MALACARNE fufe describit, vt tamen ob noua nomina rerum difficilius intelligatur. Oriri ex absconfa maxime parte petioli floccorum a limbo interno trium planorum priorum, duo facere satis ampla robusta vela, quae eant ad *tuberculum* suum laminosum; referre hirundinum nidos, adhaerere ad tonsillas, ad particulas vermi accumulantes, et ad vuulae basin (vermis inferioris); et dextram valvulam cum sinistra coniungi. Earum cauum sursum respicere partem superiorem quarti ventriculi p†).

p. 78. l. 7. *adde* Duas, tres videri, sed facile in plures diuidi GIRARDVS, et a parte tum superiori, tum inferiori aduenire, quibus vocibus videtur eas intelligere, quas proxime dixi s*).

ibid. l. 9. *adde* Hanc viderit SANTORINVS etiam ad proximum cerebelli peduncululum iuisse.

ibid. l. 16. *adde* Cl. MALACARNE duas ex partibus sulco oppositis taenias accedentes ad portionem duram describit, alias vero ad mollem, iterum alias cinguli modo se addere ad par vagum y*).

ibid. l. antep. *adde* inque plicibus a*),

S E C T I O III.

M E D V L L A S P I N A L I S.

Pag. 79. l. 11. *post* medullares *adde* cinereis aliquando striis mistae f*),

ibid. l. 13. *adde* Ad latera quasi curuatis caudis in medullam oblongatam exaequantur h*). Ab ea cauda subinde neruum octauum paris radicem habere SANTORINVS, GIRARDVS h**).

C 3

pag.

p†) p. 61. ad 68.

pag. 76. not. s) *adde* Puto a Cl. CARNAVALLE tangi p. 38. Non satis certus.

y) *adde* Posteriores vocat GALENVS *Administras*. IX.

pag. 77. not. e) *adde* Ad tertiam, quartamque vertebram CARNAVALLE.

ibid. *ad verbum* ventriculo *in textu* lin. pen. *adde* Eam partem Cl. MALACARNE dixit *floccos laminosos* p. 65.

s*) GIRARDI p. 42.

pag. 78. not. u) *adde* SANTORIN. l. 2. GIRARDI.

y*) l. c. p. 112. 113.

a*) *Oper. min.* III. p. 208. etc.

f*) GIRARDI ad t. 3. f. I. et t. 2.

h*) SANTORIN. T. II.

h**) Ibid.

p. 80. *ad verbum* transuersae *in textu* lin. 9. *adde* not. o*) Etiam GIRARDVS ad T. II.

pag. 80. l. 10. *post* quidem *adde* etiam obliquae o**)

ibid. l. 11. *adde* Cl. MALACARNE paulo aliter loquitur, ut eadem tamen viderit. Numerat corpora pyramidalia, a quibus pars prodeat nerui duri.

Corpora olivaria a figura dicta, quae facile ex suis nidis possunt erui, et quorum pars interior flaua sit.

Et demum *fascias medullares* filis factas parallelis ex cruribus cerebri natas, aliquando in vertebrae vsque prodeunt *q**).

ibid. l. ult. *adde* in ipso animali imperfectiori marino lepore *t**), in limace *t***), p. 81. l. 5. *adde* et crocodilo *y**). In omnibus animalibus reperitur, quibus nerui sunt, atque vicissim ab iis abest, quae nervis destituuntur. Non ideo dixerim primam eam esse corporis animalis partem, ex qua reliquae sensim prodeant *y***). Certum est enim, in embryone gracillimi neruuli similem esse grandi cum cerebro.

p. 82. l. 4. *adde* qua nerui lumbales nascuntur.

ibid. l. 6. *adde* Raro exemplo SWAGERMANN in longam planiusculam quasi linguam abiisse vidit *m**).

p. 83. l. pen. *adde* Qua a ventriculo quarto descendit, SANTORINO visa est longis fibris exteriori neque vidit, etsi obliquae erant, si ex calida in frigidam demergatur SWAMMERDAMIVS *d***). In cruribus oleum continet *d****).

pag.

o**) GIRARDI T. II. SANTOR.

pag. 80. not. p) *adde* neque GIRARDVS, transcurrentes a dextris in sinistras vidit MALACARNE, decussari neque ipse vidit, etsi obliquae erant, p. 97.

ibid. not. q) *adde* DUVERGE des contrecoups, p. 105. 106. La FOSSE Mémoire. de l'Acad. 1767.

q*) p. 86. 87. 88.

r) *adde* Comment. Bonon. V. p. 1.

s) lin. 1. *adde* Comm. Bonon. V. P. II. lin. pen. *adde* in alia musca Carol. de GEER V. II.

P. II. p. 930.

t) *adde* In vermibus longis BONNET contempl. II. p. 31. In nereide PALLAS misc.

p. 130. 131.

z*) BOHADSCH anim. marin.

z**) SPALANZAN. riparar. p. 60.

y*) VESLING Ep. V.

y**) MASSIMI obs. p. 21.

m*) Watergezw. p. 104.

pag. 82. not. r) lin. 1. *adde* quas vniuersas figuras SWAMMERDAMIVS propria manu delineavit Bibl. nat. ad t. 28. f. 3. Tump PETIT cet.

d*) T. H. f. 2.

d**) L. 23. f. 3.

d***) LYONNET p. 101.

pag. 84. l. 3. *adde* Mirifica vero vis motrix est in medullae spinalis boinbycis ea parte, quae abdomine continetur; serpentino nempe perpetuo motu agitur; in chrysalide paulo obscurius, in papillione euidenti, ut idem motus inhibeatur, nervis incisis *). Is motus per ipsam cutem pellucet.

p. 85. l. 4. *post* circumdet *adde* In imo sine infundibuli medullae spinalis in superficiem durae membranae interiorem continuatur s*).

p. 87. l. pen. *post* TREWIVS *adde* Nulla enim pars canalis medullam sentientem continentis est, in qua nonnunquam non eiusmodi herniae durae membranae apparuerint, quoties ossa natura eam non coërcuit. De occipite frequenter eiusmodi tumor prodit *). In fronte rarius **). In collo, hic rarius ***); in dorso rarius ****); in dorso et lumbis *****); in lumbis †) frequentissimus est; puto in parte ima ob pondus eo descendens aquae, et in sacro osse ††); demum in collo, pectore, lumbis continuus †††); in occipite, lumbis, dorso imo, osse sacro ††††) cum hydrocephalo.

SECTIO

pag. 84. not. i) *adde* Comment. Bonon. V. P. I. Nullam esse in nereide PALLAS.

i*) BIBIENA Comm. Bonon. T. V. P. I. et Abregé de l'histoire des insectes T. V. p. 310.

s*) BONN de continuat. membranae. p. 47.

pag. 86. not. k*) *adde* SWAGERMANN p. 181. 182. qui tamen sub quarta demum lumborum vertebra medullam spinalem in nervos discedere scripsit.

pag. 87. not. r) lege Nerui per tumorem dispersi Gal. di Min. VII. p. 154. SWAGERMANN p. 98. E. N. C. II. p. 158.

ibid. not. n) *adde* DOEVEREN, SWAGERMANN p. 91. LIEVTAJD. Sed conf. inprimis SWAGERMANN p. 168.

ibid. not. y) *adde* Canalis cum ventriculis cerebri communicans; in columnam vertebralem in spina bifida PORTAL Mém. de l'Acad. 1770. §. p. 259. SWAGERMANN p. 237. HENKEL neue Samml. Denuo cum aqua in cerebrum effusa.

*) HOCHSTETTER cas. III. Dec. VII. Nou. Acad. Natur. Cur. Vol. III. obs. 44. Hic tamen absque lactura cerebri CAMPER apud SWAGERMANN Watergeze. p. 84. ut per annum superviuisset. Totum pene cerebrum in sacco de occipite pendulo SIEBOLD obs. FAC. CONI de monstris.

**) HERWIG obs. 7. destructum cerebrum.

***) SWAGERMANN p. 78. 79. magis funestum in cranio, ex medulla oblongata; et aliud exemplum N. Letter-Oeffening. T. I. RVERHOFT.

****) Id. I. p. 78. In supremo dorso HORNES ib. p. 82. 83. Iterum SWAGERMANN p. 248. 249. Confimilis; in toto torso destructae vertebrae et prima lumborum ibid. p. 241. Gal. di Minerv. VII. p. 154.

*****) SWAGERMANN p. 237.

†) C. BAVHIN hermophrod. p. 130. van DOEVEREN obs. ap. HILDAN. SWAGERMANN p. 98. 206.

††) SWAGERMANN p. 91. LIEVTAJD Sepulchr. II. p. 341.

†††) SWAGERMANN p. 123. HORN mem. de Dion. II. capitis et totius columnae vertebrae.

††††) E. N. C. II. Ann. II. obs. 158.

S E C T I O IV.

D V R A M E M B R A N A.

- Pag. 89. l. 1. *post* numerosa *adde* inter neruos caudae equinae
 ibid. l. 15. *adde* qui euanescat effractis vertebris.
 p. 60. l. 15. *lege* qui a secundo ramo quinti paris cet.
 ibid. l. vlt. *post* finditur *adde* Et icon optimi LAGHI manifestis vitiis laborat *h**).
 p. 92. l. 4. *post* periosteum *adde* Haec et de reliquis quadrupedibus vera sunt, et manifestissime in piscibus, in qua animalium classe, quae dura mater dicitur, nihil cum cerebro commune habet, a quo multo intervallo distat, quod cellulosa tenera, oleoque plena repletur. In iis enim animalibus manifestissimum est, solam piam membranam cerebri esse velamentum, duram ad cranium pertinere, cui innota adhaeret *u**).
 ibid. l. 5. *post* sequitur *adde* Cellulosa fila ex ea membrana efflorescentia cranio se immittunt *u***).
 p. 93. l. 18. *adde* Meningis ceterum vocabulum HIPPOCRATI et DIOCLI membranarum omnibus commune erat, MARINO teste; a superioribus ad cerebri inuolucra restrictum *o**).
 p. 95. l. vlt. *adde* Demum cum experimenti causa aquam in vivo cane cranium inter

pag. 89. not. m) *adde* LUDWIG in *epist.* ad me III. p. 495.

pag. 90. not. d) *adde* AVRRAN de loquela absque lingua.

ibid. ad verbum receptaculi in *textu* lin. antep. *adde* not. g**) LOBSTEIN de neru. dur. marr. p. 17. 19. lateralem potissimum extimum HIRSCH de neru. quint. par. p. 32.

ibid. not. h) Sed neque ipse MORGAGNVS vidit *lege* Cl. WRISBERG quidem industria inquisiuit Götting. Anzeig. 1776. p. 465. MEZGER Neru. I. par. HIRSCH de neru. quinti paris. *h**)

LOBSTEIN l. c. p. 21.

pag. 91. not. l) *adde* Nullos esse LOBSTEIN p. 29.

m) *adde* Hi fuerint neruuli, quos duram matrem in fine cerebelli, atque in principio medullae oblongatae accipere scribit Cl. MASSIMI *esp.* 32.

q) *adde* Nullum PLENK *anat.* Nullos aut obicurißimos SABBATIER l. p. 453.

p. 92. not. r) *adde* BONN l. c. p. 404. POTT *injuries of the head*, p. 26.

u*) LORRY *mém. des savans étr.* III. p. 287. IANKE de *for. calu.* p. 31. et olim GALEN. de *vf. part.* VIII. c. 19.

u**) SIEWAGERMANN.

d) *adde* GALEN. de *vrilr. part.* L. XVI. c. 12.

g) *adde* WEFFER de *apoplex.* p. 303.

o*) GALEN. de *administr. anatom.* IX. c. 2.

pag. 95. not. h) lin. pen. *adde* SCHVSTER *Journ.* II. p. 96. LORRY *mém. prés.* III. p. 279. MORGAGNI de *sed. et caus. morb.* II. p. 83. RAST in *epist.* 1765. BAADER *obs.* 29.

inter et duram membranam impellere conaretur, nunquam potuit Cl. A. C. LORRY o*).

pag. 96. l. 17. *adde* Qui vero cerebrum diminui possit c*), ego passim reperio, intelligere vero nequeo. Veteres plena cum luna cerebrum tumescere scripserant, idque nuper repetitum fuit. Non ut intelligam, ut eiusmodi aliquid locum habere possit.

p. 98. l. 5. *adde* Alias eiusmodi concrementa propiora fuerunt naturae lapideae r*).

p. 99. l. 15. *adde* Tenera eius lamina supra carotides et infundibulum ascendit, et in arachnoidea evanescit k**), supra glandulam pituitariam tenerrima extenditur, et infundibulum, quod a pia fit membrana, in vaginam quasi recipit, et quasi intus suscepta in arachnoideam degenerat k†).

ibid. l. 16 *adde* Denique eadem interior lamina per foramina cranii cum nervis exiens in eorum exterius cellulorum involucrium dissolvitur, postquam paulum progressa est. Fit eadem nervi optici involucrium l*), replet infundibula l**), per quae nervi olfactorii exeunt, sic aliorum nervorum cellulosa fit vagina l***), ne diffidente quidem CATIO l†); cellulosa eam naturam etiam Cl. MASSIMI habet l††).

p. 103. l. 5. *lege* tota durae membranae interior facies u*) fundere cet.

ibid. l. 11. *post visa adde* Cerebrum in affectu catarrhali aqua tanquam spongia imbutum e*).

pag.

o*) *Mém. prés.* III. p. 282.

c*) RICHARD I. p. 87.

pag. 98. not. g) *adde* Tria MORGAGNI *Sed. caus.* I. p. 268. In apoplectico STOERN

p. 19. In furioso os cerebrum compungens MECKEL.

ibid. not. r) *adde* Prope falcem ossicula *Mém. des sav. étr.* III. p. 454. Laminae ossae amplissimae prope callosum corpus *Journ. de medec.* T. I. n. 5. Magnarum laminarum plura exempla POHL *progr.* 1769.

r*) In suspensio pia inter et duram trifurcus calculus PANAROL. V. *obs.* 14. Inter duram membranam et mediam cranii fossam gypsea materies effusa *Journ. de medec.* 1767. Août.

k**) BONN p. 71.

k†) p. 45.

l*) p. 40.

l**) IANKE *de foraminib. calvar.* p. 36.

l***) ZINN *Comm. Götting.* III. p. 258.

l†) Le CAT *sensibil.* p. 196. 212. 217.

l††) *Esp.* p. 19.

pag. 103 not. u) *adde* In medulla spinali COTYNNVS l. c. p. 12. Sed vide p. 17.

u*) SWAGERMANN p. 21.

d) *adde* Dura meninx glutine obducta POTT *injuries*, p. 227.

e*) LIEVTAUD I. P. I. p. 71.

pag. 103. l. 15. *lege* Osseae g*), lapideae naturae cet.

ibid. l. 16. *adde* Vicissim vti exhalat idem humor, ita resorbetur. Aqua aut alius humor iniectus cerebrum inter et duram matrem resorbetur (*), et perinde si inter cranium et duram matrem impuleris et admissus fuerit **), pariterque effusus sanguis in lethagro ***).

Alia est aut aqua, aut gelatina, quae in piscibus duram inter membranam et cerebrum se interponit, tenera cellulositate excepta. In testudine marina tenuem esse, neque ad ignem cogi COTVNNVS ****), idoneus ceterum auctor. In cane carcharia *Seekatze* aquam reperiri et circa encephalon, et circa medullam spinalem *****). Adipi aut gelatinae CAMPERVS comparat, hic nostris annotationibus propior †). In cyprino carpione ††) adeps est mollissimus in tenera cellulosa diffusus, quam vascula perambulant. Idem oleum et cerebro circumfufum et medullae spinali videtur esse, quod vulgo *Sperma ceti* dicitur, et ex balaena excoquitur.

Eiusmodi spatium etiam in homine video dici, praeter fidem anatomes †††).

p. 104. l. 8. *post* VESALII *adde* Huc forte papillae durae meningis cranio innatae, quae pro doloris capitis causa habet Cl. CHESNEAV i*).

ibid. l. 16. *adde* Multi glomeres glandulosi in conuexa superficie durae meningis r*), qui per morbos maiores fiunt.

ibid. l. penult. *adde* Acinosas ZINNIVS, et addit per aetatem nigrescere x*).

p. 106. l. ult. *adde* Nullae glandulae durae membranae ALBINVS e*). In morbofis corporibus absque certa lege reperiri, a sanis abesse RÖDERER, vt vitio nasci videantur e**).

SECTIO

g*) MORGAGNI *de sed. et caus. morb.* I. p. 16.

h) *adde* Meninges in scorbuticis hominibus coalitae et scirrhis obductae WILLIS *morb. conuuls.* p. 258.

*) PORTAL *précis* II. p. 153.

**) Ibid.

***) MEZGER *apoplex.* p. 76.

****) *De ischiade nervos.* p. 16.

*****) *Dronheim. Gesellschaft*, II. p. 255. 262.

†) *Mém. des sav. étrang.* VI. p. 180.

††) *Oper. min.* III. p. 199.

†††) *La FOSSE Mém. de l'Acad.* 1767.

pag. 104. *ad verbum* puteolos in *texu* lin. 4. *adde* not. ††††) BAADER *obs.* 29. et 25. in epileptico.

i*) *Obs.* 16.

r*) DUVERNEY *posthum.* I. p. 29.

x*) *Epist. ad me* III. p. 252.

e*) *Natur. homin.* p. 132.

e**) *De morbo mucoso*, p. 179.

SECTIO V.

ARTERIAE ET VENAE ENCEPHALI EIVSQVE

PROPAGINVM.

Pag. 108. l. 8. *adde* Memoria digna est annotatio Ill. MORGAGNI, qui arteriam vertebralem dextram quadruplo sinistra latiore vidit *m**).

Quare et si plurimum consuetudo potest *m**), non tamen negari potest in ipsa natura lateris dextri praerogatiua.

ibid. l. pen. *lege* vt memores simus, eum, qui vulgo *externa* dicitur carotis, anteriorem *t*) cet.

p. 112. l. 13. *post* fincipitali *adde* Accuratus Cl. olim IANKE vidit, confluere ex ramis arteriae temporalis atque auricularis *b**).

ibid. l. 15. *lege* et in dura matre cum vena meningea cet.

ibid. l. vlt. *adde* Plures arteriolas per foramen iugulare subeuntes olim DVERNEYS dixit *e**).

p. 113. l. 1. *lege* Occipitalis etiam visa est genuisse cet.

p. 118. l. 12. *post* nato *adde* obstaculo

D 2

pag.

*m**) De sed. et caus. morb. II. p. 310.

*m***) Soli tribuit NANDRVS *Orthopédie* p. 275. fatetur idem etiam pedem sinistrum robustiorem esse, in quem nihil consuetudo potuit.

p. 109. not. *f*) *adde* Vidisse se HAENELIVS *epist.* p. 244. ad me data.

pag. 110. ad EVSTACHII nomen in *textu* lin. 18. *adde* not. *u**) Le CAT de l'ouïe p. 59.

*b**) De foramin. calvariae, p. 68. T. I g. g.

pag. 112. not. *c*) *adde* IANKE l. c. p. 71. 72. t. 2. d. d.

*e**) *Posth.* I. p. 20.

pag. 113. not. *l*) *adde* Habet le CAT ouïe T. 5.

pag. 115. not. *k*) *adde* Habet LOBSTEIN de *neru. dur. matr.* p. 16. Habet le CAT Ouïe. t. 8. f. 1. l.

ibid. *ad verbum* membranam in *textu* lin. 17. *adde* not. *r**) Rariori exemplo per mediam

futuram squamosam cranium subiit SABBATIER II. p. 476. 429.

ibid. lin. vlt. *ad verbum* irretitur in *textu* *adde* not. *z**) DVERNEYS *posth.* I. p. 19.

pag. 116. not. *e*) *adde* Similes sulcos vasa in cornu cervi exsculpunt De FIEN, p. 30.

ibid. *ad verbum* pulsu in *textu* lin. 8. *adde* not. *g**) Pulsui tribuebat BOERHAAVIUS *morb. neru.* p. 29.

ibid. not. *l*) *adde* Le CAT t. 8. f. 1. 2.

pag. 117. *ad verbum* replet in *textu* lin. 10. *adde* not. *q**) Arteria tubam amplexa ad duram meningem Le CAT de l'ouïe p. 54.

ibid. not. *r*) *adde* LOBSTEIN l. c.

ibid. not. *s*) *adde* Eiusmodi ramum habet Le CAT t. 8. f. 5. a. b.

pag. 119. not. *r*) *adde* *Journ. de médec.* 1757. Decembre.

ibid. not. *s*) *adde* Duae valvulae carotidis seu officula parua duo *opusc.* p. 108.

pag. 121. l. 14. *adde* Cl. LOBSTEIN eius ramum primum dicit pone processum clinoidum natum, rete arteriosum efficientem cum altero fodali pariter pone eam apophysin orto, et alium denuo arcum supra apophysin occipitalem anteriorem facientem. Deinde furculi eunt in duram membranam, in sellam turcicam et pone eam, inque glandulam pituitariam *k**).

p. 122. l. 7. *adde* Ita LOBSTEINVS. Ramus anterior exterior receptaculi, super neruum sextum incedens dat ramos ad secundum et ad tertium ramum quinti paris; ad orbitam, eiusque duram matrem, qui facit anastomosin cum arteriolarum ophthalmicarum propagine, quae leuatorem adit *n**). Hae arteriae pro nervis a quinto pare ad duram matrem euntibus habitae fuerunt, potissimum furculi laterales externi *n***).

p. 125. l. 11. *adde* Sed etiam calculosae et induratae visae sunt in maniaco *), in cephalaea **); arteriae tenuis meningis omnes ossae ***). Sinistra arteria vertebralis subdura alba ****), et alias ossae tota †). Vir cum oblitterata carotide tres annos vixit ††). Demum omnes cerebri arteriae ossae †††), et vertebrales perinde atque carotides ossis punctis variis ††††). Apparet, et frequentem esse in arteriis cerebri naturam ossaeam, et saepe diu tolerari cum vita orthostadia.

ibid. l. 20. *adde* Aliqua tamen inde mala subinde, tam magnacum vasa sint, secuta legas. Quibus venae iugulares comprehenduntur, ii linquuntur animo

ARISTO-

pag. 120. not. z) lin. 1. *adde* de usu puls. — lin. 2. *adde* Sub glandula pituitaria poni C. STEPHANVS, p. 252.

pag. 121. not. b) *adde* Ex multis animalibus describit DUVERNEY *posth.* I. p. 574.

*k**) De neru. dur. matr. p. 14.

*n**) p. 15.

*n***) p. 17. 19.

pag. 122. not. u) *adde* Per fissuram laceram MONRO bones nervos, p. 119.

pag. 123. not. c) *adde* Orbitaria externa DUVERNEY *posth.* I. p. 20.

pag. 124. not. r) *adde* Sat bene SANTORIN. *posth.* T. II.

*) HARMERS in diff.

**) E. N. C. Dec. I. *obs.* 27.

***) MORGAGNI de sed. et caus. morb. I. p. 296.

****) Equidem in apoplectico, *Id.* II. p. 402.

†) *Id.* ibid. ††) *Mém.* 1765. p. 484.

†††) BVCHWALD *obs.* 3.

††††) MORGAGNI I. p. 28.

pag. 125. not. c) *adde* Breuem duarum horarum EMETT II. p. 331. sed ego nullum vidi. ibid. not. e) *adde* GALEN l. c. COLUMBUS apud VALVERDAM *anar.* L. VI. c. 2. SAN-

CTORIUS in I. Fen AVICENNAE p. 629. FONTANVS *respons. cons.* p. II. MORGAGNI

Sed. caus. I. p. 180. *Epist. anar.* XIV. n. 30. 33. B. LANGRISH *muscul. mor.* p. 14. 15. PA-

RISOT *Journ. de méd.* 1756. janvier. — *post* EMETT *adde* In altero exemplo tamen sopor

— *post* SWIETEN *adde* DRELCINOURT *Canicid.* STOLTE *mort. submers.*

ibid. not. g) dele WILLIS p. 58. Eam anastomosin cet.

- ARISTOTELES g*). Plus tamen mali a carotide ligata, quam a crurali BOISSIER g**).
- pag. 128. l. 2. *adde* Aneurysmata etiam in arteriis cerebri vir illustris BRUNNE-RVS vidit g*).
- p. 132. l. 4. *adde* Demum ramum ad ganglion nervi primi x*).
- ibid. l. 18. *adde* Fuerit ramus arteriae vertebralis ad cerebellum, medullam oblongatam, nervum quartum et octauum, ventriculum quartum, eiusque plexum chorioideum Iosephi DUVERNEY f*).
- p. 137. l. 7. *adde* Appendix est per os coccygis exiens ARNISAEBI k*).
- p. 141. l. 22. *post* praeditis *adde* Antiqua est hypothesis. Tenuissimum sanguinem esse, qui caput adeat, crassum, qui partes inferiores, olim ARISTOTELES q*).
- p. 142. l. 7. *adde* Verum cum ea omnia parum firma sint, quae de peculiari indole sanguinis cerebri a nonnullis relata fuerunt, suffecerit forte ad phaenomena interpretanda sola sanguinis ad caput missi vbertas, et cum in cerebro secretio non possit ad pondus alicuius momenti esse, magna portio sanguinis ad tres fere encephali libras. A multo enim sanguine calor, et pulsatio, et sanguinis euidentiora in cerebro, quam in aliis partibus, symptomata intelliguntur.
- p. 146. l. 8. *post* transeunt *adde* Vidi sinum in alueolos quasi diuississe m*).
- ibid. l. 16. *post* posterior *adde* et increfcit robore s*).
- p. 148. l. 18. *adde* Nullas se vidisse, nisi antrorsum apertas venas CL. SABBATIER y*).
- Verum negatiuarum thesium difficillima est demonstratio, et inductionem fere infinitam requirit; ego certe hic venisse vidi, et cera repletas, et sibi relictas.

D 3

pag.

g*) *Somn. vigil. n. 2.*

g**) *Effets de l'air, p. 43.*

pag. 126. not. n) *adde* Eum ramum DUVERNEYVS habet *posth. I. p. 87.* qui adit medullam oblongatam, sub fornice se occultat, dat ramos plexui chorioideo, ventriculo tertio, glandulae pinealis, natibus, testibus.

g*) *Obs. 2. posth. I. de pancreate.*

pag. 130. not. y) *adde* Laqueum habet le CAT de l'ouïe I. 10. satis leuem.

x*) *Le CAT I. 10.*

f*) *Posth. I. p. 69.*

pag. 136. not. o) *adde* Duas habet DUVERNEY I. p. 69.

k*) *De partu. p. 256.*

q*) *Somn. vigil.*

m*) WEITHRECHT *Syndermolog. p. 202.*

s*) DUVERNEY *posth. I. p. 30.*

pag. 147. not. l) *adde* Vidit CL. WRISBERG *Embryol. p. 47.*

y*) *Mém. de sav. étr. VII. p. 609.*

pag. 149. l. 2. *adde* Ingressum harum venarum accurate descripsit Vir. Cl. *Andreas* BONN, nempe venas ex sinu falcis prouenientes ad superficiem cerebri, ante immersionem in piam membranam; valuulas quidem habere in parte superiori cerebri, quae sint arachnoideae membranae duplicatae propagines, supra truncum venulae in duram membranam continuatae, tandemque in laminam eius meningis internam explicatae. Sic etiam vasa, quae ex dura membrana in piam eunt, aut vicissim, suam nunquam non habere vaginulam 2*).

p. 153. l. 14. *post* breuior *adde* antcrius angustus, posterius latior n*),

p. 159. l. 14. *post* diuaticatur *adde* quae ad circuli modum magnum foramen ambiunt i*).

p. 162. l. antepen. finem *lege* finum

ibid. l. ult. *adde* Alia est insignis secundum superiorem palpebram inter ramum transuersum faciei et labialem transuersa anastomosis x*).

pag.

2*) *De continuat. membranar. n. 46.*

pag. 150. not. n) *adde* SABBATIER *Mém. des savans étrang. VII. p. 607. DUVERNEY*

I. p. 15.

ibid. not. o) *adde* DUVERNEY t. 3. f. i. T. I.

ibid. not. q) *adde* DUVERNEY *posth. T. I.*

ibid. not. s) *adde* Vnum bifidum DUVERNEY t. i.

pag. 151. not. g) *adde* In fine falcis trifidus DUVERNEY t. i.

pag. 152. ad verbum vestiente in textu lin. 9. *adde* not. u*) DUVERNEY t. 4.

n*) *Syll. anast. t. 15. 16.*

pag. 154. not. c) *adde* ZINN p. 228. DUVERNEY pluribus ramis.

pag. 157. not. h) *adde* Duo concentrici *Syll. russ. T. 15. f. 5. n. 119.*

ibid. not. o) *adde* In petrosos inferiores inferi DUVERNEY, et in vertebrales I. p. 15.

pag. 158. ad verbum inseritur in textu lin. 13. *adde* not. q*) RIVINVS inuenit apud

TEICHMEYER *Anthropol. p. 182.*

ibid. not. u) lin. 3. *adde* Sibi inuentum anno 1673. DUVERNEYVS tribuit II. p. 538.

Ibid. not. a) *adde* Vnicus bifurcatus DUVERNEY *posth. I. p. 26.*

pag. 159. ad verbum quarto in textu lin. 8. *adde* not. h*) DUVERNEY *posth. I. p. 24.*

i*) *Syllab. russ. p. 15. f. 5.*

pag. 160. not. u) *adde* et nuper eximie WALTERVS *obs. anat. c. 4.*

ibid. ad verbum cerebri in textu lin. pen. *adde* not. y*) WALTER *obs. I. p. i. 2.*

pag. 162. not. p) *adde* WALTER t. 1. 44.

ibid. ad verba altera vena in textu lin. 3. *adde* not. p*) WALTER t. 2. 14.

ibid. not. r) *adde* Plenissime WALTER t. 1. 2.

ibid. not. s) *adde* Communicationem inter duas iugulares, quae secundum maxillam inferiorem eunt, in sinistro latere frequentiores esse, quam in dextro, RAVATON *Chir. d'Armée p. 14.* Nescio an ad numerosas annotationes. WALTERVS breuem habet et exiguam.

ibid. not. r) *adde* Truncum eius articulare vocat WALTER, et a temporali deducit t. 2. cum ramo internae mistum t. i. et 2.

ibid. not. u) *adde* WALTER.

x*) WALTER t. 2.

pag. 163. not. y) *adde* WALTER t. 2.

ibid. not. c) *adde* Totam vide apud WALTERVM

- pag. 164. l. 11. *adde* Duas vel tres eiusmodi venas habet BERTINVS *q*^{**}).
 Vnam ad tres venas, totidemque foramina, alia in osse temporum sola, alia
 et in eo, et in osse occipitis WALTERVS *q*^{***}).
 p. 165. l. 13. *post* communicat *adde* vel in petrosos inferiores *f*^{*}).
 p. 166. l. 12. *adde* In aequali amplitudine, et solito ampliora vidit Cl. olim
 IANKE *n*^{*}). Ea venae in superficie anteriori caluariae rete facit *n*^{**}) cum tem-
 porali et occipitali.
 Inde foramina in cranium vnum *n*[†]), vel duo, per quae vna, aut vna vtrin-
 que vena in sinum longitudinalem se immittit *n*^{††}).
 p. 167. l. 4. *adde* Venam eo loco habet CHESOLDEN *x*^{*}), et arteriam ad na-
 res euntem.
 ibid. l. 10. *adde* Ea fuerint foramina, per quae PETITVS acum in sinum falcifor-
 midem ire coëgit, quod BERTINVS negat sibi successisse *b*^{**}).
 ibid. l. 13. *adde* Et nunc, omnibus expensis, suspicor, sinum esse pituitarium.
 p. 170. l. ult. *adde* Tot quum sint sanguini venoso de cerebro redituro viae,
 non mirum est, vinculum venae iugulari iniectum nullam noxam inferre, ne-
 que somnum facere *z*^{*}), experimento etiam nostro.
 p. 171. l. 15. *post* descriptus *adde* vt repetere non sit necesse; nam reliqua huius
 paragraphi verba pariter, atque XXXIX paragraphum a noua editione abesse Au-
 ctor iussit.
 p. 174. l. 14. *post* excitant *adde* et pus *o*^{*}),

pag.

- pag. 164. not. i) *adde* WALTER exiguum habet t. 2.
q^{**}) II. p. 366.
q^{***}) p. 66. 67.
f^{*}) DVVERNEY T. I. f. 4.
n^{*}) Foram. calu. p. 58. 76. *n*^{**}) p. 74.
n[†]) p. 73. *n*^{††}) p. 75.
 pag. 166. not. g) *adde* Foramen non esse perpetuum BERTIN II. p. 400.
x^{*}) Osteogr. c. 1.
b^{**}) Obs. II. p. 131. 132.
 pag. 167. not. d) *adde* Conf. DVVERNEY p. 105.
 ibid. not. e) *adde* DVVERNEY ibid.
z^{*}) STOLTE mort. submers. OEDER de irritabil. HEVERMANN Physiologie, III. p. 215. LAM-
 VRE Mém. de l'Acad. des sciences 1749. p. 544. Nostr. exper. de mot. sang. 13. E. N. C. Dec.
 II. ann. III. obs. 115. et olim GALENVS. Ligatis iugularibus canis superstit quatuordecim die-
 bus DVVERNEY *posth.* II. p. 531. ne arteriis quidem et venis ligatis SWIETEN I. p. 286.
 et ARISTOTELEM huc referas, qui venas ab arteriis nondum distinguebat.
 pag. 174 not. m) *adde* VALKENBURGIUS apud NEANDRVM. Cerebrum inde quasi
 in grumum contractum BVRRHVS.
o^{*}) Post lapsum WILLIS ibid. tum monstr. RVMLER obs. 17. BONNET prodr. pract. c. 72.
 post magnos capitis dolores. Felici etiam euentu Journ. de med. T. XVII.
 p) *adde* WHARTON post apoplexiam, sic BINNINGER L. III. c. 2.

- pag. 175. l. 16. *post* replentur *adde* Neque aër per nares viam per caluariam invenit z*), neque liquore aliquo tinctus humor z**).
- p. 179. l. antepen. *post* patitur *adde* Fufe experimenta sua narrat Cl. A. C. LORRY *), non ille cupidus receptas opiniones antiquare. Non magis, quam alias corporis partes, ab irritatione moveri **), aut quam ipsam pleuram ***). Raro animal clamare ****); convulsiones nunquam superuenire †), neque cerebrum ab irritata dura membrana moveri ††); nicotianam inspersam non videri dolorem facere †††); semel butyrum antimonii, sed tunc una cerebrum laesum fuisse ††††).
- p. 182. l. 12. *adde* Denique etiam mire sub inuolucro receptos sinus tamen nonnunquam disruptos fuisse y*).
- p. 183. l. ult. *adde* Sub fornice per radices baseos praegrandes lymphae ductus versus glandulam pinealem excurrissè vidit MORGAGNVS z*).
- p. 184. l. 7. *adde* In sulcis inter colliculos, et secundum vasa rubra in animalibus Cl. BOVRGELAT dixit e*).
- ibid. l. 13. liceat interim - - - pleniora experimenta suppetant, *lege* (et tamen etiam solius MORGAGNI auctoritas nos moueret); cum tamen Cl. HEWSON, qui nuper in systemate lymphatico felicissime laboravit, neget se in cerebro vasa aquosa vidissè e**), liceat pleniora experimenta expectare.
- ibid. l. antepenult. *adde* et MORGAGNVS supereminentem tumorem aquosum ligatis vasibus lymphaticis tribuit h**).

SECTIO

- pag. 175. not. r) *adde* COLLINS, FRACASSATI p. 328.
 z*) SCHNEIDER *off. cribriform.* p. 607.
 z**) VIEUSSENS p. 57.
 b) *adde* G. de MERA ap. NEANDRVM, BARTHOLIN. *Cent. I. hist. 5.* FABBRA *de rabaco* p. 161.
 pag. 176. not. c) *adde* BOERHAAVE *morb. nerv.* p. 27.
 ibid. not. h) *adde* VANDELLI *supplem.* l. p. 78.
 ibid. not. i) *adde* DVERNEY.
 pag. 179. not. s) *adde* Similia de lacerata dura matre MORGAGNI *de sed. et caus.* l. p. 269.
 *) *Mémoir. de savans étrangers* III. **) p. 286. ***) p. 291. ****) p. 289.
 †) Ibid. ††) p. 398. †††) p. 291. ††††) Ibid.
 p. 181. not. o) *adde* HENKEL *Samml.* VIII.
 ibid. not. p) *adde* de HAEN *ratio medendi* l. p. 173. BAADER *obs.* 50.
 pag. 182. not. s) *adde* MORGAGNI *de sed. et caus. morb.* l. p. 79.
 y*) *Ess. of a Socier. at Edinburgh.* V. n. 53.
 z*) *De sed. et caus. morb.* l. p. 15.
 e*) *Supplem.* p. 37.
 e**) *Inquir.* II. p. 51.
 pag. 184. ad verbum nihil in textu lin. antep. *adde* not. h*) Nec tumorem, nec saluationem *Mor. sangu. exp.* 113. 114.
 h**) *Sed. et caus. morb.* l. p. 182.

SECTIO VI.

NERV I.

- Pag. 185. l. 2. *post infectis adde* tum polypo marino (*), limaci (**), etiam ubi nullum conspicuum caput est, vt lepori marino (***),
 p. 186. l. 10. vnice membraneum *lege* totum medullarem
 ibid. l. 18. *post* continuatur *adde* Sic in cyprino carpione y*).
 p. 187. l. 18. *adde* tantum vt isti potius duriores sint o*).
 p. 188. l. 20. *dele* funiculo
 p. 189. l. 12. *adde* Non ideo, quod in neruis plurima cellulosa est, ideo toti nerui cellulosa fiunt, quae nupera etiam Cl. MASSIMI k*) hypothesis fuit. Vtilia per experimenta ostendit Cl. Petrus MOSCATVS intimum inter cellulosa telam, verumque neruum esse discrimen; illam in aqua contabescere et dissolui, neruum immutatum persistere. In eadem cellulosa tela adeps colligitur tanta nonnunquam copia, vt fibrae reliquae fere euanescent k**).
 ibid. l. pen. *post* sexto *adde* tum extra cranium ab infraorbitali p*).
 p. 190. l. 14. *adde* Neruulos etiam inter nerui funiculos esse, quibus atroces dolores oriri possint BOERHAAVVS e*), nescio, quo auctore.
 p. 192. l. 5. *adde* Refutatum olim a me errorem deseruit Cl. SABBATIER u*).
 ibid. l. 8. *post* obuoluit *adde* Haec est alia vagina neruorum accessoria, diuersa ab ea, quae de cerebro aduenit Ill. COTVNNI x*). Ab hac potissimum membrana nerui alioquin molles duritatem habent x**).

pag.

l*) SPALLANZAN. *riproduz.* p. 60.

l**) BOHADSCH *de animal. marin.* p. 8. 9. 10.

l***) Teste Cl. KOELREUTERO.

pag. 185. not. u) *adde* Nerui seu *Tovoi* ad latera gulae POLLYX p. 252. Neruus colligans femur cum ischio Il. p. 259.

y*) *Opuscul. min.* III. p. 200. 201.

pag. 186. not. a) *adde* deinde Librum XVI.

o*) In elephanto fibrae nerueae non duriores sunt, quam in parvis animalibus KAAVW

Nou. *Comm. Acad. Petrop.* IV. p. 359.

pag. 189. not. f) *adde* Plicae *Comment. Bonon.* T. III. p. 284. 292.

k*) *Esper. anat.* n. 3. 4.

k**) Plus adipis in crurali fuisse, quam fibrarum MORGAGNI *de sed. et caus.* II. p. 446.

p*) *Le cat de l'ouë* t. 8. f. 5.

e*) *Morb. neruor.* p. 67.

pag. 190. not. g) *adde* BOERHAAVE *morb. neru.* p. 16. DAVID *Nutrition* II. p. 320.

u*) *Anat.* II. p. 49.

x*) *l. c.* p. 37.

x**) MECKEL *Mémoire. de l'Acad.* 1749. p. 90. 91.

- pag. 193. l. 4. *lege* dueros a medulla spinali deduxerunt c),
 ibid. l. 5. *adde* Non tamen imperite GALENVS addit, neruos molles, vbi longe progressi fuerint, demum indurescere c*).
- p. 195. l. 2. *adde* Denique a summo viro, non facile quicquam dante coniecturae, in neruis vis motrix ponitur, vitali similis, vel musculari, qua oscil-
 lent r*).
- ibid. l. 23. *adde* Demum et irritabilem esse, et agere fibram nerueam per relaxa-
 tionem, quando lux maior oculum ferit, et pupilla amplior redditur x*).
- p. 196. l. 12. *adde* Eundem esse humorem addunt, qui, ligato neruo, spissatus
 tumorem facit in eiusmodi neruo post aneurysmatis curationem conspi-
 cuum l*). Haec putes esse ganglia, quae in neruorum vulneribus nasci di-
 ctum est l**), qualia etiam ganglia frequentia et dolorifica prouenire CAM-
 PERVS auctor est l***).
- ibid. l. 12. *adde* Nuper demum vir Ill. *Dominicus COTVNNVS* vaporem repetiit,
 qui in cellulositate nerui in aquulam coit n*), magis etiam lentescit, quam
 aqua n**), et a morte coagulatur n†). Cum pes paralyticus esset, mucosa
 collectio in vagina nerui ischiadici reperta est n††).
- p. 197. l. 7. *adde* Vaporem, qui in aquam colligatur, puto probabilem esse, cum
 etiam adeps in ea tela colligatur.
- p. 198. l. 14. *venis lege* neruis
- p. 199. l. 22. *lege* Ita opticus neruus duram membranam deponit, quae vel scle-
 roticam producit, vel cum ea connectitur k), et piam, quae interiorem sclero-
 ticae faciem oblinat l); ipsa vero medulla per cribrosae laminae foramina *)
 transit,

c*) Ibid.

p. 194. *ad verbum* elasticus in *textu* lin. 5. *adde* not. l*) Inter partes maxime elasticas SET-
 TAGAST *Inst.* l.

ibid. *ad verbum* contendit in *textu* lin. 8. *adde* not. m*) Nobiscum LOESEKE p. 151. Ill.
 WHYTT *Neru. disordr.* p. 67.

r*) GAVBIVS *patholog.* p. 268.

pag. 195. not. s) *adde* Nobiscum Ill. WHYTT l. c. p. 68 BOVRGELAT *Elem. d' Hippiatr.*

p. 246. Non vibrat neruus et fortissima vibratio nullum dolorem facit CAVERHILL *heat.* p. 55.

ibid. not. r) praefigenda est littera s*) et notae u) littera r).

ibid. *adde* not. u) FABRE *Essais* p. 21. Tamen irritabilem esse.

x*) MARHERR *praefectio.* III. p. 160. seqq.

l*) *Comment. Bonon.* III. p. 289. 294. In nodulos post amputationem versi nerui SWE-

DIANVS p. 78.

l**) MAYOW *oper.* p. 390

l***) p. II.

n**) p. 37. n*) *Ischias neruos.* qui ex cerebro addit aduenire.

n†) p. 38. n††) ISENFLAAM *Versuch einig. prakt. Anmerk. über die Nerven*, p. 79.

*) per optica ossis sphenoidei foramina haud dubie legendum est. Not. editor. hui. auctar.

transit, et abit in fibras tenuiores, quae in pellucida membrana sparguntur, atque exterius, qua chorioideae respondent, mollissima quasi pulve obducuntur m).

pag. 200. l. vlt. *adde* III. nuper GESNERVS ex calculis a retina, et ab imagine visibili repetitis reperit fibrarum in linea quadrata esse 2880 y*).

p. 201. l. 5. *post* cancello *adde* aphrodita h*) et *post* aliisque: Sed nodulos polypi aquae dulcis totidem esse ganglia h**) coniectura est, cum in his animalibus nulli sint nerui, ganglia vero sint neruorum quaedam degeneratio.

p. 202. l. 11. *adde* Denique in ramo principe splanchnico b*).

ibid. l. 13. *adde* Et multa habent plexuum similia d*).

Ganglia et plexus esse in vicinia arteriarum IOHNSTON d**).

ibid. l. vlt. *adde* Hinc rubedo cellulosa in ganglio telae, et vniuersi ganglii h*).

Haec vasa et per inuolucrum ganglii rete faciunt h**), et per cellulosam telam.

In iuniori animali maiora sunt, vt nerui sunt maiores h†).

p. 203. l. 10. *adde* neque in ipsis magnis animalibus BOVRGELATI n*).

ibid. l. 18. *adde* et LANCISIVS s*),

ibid. l. 19. *adde* Cum cerebri fabrica nihil commune habent durissimae systematis neruosi partes t*).

E 2

pag.

pag. 199. not. m) *adde* Additis experimentis in piscibus factis Oper. min. T. III. p. 261. n. 11. y*) Thes. physic. miscell. a. 1771. edit.

pag. 201. not. c) *adde* BIBIENA Comm. Bonon. V. P. I.

h*) PALLAS miscell.

h**) VNZER Arzet. 4 Theil.

pag. 202. not. q) lin. 3. *post* accumbunt *adde* et cum ganglio id solum commune habent, quod a numerosis vasis rubrum colorem habeant WRISBERG, Götting. Anzeig. 1776. p. 465. seqq.

ibid. not. n) *adde* Medium defuisse visum est ISENFLAMM difficil. experif. III.

b*) LVDWIG.

d) *adde* Ioh. Gottlob HAASE de gangl. neruor.

d*) HAASE.

d**) Of ganglions.

h*) Le CAT sensibil. p. 224. HIRSCH. I. GASSER neru. quint. par. MORGAGNI adu.

anat. II. p. 71.

h**) HAASE l. c.

h†) VITTET veterin. I. p. 530.

pag. 203. ad verbum tela in textu lin. 1. *adde* not. h††) Ex dura membrana non bene, a qua pleraque sint remotissima, et manifesto dissideant aliqua vt in oculo le CAT sensibil. p. 223.

ibid. ad verbum parallelum in textu lin. 3. *adde* not. k*) MASSIMI p. 29.

ibid. not. l) *adde* In retis modum intricare HAASE l. c.

n*) Ep. p. 245.

not. p) *adde* HAASE.

s*) Ab eo posse obstrui et pene paralyticum fieri, p. 117.

t*) Cerebri substitutum ganglion, ganglii glandula le CAT I. p. 144.

- pag. 204. l. 12. *adde* Piscibus multo pauciores nerui sunt. In testudine quatuor, non plura paria CALDESI t**).
- ibid. l. 15. *post* ipsos *adde* cerebri lobos anteriores, inque iis effossos
- p. 206. l. 2. *post* paratur *adde* triangulari, inferius latiori,
- ibid. l. 4. *adde* Ipse linea longitudini parallela diuiditur s*).
- ibid. l. 8. *post* subeunt *adde* vt mireris negasse MERGV M posse eas fibras ostendi *), et alios nuperos **), cum alii clar. viri etiam cum quinti paris neruis rete facientes viderint †), sed iam SCHNEIDERVS et piam matrem viderat, et distinctam medullam ‡).
- p. 207. l. 8. *adde* In SANTORINI opere accedunt accuratius aliqua a nuperis inquisita. In icone vtique duo colliculi ordiuntur neruum opticum, quorum alter interior circa columnam cerebri inflexus euanescebat. In descriptione disertius additur, a latere natum fasciculum nasci, qui thalami optici se addat, et ad neruorum opticorum originem accedat; aliae fibrae eiusdem thalami ex interioribus thalami penetralibus curuatis fibris Willisianae chordae occurrentibus tum a corpore geniculato ad posteriora thalami posito intus cinereo, extus medullari. Denique maior et fere praecipua pars huius eiusdem thalami prouenit ex protuberantiis testiformibus, lata et disiectis fibris ex vicinia originis nerui quarti paris. Alium denique fasciculum subiungit a supera parte crurum medullae oblongatae prodeuntem, qua incipiunt cum thalamis decussari k*).

In

t**) Tartarughe T. 2. f. 5.

pag. 205. not. i) *adde* SCHNEIDERVS, WEPFERS *cicur.* p. 202. in cane nullum v. HORNE *duct. salin.* II. n. 5.ibid. not. u) *adde* SANTORIN. t. III. f. I.ibid. not. o) *adde* SANTORIN. *posth.* Alia est descriptio III. LOBSTEINII. Facit breuius principium, quod aduenit ex limite inter corpus striatum anterior et posterius; inde accedit rete de lateribus cerebri p. 28. Longior ei radix est ex fissura SYLVII angulo, repit inde per cineream corporis striati inferioris et interioris substantiam p. 27. 28. tertium etiam nonnunquam caput accedit ex interstitiis anteriorum loborum cerebri ad eorum principium, quod videtur ex fundo ventriculi anterioris aduenire, et papilla corticali tegitur, quae lobos anteriores terminat, qua conueniunt p. 30.s*) SANTORIN. *posth.* T. III. f. I. t. 2. f. I. *) *Progrès de la Médecine*, p. 25.**) CHESELDEN *neru.* n. 13. *Mém. de Berlin.* T. IX. p. 133.††) *Off. cribriform.* p. 230. †) PETIT *pratiq.* ad l. de neruis p. 408.pag. 206. not. u*) *adde* *Anc. Mémoir. avant 1659.* I. p. 366.ibid. not. y) *adde* In hac classe maiora vidi, sed multiplici origine.

Nempe propria sunt tubercula olfactoria superiora p. 204.

Et alia tubercula olfactoria inferiora.

Tertia origo in nonnullis a tuberculis reniformibus p. 210.

Et denum ad tubercula olfactoria inferiora fibrillae ex glandula pituitaria adueniunt

p. 206. LOBSTEIN p. 29.

k*) GIRARD, ad SANTORIN p. 32. 33.

In piscibus mirum est, quam numerosis fasciculis a cerebro abscedant; nempe ex thalamis opticis, sed duabus distinctissimis fibrarum seriebus *k***) intimis, et aliis ex superficie aduenientibus, et tertia serie ex toro semicirculari, qui thalamo optico includitur. Porro in facie interiori fibrae accedunt a tuberculorum inferiorum vtraque parte *k****), tum a geniculato vtroque.

pag. 207. l. vlt. *adde* Subtilius cum in ista inquisissent SANTORINVS et GIRARDVS, inuenerunt demum, nasci ex medulla lateribus crurum cerebri interposita, plerumque non modo cinerea, sed et fulca et liuida, collectis fibrillis albis, quae continuo cruribus medullaribus inosculantur, quae secunda, et saepe sola est origo *p**).

p. 209. l. 4. *post* proficiscuntur *adde* partim

ibid. l. 5. *adde* partim a ponte *g**).

ibid. l. 16. *adde* In hoc receptaculo haecenus neruus quinti paris videtur intumescere, vt rete quodam vasculoso rubello superficies nerui tegatur *), et ipse neruus, discedentibus fasciculis, plexui similis sit **). GASSERII ganglion ***) vulgo vocant; depinxit etiam le CAT, et dixit GIRARDVS. Non est ganglion, vt rectius apparet, repletis vasis, et pertinet ad arteriarum receptaculi ramulos per nerui superficiem dispersos †). Lamina interior durae membranae ea sede accuratius neruo annectitur, quam vulgo solet. Plexum gangliiformem se vidisse, sed rarius, GIRARDVS ††).

p. 210. l. antepen. *post* fecedit *adde* tanquam alter truncus, idemque prioribus maior *y**).

p. 211. l. vlt. *lege* deorsum

E 3

pag.

*k***) Oper. min. III. p. 200. *k****) Ibid. p. 203.

pag. 207. not. *m*) *adde* Vocat antrum neruorum oculi MALACARNE p. 89.

ibid. not. *p*) *adde* Superne GIRARDI t. 2. f. 2. a latere t. 3. f. 1.

*p**) GIRARDI p. 14.

pag. 208. not. *q*) *adde* qui parum a tertio (nostro quinto) distinctum facit.

*g**) In nuperiori descriptione SANTORINVS, et cum eo consentiens GIRARDVS duos funiculos facit radicem nerui quinti. Primus etsi videtur ex ponte oriri, re vera non oritur; et diuersae a pontis fibris naturae fibras habet, totus vt ex cruribus cerebelli proueniat; idem superior et maior p. 17. Alter minor ex ponte vtiq; natus priori adiicitur ib. p. 18.

pag. 209. ad verbum septum in textu lin. II. *adde* not. *i**) DVVERNEY *posthum.* t. IV.

*) HIRSCH *neru. quint. par.* TABARRANVS, LOBSTEIN, MECKEL.

*) Le CAT *Oste* T. VIII. f. 5. T. 9. f. 3.

***) HIRSCH n. 44.

†) Conf. WRISBERG *Götting. Anzeig.* l. c.

††) Ad SANTORIN. T. 2.

pag. 210. not. *u*) *adde* le CAT *Oste* t. 8.

*y**) Le CAT *ibid.* f. 1.

pag. 211. not. *e*) *adde* le CAT t. 8. f. 1.

ibid. not. *n*) *adde* Ad originem musculi buccinatoris DVVERNEY I. p. 88.

- pag. 213. l. 10. *adde* Habent Cl. I. BANG *h**) et SABBATIER *h***).
- p. 214. l. 7. *adde* Neruulum non satis intellexerat *le* CAT, etsi nunc piclum dedit *n**).
- ibid. l. 20. *adde* Aliquanto plura vidit Cl. IONAS BANG. A neruo nempe palatino quinti duae radices exhibant, prior ad ramum a sexto pare ad intercostalem euntem, altera, quae huius ipsius radix est a MECKELIO dicta.
- p. 217. l. 4. *adde* Is parotidi furculum dat, coniungitur cum temporali primo, subit per aliam fissuram, adit musculum CASSERII *a**).
- p. 224. l. 11 *post* trunci *adde* abdominalis
- ibid. l. 16. *adde* Hunc eundem neruum a solo sexto oriri, idque a WALTHERO, refragante PLATNERO, esse demonstratum *n*†), ita debet sumi, ut nullos ab ophthalmico quinti furculos habuerit.
- p. 225. l. 2. *post* quintum *adde* a MARINO hactenus constitutum *n**).
- ibid. l. 10. *post* bifurcata est *adde* Latam a thalamo striam accessisse vidit LOBSTEIN *s**).
- ibid. l. 15. *post* obducitur *adde* Originem Ill. MECKELIUS compositam facit; lata de pedunculo cerebri, deinde distincta parte ab ora posteriori pontis VARROLII. Aliquando strias transversas calami reflexas circa medullam oblongatam aduenire ad vsque sedem pedunculorum, a qua pars reliqua nervi mollis oritur *n**).

pag.

- pag. 212. not. *s*) *adde* Le CAT t. 8. f. 1. 2.
*h**) Neru. cervic.
*h***) Anatom. II. p. 505.
- p. 213. not. *i*) *adde* Canalem in ossibus siccis describit ALBIN. *sceler.* p. 161.
 ibid. *ad verbum* nervus *in textu* lin. 13. *adde* not. *i*†) *le* CAT, T. VIII. f. 2. etc.
*n**) T. 8. f. 2. 3. p. 268.
- pag. 214. *ad verbum* debemus *in textu* lin. 13. *adde* not. *s**). Habet nunc HIRSCH l. c. n. 62. 64. I. BANG Neru. cervic. SABBATIER ap. VERDIER II. p. 505. MONRO *bones*
- p. 94. non laudato MECKELIO.
 ibid. not. *y*) *adde* Habet ramos dentales *le* CAT T. 8.
*a**) Le CAT t. 7. f. 2. t. 9. f. 5.
 pag. 218. not. *r*) *adde* *le* CAT t. 5.
 pag. 222. *ad verbum* corporum *in textu* lin. 5. *adde* not. *a**) Ex pyramidalis ZINN p. 200.
 A ponte prope ea corpora, non ab iis, COOPMANS *neru.* p. 114. Ex coniunctione pontis cum corporibus GIRARDVS l. c. ad T. 2. Aliquando a tracta transversali medullari sub imo ponte ib.
 ibid. not. *b*) *adde* Duabus radicibus anteriori et posteriori BANG.
 pag. 223. not. *u*) *adde* MONRO *neru.* p. 397.
n†) Ep. ad me p. 17.
*n**) ORIBAS. p. 264.
 pag. 225. not. *q*) *adde* GIRARDI t. 2.
*s**) t. I.
*x**) Mém. de l'Acad. 1765. p. 99.

pag. 225. l. penult. *post* nascitur *adde* Descriptionem Cl. MALACARNE coniunctim addo. *Fossula quadrilatera* inter pontem et corpora oliuaria, ex cuius fundo multae fibrae nerui duri oriuntur z*).

Aliae fibrae ex partibus oppositis sulci ventriculi quarti, vtrique duae et tres oriuntur z**), quae vniuntur, transeunt secundum basim colliculi pyramidalis, vniuntur cum fibris fossulae quadrilateralis, et fiunt neruus durus.

Aliae inter floccum (partem eminentem plexus chorioidei quarti) et eminentiam pyramidalem z***).

p. 226. l. 12. *adde* Surculum etiam vidit MECKELIVS, qui in vestibulum per manubrium subit i*), eundem puto, quem BERTINVS dicit per imum meatum semicircularem proprium per ductum subire i**).

ibid. l. 16. *post* aequabilis *adde* tamen acustico linguale maior,

p. 227. l. 1. *post* pergit *adde* ad aliquam distantiam a membrana tympani, cellulosi tamen filis ad eam reuinctis q*).

ibid. l. 13. *post* mastoideas *adde* ad foramen iugulare et musculos basi ossis hyoidis affidentes e†). Alias etiam cruri longiori incudis e††), membranae tympani e†††), tubae, musculis,

p. 228. l. 12. *adde* III. MECKELIVS habet ramum ex neruo duro natum continuo, ut ex aquaeductu prodiit, qui ante biuentrem descendit bifidus, et vno furculo in eum musculum confumitur, altero cum neruo molli ab intercostali ramo. Alter vero, maiorque ramus biuentrem perforat, redit versus foramen

z*) Nuova esposizione della vera struttura del cervello umano, p. 91.

z**) p. 111.

z***) p. 112.

pag. 226. not. b) *adde* Vt eum neruus subeat le CAT t. 9.

ibid. not. i) *adde* le CAT T. 3. f. 3. T. 8. f. 8. T. 2.

i*) MECKEL *epist.* p. 212. le CAT p. 57.

i**) Le CAT p. 57. BERTIN *des Os* II. p. 64. 65.

q) *adde* Conf. le CAT t. 8. f. 2.

q*) Le CAT t. 8.

pag. 227. not. z) *adde* LOESEKE p. 20. Reiecit neruum musculi CASSERII SABBATIER II. p. 676. neque videtur egere, cum mera membrana sit.

ibid. not. a) *adde* LOESEKE.

ibid. not. c) lin. 2. *adde* DVERNEY *mém. avant* 1699. ad 1676. 1677.

ibid. not. d) *adde* LOESEKE p. 17. le CAT t. 4. f. 18.

e†) Le CAT t. 4. f. 10.

e††) LOESEKE p. 18.

e†††) Ibid.

e*) *adde* LOESEKE p. 20.

foramen iugulare, et cum linguā ab octauo coit *n**). Eam vnionem WINSLOWIO iam dictam se vidisse Cl. LASSVS *n***).

- Ramum ad accessorium circa eam regionem habet SABBATIER *n*†).
- pag. 231. l. 10. *adde* Ita reperi, rarius autem ita se habere GIRARDVS, et frequentius prodire pluribus fibris a quarto ventriculo, tum ex superioribus scrobis huius ventriculi, tum ex inferioribus.
- p. 232. l. 8. *adde* Ea, vt puto, sede erunt eae anastomoses cum neruo nono, cumque quinto, quas WINSLOWIO soli dictas Petrus LASSVS suo testimonio confirmat *b**). Cum nono videtur le CATIVS depingere *b***).
- p. 235. l. 5. *adde* Ramum ex medio collo ad glandulas baseos cordis, adque eam basin, eiusque partem anteriorem inter eam basin et aortam DVERNEYVS habet, tum ramum ad auriculam cordis sinistram circa recurrentis ortum *i**).
- p. 236. l. 12. *lege* dexterior plerumque
- ibid. l. ult. *adde* Neruos octauī paris cum intercostalibus coniunctos efficere nervos abdominis olim GALENVS *i**).
- p. 237. l. 5. *post* eunt *adde* et ab istis sunt nerui comites vasorum gastropiploicorum dextri lateris, qui ad ventriculum diuiduntur, et nonnullis furculis ad omentum,

pag.

*n**) *Epist.* ad me T. II. p. 679.

*n***) T. III. n. 12.

n†) *Morb. ling.*

pag. 228. not. o) *adde* Ad aurem et apophysin mamillarem le CAT t. 4. t. 7. f. 2.

pag. 229. not. b) *adde* MENG p. 79.

ibid. not. d) *adde* Ramus temporalis, superficialis duri, qui plexum efficiunt le CAT t. 3.

pag. 231. not. i) *adde* le CAT t. 10. 8.

ibid. not. n) *adde* Ex latere exteriori processus in arcum ducti, in quem corpus pyramidale producitur SANTORIN. T. II. u.

pag. 232. not. y) *adde* Describit etiam ROEDERER *thes. decad.* n. 27.

ibid. not. z) *adde* le CAT t. 10.

*b**) *Morb. ling.*

*b***) t. 10.

pag. 234. not. n) *adde* Veteres id ganglion habebant vt GALEN. *de vit. part.* L. XVI. c. 5.

*z**) l. p. 103.

pag. 235. *ad verbum* vterque lin. 16. *adde* not. o*) DVERNEY p. 95.

pag. 236. *ad verbum* venosi in *textu* lin. 6. *adde* not. b*) BERTRANDI *de hepate*, p. 38.

ibid. *ad verbum* veniunt in *textu* lin. 20. *adde* not. g*) Plexus gastricus circa coeliacam arteriam LVDWIG plex. abdom.

ibid. not. i) *adde* Ramos ad plexum splenicum LVDWIG.

*i**) *De vit. part.* XIV. c. 5.

pag. 237. *ad verbum* hepaticum in *textu* lin. 1. *adde* not. i**) Ramos ad plexum hepaticum

LVDWIG.

- pag. 238. l. 6. suis *lege* plusculis
 p. 240. l. 12. *adde* et Cl. SABBATIER *f**),
 p. 242. l. 16. *adde* Sed vidit nuper Cl. SABBATIER furculum, qui terminatur
 in sui canalis lateribus et fila dat aliqua cum primo, (secundo nostro), com-
 municantia, tantum ut nihil cum cordis nervis commune habeat *m**).
 p. 244. l. 10. *post* demum *adde* Ad omnes vertebrae colli Cl. LOBSTEIN *p**).
 ibid. l. 11. *adde* neque LOBSTEIN *r**). Cum accessorio saepius tantum con-
 glutinatur, eumque praeterit *r**), saepius tamen communicat *r****).
 p. 245. l. 2. *post* prodeat *adde* Vidit tamen Cl. LOBSTEIN, et cum linguai ab
 octavo misceri, et cum octavo *a**).
 ibid. l. 9. *adde* Communicare cum septimi parte dura, et ab ea ramum habere
 SABBATIER *d**); cum octavo *le* CAT *d***).

pag.

- pag. 238. *ad verbum* pyramidalibus *in textu* lin. 3. *adde* not. *r**) Ab imis pyramidalibus
 SANTORIN. T. II.
 ibid. not. *z*) *adde* Coniunctionem veram habet *le* CAT T. IO. Aliquando cum eo nervus
 coniungi olim GALENVS de *viril. part.* VI. c. II. DROVIN p. 53.
 ibid. *ad verbum* augetur *in textu* lin. antep. *adde* not. *e**) Rete ex octavo, nono, undecimo
 (secundo) HUBER habet p. 21. *le* CAT ex octavo, nono, primo accessorio T. X.
 ibid. not. *h*) *adde* VIEVSSENS p. 205.
 pag. 239. *ad verbum* sternothyreoideum *in textu* lin. 3. *adde* not. *l**) Sternohyoideum et
 sternothyreoideum BERRETIN t. 13. f. 2. ad ipsum subclaviu DROVIN p. 53.
 ibid. not. *p*) *adde* Id cum piscium cerebro commune habere CAMPER *Verh. van de Maatsch.*
 T. VII. p. I. p. 94. 95.
*f**) *Mémoire des sav. étrang.* T. VII.
 pag. 240. not. *g*) *adde* Duplices LOBSTEIN f. I.
 ibid. not. *h*) *adde* Ramus quidem *Idem*. Sed tamen etiam a facie postica fibram vnam
 vel duas.
 pag. 241. not. *m*) *post* velle *adde* *Mém. prés. T. VII.* lin. ult. *adde* Conglutinatur SABBATIER
 p. 556.
 ibid. not. *n*) *adde* Ramum ab accessorio descendente ad decimum venire SABBATIER.
 ibid. not. *y*) *adde* Habet SABBATIER *Anat.* II. p. 701.
 ibid. not. *z*) *adde* *le* CAT t. IO.
 ibid. not. *a*) *adde* VIEVSSENS p. 205. DUVERNEY p. 97.
 pag. 242. not. *d*) *adde* VIEVSSENS p. 205.
 ibid. not. *g*) *adde* DUVERNEY p. 197. aliquando.
*m**) *Anat.* II. 701. *Mém. des savans étrang.* T. VII. p. 558. 559.
*p**) p. 28. f. 1.
*r**) p. 27. 29.
*r***) LOBSTEIN, SABBATIER.
*r****) LOBSTEIN p. 28.
 pag. 244. not. *x*) lin. 2. *adde* Quatuor, quodque duplex LOBSTEIN f. I. Multa *le* CAT
 t. IO. Multa SANTORIN. t. 2.
*a**) p. 32. f. 2.
*d**) *Anat.* II. p. 679.
*d***) t. IO.

pag. 245. l. 12. *lege* cruralibus

p. 246. l. 8. *adde* III. CAMPERVS hos plexus paulo aliter descripsit, et facile credas rem varietatem admittere *k**). Duos facit plexus, anteriorem, qui reliquos ramos brachiales, et posteriorem, qui radialem et articulare edit.

ibid. l. 11. *adde* Septem CAMPERVS numerat *l**).

ibid. l. 19. *adde* Ex quinto et sexto CAMPERVS *o**).

ibid. l. 22. *adde* Ex octauo colli CAMPER *p**).

p. 247. l. 4. *post* brachialis *adde* tegitur vena mediana, et ea fede in venae sectione laedi potest *u**),

ibid. l. 21. *adde* Eius est ramus insignis cutaneus externus *g**).

p. 257. l. 18. *post* habet *adde* Cum spinalibus ceruicis neruis quinque communicationes habet a secundo ad sextum, vel inferiores, trunculo, qui per canalem processuum transuerforum ascendit *c**).

p. 258. l. 6. *post* tendunt *adde* alii et numerosi ad oesophagum, ad neruum octavi paris alii *l**),

pag.

*k**) Fasc. I. T. 9. t. I. f. I.

*l**) t. 9.

*o**) In icon. t. I. f. I.

*p**) p. 12. t. I. f. I.

pag. 246. not. *r*) *adde* Duas etiam CAMPER p. II.

pag. 247. not. *r*) *adde* Ex quatuor neruis CAMPER t. I. f. I.

*u**) CAMPER t. 2. f. I. 2.

ibid. *ad verbum* octauo in *textu* l. 9. *adde* not. *y**) CAMPER.

ibid. not. *d*) *adde* Ex quinto, sexto, septimo et octauo CAMPER.

*g**) PETIT ad PALFYN p. II71.

pag. 250. not. *l*) *adde* CAMPER I. p. 2.

pag. 251. not. *p*) *adde* CAMPERVS plexum facit pudendum, ad quem ex ipso trunco ramus recurrit; ramum ad rectum intestinum; ad anum et perinaeum, ad penem.

pag. 254. not. *n*) *adde* Habet GALENVS de *utilitate partium* XIV. c. 5.

ibid. not. *o*) *adde* Breuius LOBSTEIN f. 2.

pag. 255. not. *x*) *adde* LOBSTEIN f. 3.

ibid. not. *l*) *adde* VITTEI I. p. 53. etc.

pag. 257. *ad verbum* superior in *textu* lin. 5. *adde* *z**) Habet DVERNEY.

*c**) SABBATIER *Anat.* II. p. 711.

ibid. not. *d*) *adde* Habet CAMPER T. I. f. I.

ibid. not. *e*) *adde* Nullum fuisse ISENFLAMM *diffic. epicrif.* III. p. XXXII. Nob perpetuum esse ad septimam vertebrae DVERNEY I. p. 99.

*l**) SABBATIER II. p. 354.

pag. 258. not. *o*) *adde* CAMPER T. I. f. I.

pag. 259. *ad verbum* duo in *textu* lin. 1. *adde* not. *t**) ISENFLAMM I. c.

ibid. *ad verbum* ipsis in *textu* lin. 8. *adde* not. *y*†) CAMPER f. 10.

pag. 259. l. 15. *adde* Quatuor ramos, qui vniti pectus subeunt, et sub arteria pulmonali ad auriculæ dextræ partem posteriorem et cordis sedem inter aurículas eunt *b*)*.

Sinister vero intercostalis ex primo ganglio, et ex ramis inferioribus dat propagines in aspera arteria positas pone aortam, quæ plexum faciunt circa arteriam pulmonalem et auriculam, et ventriculum sinistrum adeunt *b**)*.

pag. 260. l. 9. *adde* Habet etiam DVVERNEYVS ramos a recurrente sub arteria pulmonali dextra cum intercostali commistos *k*)*.

p. 261. l. 4. *adde* Renalis ad decimam et vndecimam vertebram DVVERNEY *s*)*.

ibid. l. 23. *adde* Duo, tria fecit DVVERNEY. Ex iis plexum deducit hepatis mesentericum, ex eo hepaticum, ramos ad glandulas renales vnitos cum ramis octauæ parvis *y*)*; porro ex trunco, et ex plexu renali fieri ramos plexus mesenterici inferioris *Idem*.

p. 265. l. 7. *adde* A splanchnico etiam aduenire radices LVDWIG.

p. 266. l. 19. *adde* Mesentericum inferiorem habet LVDWIGIVS. Nempe sub arteria mesenterica superiori plexus oritur renalis. Ex eo rami in mesentericum inferiorem descendunt. Descendunt alii vtrinque ex trunco sub ramis ad renalem natis, et ad inferiorem mesentericum accedunt. Denique alii a renali plexu, qui est a splanchnico.

F 2

Cl.

b)* DVVERNEY.

*b**)* Id. p. 103.

pag. 259. not. *d)* *adde* Habet CAMPER t. I. f. I.

k)* p. 103.

pag. 260. not. *l)* *adde* Hepatis mesentericus DVVERNEY p. 100.

s)* p. 103.

y)* DVVERNEY p. 101.

pag. 262. not. *f)* *adde* ISENFLAMM l. c. addit in phrenico communicare.

pag. 264. not. *b)* *adde* LVDWIGIVS. Ramus vtriusque ganglii semilunaris super coeliacam arteriam cum ramo posteriori parvis octauæ facit plexum, vel circa coeliacam et mesentericam arteriam producit.

pag. 265. not. *k)* *adde* Superiorem et inferiorem habet COOPMANS apud MONRO p. 147.

ibid. not. *l)* *adde* Sinister splanchnicus LVDWIGII ganglion facit ad aortam super arteriam coeliacam. Ab eius ganglii dorso multi rami eunt ad renalem arteriam et ad glandulas renales, qui etiam plexui ramus intercostalis ramum dat.

ibid. not. *o)* *adde* Habet spermaticam COOPMANS. Sed dicitur cum iis organis.

Cl. SABBATIER radices habet a primo et secundo ganglio lumbari, a primo, secundo, tertio, a primo et secundo pluribus radicibus *d**).

pag. 268 l. 15. *post* nego *adde* Alias quatuor sacri ad intercostalem ramos addunt *b**), et transuerso ramo quisque cum sodali coit *b***).

ibid. l. 16. *adde* Ad primum ischiadici vna anastomosis, ad secundum duae, ad tertium etiam duae; CAMPER ad pudendum vna et cum coccygea anastomosis.

*d**) II. p. 266.

*b**) DUVVERNEY p. 102.

*b***) Ibid.

pag. 268. not. c) *adde* CAMPER.

ibid., not. f) *adde* SABBATIER II. p. 161.

ibid., *ad verbum visum in textu* lin. ult. *adde* not. *i**). In aliis finiri in ultimos sacros SABBATIER l. c. Finis incertus CAMPER.

Fasciculi IV. Part. I. finis.

1188 Ho 22

